

CONCOURS PAES - 22 & 23 MAI 2012 FACULTE DE MEDECINE DE NICE

UE 9

ANATOMIE DU PETIT BASSIN CHEZ LA FEMME

DURÉE DE L'ÉPREUVE : **20 MINUTES**

VÉRIFIEZ QUE VOTRE SUJET COMPORTE **3 PAGES**

VÉRIFIEZ QUE VOTRE SUJET COMPORTE **15 QCMS**

La fiche de QCM est jointe avec 2 BROUILLONS.

Reportez le code épreuve suivant sur votre **fiche réponse QCM** :

0009

BARÈME DE CORRECTION :

RÉPONSE EXACTE	+1	POINT
RÉPONSE INEXACTE	0	POINT
ABSENCE DE RÉPONSE	0	POINT

ATTENTION :
LA BONNE
RÉPONSE
PEUT ÊTRE
MULTIPLE

Première Année des Etudes de Santé

UE 9

Petit bassin de la femme

Année Universitaire 2011/2012

De la question 1 à la question 15

Quelle est ou quelles sont la ou les réponses justes ?

1. On peut dire que sur le bord antérieur de l'os coxal :

- A) l'éminence ilio-pubienne (ilio-pectinée) est au dessous de la gouttière du psoas (vallée du psoas)
- B) l'épine sciatique est en arrière de la cavité cotyloïde
- C) la branche horizontale du pubis est en avant de la symphyse pubienne
- D) le corps de l'ischion est au dessous de l'épine ischiatique
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

2. A propos de la ceinture pelvienne on peut dire que :

- A) le sommet des crêtes iliaques se projette en regard du disque L4, L5
- B) l'articulation sacro-iliaque est une articulation synoviale
- C) l'articulation pubienne est une articulation cartilagineuse
- D) les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral sont des ligaments à distance de l'articulation sacro-iliaque
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

3. A propos de la ceinture pelvienne on peut dire que :

- A) elle est formée par l'articulation des deux os coxaux au sacrum et entre eux
- B) le détroit supérieur est dans un plan oblique en bas et en avant
- C) le détroit supérieur a chez la femme une forme oblongue où sont inscrites deux ellipses
- D) le détroit inférieur est entre les deux tubérosités ischiatiques, le coccyx et le bord inférieur de la symphyse pubienne
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

4. A propos de l'os coxal on peut dire que :

- A) la cavité cotyloïde (acétabulum) comprend un toit et deux cornes
- B) le cotyle « regarde » en bas en avant et en dehors
- C) le foramen obturé (trou obturateur) est dans un plan oblique en avant et en dehors
- D) l'épine sciatique est entre la grande et la petite incisure fémorale
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

5. A propos de la vulve on peut dire que :

- A) le drainage lymphatique se fait vers les nœuds glutéaux
- B) elle est innervée par le 5^{ème} nerf lombaire spinal
- C) le mont de vénus ou mont du pubis est une masse lymphatique
- D) les glandes vestibulaires majeures s'ouvrent dans le canal de l'urètre
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

6. A propos des muscles du périnée et du muscle élévateur de l'anus on peut dire que :

- A) une des insertions du muscle élévateur de l'anus est sur le fascia du muscle obturateur interne
- B) la fente urogénitale est entre les muscles pubo-coccygiens formés par les faisceaux pubo-génital et pubo-rectal
- C) le noyau fibreux central du périnée est entre le vagin et le canal anal
- D) les muscles transverses superficiels et profonds du périnée sont au dessus du muscle élévateur de l'anus
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

7. Sur une coupe sagittale médiane du petit bassin chez la femme on peut voir :

- A) le cap anal entre l'ampoule rectale et le canal anal
- B) que l'ampoule du rectum suit la concavité du sacrum
- C) que le noyau fibreux du périnée est entre le vagin et le canal anal
- D) que le vagin est dirigé en haut et en avant
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

8. A propos des touchers pelviens on peut dire que :

- A) en introduisant l'index dans l'anus, l'examineur peut atteindre le niveau du cul-de-sac rectovaginal de Douglas
- B) en introduisant l'index et le majeur dans le vagin l'examineur ne peut pas atteindre le cul-de-sac rectovaginal
- C) le cul-de-sac rectovaginal de Douglas ne correspond pas à la partie la plus basse de la grande cavité péritonéale
- D) la partie la plus basse de la grande cavité péritonéale est entre la vessie et la symphyse pubienne
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

9. A propos de la vascularisation des organes pelviens on peut dire que :

- A) l'artère utérine ne vascularise que l'utérus
- B) la vessie reçoit une vascularisation importante de l'artère obturatrice
- C) l'artère obturatrice est l'unique rameau collatéral de l'artère iliaque externe
- D) l'artère iliaque interne porte aussi le nom d'artère hypogastrique
- E) Les propositions A,B,C et D sont fausses

10. A propos des ligaments larges de l'utérus on peut dire que :

- A) ils sont en avant et en arrière de l'utérus
- B) que l'aileron supérieur est sous-tendu par le ligament rond
- C) que l'aileron antérieur est sous-tendu par l'artère ombilicale
- D) que l'aileron postérieur est sous-tendu par le plexus hypogastrique supérieur
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

11. A propos du périnée musculaire on peut dire que :

- A) la contraction du muscle ischio-caverneux favorise l'intumescence du clitoris
- B) le muscle constrictor de la vulve est le muscle de l'hymen
- C) le muscle constrictor de la vulve disparaît après le premier coït complet
- D) le muscle transverse profond s'insère sur le sphincter strié de la vessie
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

12. A propos de la vessie et de l'urètre on peut dire que :

- A) la vessie est sous-péritonéale
- B) le corps de l'utérus est sur la face supérieure de la vessie lorsque la vessie est vide
- C) l'urètre s'abouche au niveau de l'apex de la vessie
- D) le détrusor est innervé par le 5^{ème} nerf lombaire
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

13. Les moyens de fixité de l'utérus sont :

- A) l'urètre
- B) l'uretère
- C) la lame sacro-recto-génito-pubienne
- D) le noyau fibreux central du périnée
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

14. A propos des artères du petit bassin on peut dire que :

- A) l'artère gonadique est un rameau de l'artère iliaque interne
- B) l'artère vaginale participe à la vascularisation de l'ovaire
- C) l'artère ombilicale vascularise la vessie
- D) le trajet de l'artère utérine est rectiligne sur le corps de l'utérus
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses

15. A propos du rectum on peut dire que :

- A) il présente des plis muqueux transversaux
- B) il est en partie péritonisé
- C) son sphincter lisse est à la partie basse des colonnes anales
- D) les valvules anales sont à concavité supérieure
- E) les propositions A,B,C et D sont fausses