

DM n° 1 = Annales Anatomie : Epreuve UE 10

Tutorat 2014-2015 : 6 QCMS – 7 MIN – Code épreuve : 0010



QCM du concours 2011-2012 :

QCM 1 : On peut dire que le sein est comparable à une « pelote » ou un « œuf » dans une chaussette parce que la glande mammaire est formée par un lobule glandulaire entouré par une expansion du fascia pectoral :

- A) le fait et la raison sont justes et liés
- B) le fait et la raison sont justes mais non liés
- C) le fait est juste mais la raison est fausse
- D) le fait est faux mais la raison est juste
- E) le fait et la raison sont faux

QCM 2 : La lymphe de la glande mammaire droite se draine vers les chaînes lymphatiques thoracique interne, axillaire et sous-clavière puis vers le conduit thoracique parce que toutes les formations lymphatiques aboutissent au conduit thoracique :

- A) le fait et la raison sont justes et liés
- B) le fait et la raison sont justes mais non liés
- C) le fait est juste mais la raison est fausse
- D) le fait est faux mais la raison est juste
- E) le fait et la raison sont faux

QCM du concours 2012-2013 :

QCM 3 : Concernant la glande mammaire, quelle(s) est (sont) la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Elle est vascularisée, en partie, par les branches de l'artère axillaire
- B) Elle est vascularisée par la 10^{ème} artère intercostale
- C) Le processus glandulaire axillaire est constant
- D) Le mamelon est innervé par le rameau antérieur du 10^{ème} nerf intercostal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : Concernant la glande mammaire, quelle(s) est (sont) la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les rétinaculum cutanés fixent le fascia pré-mammaire et le fascia rétro-mammaire
- B) Les cancers lobulaires sont les cancers du sein les plus fréquents
- C) Les cancers tubulaires sont les cancers du sein les plus fréquents
- D) La glande mammaire peut perdre sa mobilité en cas d'envahissement de l'espace rétro-mammaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM du concours 2013-2014 :

QCM 5 : A propos du sein et de ses vaisseaux, on peut dire que :

- A) Le drainage lymphatique du sein droit se fait normalement vers le conduit (canal) thoracique
- B) La chaîne lymphatique axillaire est sur le bord médial de l'artère axillaire
- C) La chaîne lymphatique axillaire est sur le bord latéral de l'artère axillaire
- D) La chaîne lymphatique thoracique interne ne draine que le sein droit
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos du sein, on peut dire que :

- A) La sensibilité du mamelon provient du myélomère T8
- B) La sensibilité du mamelon provient du myélomère T2
- C) La glande mammaire est formée par 30 à 45 lobes de chaque côté
- D) Les lobes s'abouchent à la papille par un seul canal galactophore
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses