

INTRODUCTION ANATOMIE DENTAIRE

Système dentaire :

Ensemble d'**organes** ou **tissus** de **même nature** et destinés à des **fonctions analogues** (par opposition à appareil) : système osseux, système artériel, système dentaire... (≠ appareil dentaire = prothèse dentaire).

Appareil :

Sens biologique : ensemble d'**organes**, en général de **natures** et de **structures différentes** mais **reliés anatomiquement entre eux**, qui concourent à **plusieurs fonctions simultanément**, dont une est une fonction **principale** (appareils masticateur, respiratoire, digestif).

Appareil manducateur :

Etymologie : du latin appararer = préparer, et du latin manducare = action de manger.

Ensemble **dento-musculo-squelettique** permettant la réalisation des fonctions orales, dont la **manducation** (= **préhension, mastication** et **déglutition**) ; Il est constitué des :

- **système dentaire.**
- **système neuro-musculaire.**
- **squelette cranio-facial.**

Occlusion dentaire :

Etymologie du latin occlusio, de occludere = fermer.

Etat, à un instant donné, d'un rapport inter-arcades défini par **au moins un point de contact** ★. Par extension, **toute situation de contact inter-arcades.** ★

L'**occlusion** est un état **statique** qui correspond à **tous les états possibles de contacts** entre les dents maxillaires et mandibulaires (supérieure et inférieure ne doivent pas être employées).

Il existe un grand nombre de positions mandibulaires d'occlusion parmi lesquelles la **plus fréquente** est l'**occlusion d'intercuspidie maximale (OIM)** ★. Cette **OIM** constitue **physiologiquement** une position de **référence** correspondant à l'**engrènement complet** des deux arcades antagonistes.

Le terme d'**occlusion dentaire**, qui évoque une notion de fermeture est préféré à celui d'~~articulé dentaire~~, l'engrènement dentaire ne représentant ~~pas une articulation~~ (= mouvement) mais une **butée** qui limite le mouvement de fermeture.

La description des principes **biomécaniques** régissant la **forme**, la **situation** et l'**organisation** des différents organes dentaires est proposée selon 3 niveaux :

- ① **organe dentaire** pris **unitairement** en dissociant dent et parodonte.
- ② **ensemble d'organes dentaires** que constitue l'arcade dentaire.
- ③ la **mise en relation** des deux **arcades** dentaires maxillaire et mandibulaire : observée d'un point de vue **statique** (en **occlusion**).

Orientation et nomenclature internationale


La **mesure** et la **connaissance** de l'anatomie descriptive sont basées sur la définition de plans d'orientation.

Dents et arcades dentaires sont orientées suivant les **3 plans** d'orientation générale permettant de préciser leur situation et leur orientation.

- **Plan sagittal** : plan **vertical antéro-postérieur** divisant le corps en deux parties **droite** et **gauche**, sensiblement égales. Il existe principalement le plan **sagittal médian (PSM)** ; tout plan parallèle est appelé plan **sagittal paramédian**.

- **Plan frontal** ou **coronal** : plan **vertical**, perpendiculaire au plan sagittal, divisant le corps en deux parties : **antérieure (ventrale)** et **postérieure (dorsale)**. ★

- **Plan horizontal** ou **axial** ou **transversal** : plan perpendiculaire aux plans sagittal et frontal divisant le corps en deux parties : **supérieure (crâniale ou céphalique)** et **inférieure (caudale)**.




Les **arcades dentaires** sont séparées :

- par le **plan sagittal médian** en côtés **droit** et **gauche**.
- par le **plan d'occlusion (plan horizontal)** en arcade **maxillaire** et arcade **mandibulaire**.

Ces deux plans définissent 4 secteurs d'arcades numérotés de 1 à 4 dans le sens horaire à partir du secteur maxillaire droit (côté droit du patient).


4 secteurs pour les dents **permanentes** : ★

- 1** : maxillaire droit
- 2** : maxillaire gauche
- 3** : mandibulaire gauche
- 4** : mandibulaire droit



Pour les dents **temporaires** :

- 5** : maxillaire droit
- 6** : maxillaire gauche
- 7** : mandibulaire gauche
- 8** : mandibulaire droit



Par **secteur** il y a :


- **2 incisives**, **1 canine**, **2 prémolaires** et **3 molaires permanentes**
- **2 incisives**, **1 canine** et **2 molaires temporaires**

Les dents sont numérotées à partir du **PSM** :

- 1 : **incisive centrale** (temporaire et permanente)
- 2 : **incisive latérale** (temporaire et permanente)
- 3 : **canine** (temporaire et permanente)
- 4 : **1^{ère} molaire** temporaire et **1^{ère} prémolaire** permanente
- 5 : **2^{ème} molaire** temporaire et **2^{ème} prémolaire** permanente
- 6 : **1^{ère} molaire** permanente
- 7 : **2^{ème} molaire** permanente
- 8 : **3^{ème} molaire** permanente

Chaque organe dentaire se présente comme un **parallépipède** décrivant **6 faces** :


- face **vestibulaire** opposée à la face **linguale**. ★
- face **occlusale** opposée à la face **apicale**.
- face **mésiale** opposée à la face **distale**.



Caractères généraux

Organe dentaire :

L'organe dentaire est constitué de la **dent** (**émail**, **dentine**, **pulpe**) et de son **environnement** ou **parodonte** (**cément**, **desmodonte**, **os alvéolaire**, **gencive**).



Chaque dent est délimitée entre **couronne** et **racine** au niveau du **collet anatomique** (**jonction émail-cément** ou **jonction amélo-cémentaire**) ou **ligne cervicale**.

La **gencive** dessine le **collet physiologique**, il délimite la **couronne** clinique de la **racine** clinique et varie au cours de la vie.

L'**émail** est un **tissu spécialisé**, le **plus dur** et le **plus minéralisé** de tout l'organisme. A l'inverse du **cément** et de la **dentine** qui peuvent se déposer secondairement, l'**émail** possède une **forme** et une **épaisseur définitive** à l'éruption dentaire, modifiées **uniquement** par **perte** de substance acquise ensuite.

Les différentes faces et délimitations de la couronne dentaire :


- la face **vestibulaire** regarde le vestibule.
- la face **linguale** regarde la cavité orale.
- la face **mésiale** regarde le **plan sagittal médian**.
- la face **distale** est la plus **éloignée**.
- la face **occlusale** (pour les dents aec des cuspidés) ou **partie travaillante** rentre en contact ou en **occlusion** avec la dent antagoniste.

◇ la **région cervicale** est en rapport avec le **collet (ou zone cervicale)**

◇ la **région apicale** avec les **extrémités radiculaires**.

- Les **incisives** ont une **couronne** qui présente **5 faces (V, L, M, D et cervicale ou imaginaire)** et un **bord libre** à la jonction entre face **V** et **L**.
- Les **canines** ont **5 faces** et une **pointe cuspidienne = monocuspidée**. ★★
- Les **prémolaires** et **molaires** ont une couronne grossièrement en forme de **cube** avec **6 faces : V, L, M, D, cervicale et occlusale**.

La **face occlusale**, **partie active** de l'outil, est caractérisée par sa **morphologie** ; le reste de l'organe dentaire en constitue le **support**, défini par son **axe de travail**. **Morphologie occlusale** et **axe radicaire** forment donc les deux éléments déterminants.



Divisions topographiques des faces dentaires

Anatomie occlusale

Incisives, canines, prémolaires et **molaires** représentent la réponse morphologique à un **double impératif fonctionnel** : **mastication** et stabilisation.

L'anatomie occlusale est constituée de formes :

- **concaves** : les **sillons**.
- **pointes convexes** : les **cuspidés** pour les dents cuspidées (canines, prémolaires et molaires) ou **bord libre** pour incisives.

Les **cuspidés** : la morphologie occlusale des dents pluricuspidées (**molaires, prémolaires**) est caractérisée par ces formes convexes (hémisphériques) : **les cuspidés**, constituant la réponse ergonomique aux impératifs physiologiques qui sont :

- ↘ **fractures**.
- ↘ **travail musculaire**.
- ↘ **forces** sur le tissu de soutien. ★
- ↘ les **morsures** de la joue et de la langue.
- ↗ **éruption**.
- ↗ **prophylaxie**.

On distingue **2 types** de **cuspidés** (**porteuse** ou **d'appui**, **surplombante** ou **guide**) selon qu'elles s'engrènent dans la **fosse centrale** de sa dent antagoniste ou non.

Cuspide d'appui : entretient des **contacts antagonistes** par ses **deux versants** :

- au **maxillaire** : les cuspidés **linguales**.
- à la **mandibule** : les cuspidés **vestibulaires** (en occlusion physiologique).


Elles sont **centrées** dans la **fosse antagoniste** : l'**axe de la cuspid**e correspond à l'**axe de la dent antagoniste** ; elles broient les aliments comme un pilon dans un mortier.

Cuspide guide : entretient des **contacts antagonistes** par son **seul versant interne** et **guide** les surfaces d'appui antagonistes au cours des mouvements mandibulaires : ★

- au **maxillaire** : les cuspides **vestibulaires**. ★


- à la **mandibule** : les cuspides **linguales**. ★

Elles **protègent** les **joues** et la **langue** de la **morsure** en les maintenant à l'écart des cuspides porteuses et sont comme les parois du mortier en face du pilon.




On observe cliniquement des **morphologies occlusales variées** présentant un relief **parfois** très **marqué**, **parfois** très **adouci**.

Hauteur cuspidienne : **projection verticale** entre la **pointe cuspidienne** et le **sillon principal** bordant cette cuspid, permet l'évaluation de la **profondeur** du relief occlusal. ★



Première Prémolaire maxillaire, vue mésiale

Pente cuspidienne : angle formé par la **tangente** à l'**arête** ou à la **crête cuspidienne** par rapport à un **plan de référence**.



Première Prémolaire maxillaire, vue mésiale

Plus le **relief occlusal** sera **marqué** par une forte **pente cuspidienne** :

- ➤ fonction **masticatoire**. ★

- ➤ **stabilisation occlusale** en **OIM**.

- ➤ **risques d'interférences** (ex : contacts entre les dents **postérieures** au cours des mouvements mandibulaires latéraux).

La notion d'**équilibre occlusal** se situe dans le meilleur compromis entre ces deux impératifs opposés : **relief occlusal** marqué **sans** créer d'**interférences**.

Les Arêtes, crêtes, versants et pans

Les éminences allongées à la surface des dents sont des **crêtes** :


- **Marginales** : élévations linéaires qui limitent :
 - les **faces occlusales** en **mésial** et en **distal** des dents **pluricuspidées** ★★
 - les **faces linguales** en **mésial** et en **distal** des dents **antérieures**.
- **Cuspidiennes** : **crêtes méso-distales** forment les limites **vestibulaires** et **linguales** des surfaces occlusales ★; elles sont composées d'une **arête mésiale** et d'une **arête distale**.

Dans le **sens vestibulo-lingual** : on distingue les **arêtes internes** et les **arêtes périphériques**.

Une **arête** sépare **deux pans mésial** et **distal** d'un **versant interne** ou **occlusal** d'une cuspide. ★★★


◇ **Face occlusale** : face des dents pluricuspidées délimitée par la **ligne de plus grand contour**, s'affrontant normalement avec celles des **dents antagonistes** ; la ligne de plus grand contour est une ligne sinueuse passant par les **points les plus saillants** de la couronne de la dent par rapport à son grand axe.

◇ **Table occlusale** : surface délimitée par les lignes des **crêtes cuspidiennes** et **marginales** ★★★; en **dedans** : éléments **internes** à la table occlusale et en **dehors** : éléments **périphériques**.



Ligne du plus grand contour → face occlusale

Crête cuspidienne
Crête marginale → table occlusale



Arête ovale interne : ce **lobe ovale médian**, dit **triangulaire**, représente l'**éminence principale** de la **face interne** de chaque cuspide ; il s'étend du **sommet cuspidien** au **sillon principal**.
Deux sillons secondaires le délimitent **mésialement** et **distalement**.

Les sillons :

A l'**intersection** de plusieurs **cuspidés** ou **formes hémisphériques** se crée un **sillon**.


Le **sillon principal** sépare **deux cuspidés** entre elles et rejoint les **fosses** nées de la rencontre de **trois** éléments arrondis :

- **Direction MD** : sépare les cuspidés **V** et **L** = **sillon central**. ★
- **Direction VL** : sépare les cuspidés **M** et **D** = **sillon périphérique**. ★★★

Les **sillons secondaires** sont des **ramifications** des **sillons principaux** et creusent les bombés cuspidiens de manière à **améliorer l'efficacité masticatoire**.

Ces **sillons secondaires** séparent les **versants cuspidiens en lobes** ; ils remontent sur les versants en s'affinant et se ramifiant à leurs extrémités. Mise à part cette **augmentation** considérable du **rendement masticatoire**, les sillons constituent des voies d'**échappement** pour le **bol alimentaire** et pour les **cuspidés antagonistes évitant les interférences** occlusales lors des mouvements mandibulaires.

Le **sillon marginal** est situé à l'**intersection** d'un **pan cuspidien** et d'une **crête marginale**. Certaines dents présentent un **sillon marginal** séparant la **crête marginale** en **lobes marginaux**.



Sillon central
Sillon périphérique
Sillon marginal
Sillon secondaire ou accessoire


Les **fosses** caractérisent les **faces occlusales** des dents :

- les **fosses centrales** naissent de l'intersection de **deux sillons principaux**.
- les **fosses marginales** naissent de l'intersection d'un **sillon MD** avec une **crête marginale**.

Les **fossettes** sont des dépressions plus ou moins marquées de **faces V** ou **L** de toutes les dents.

Une **surface convexe** venant en contact avec **2 surfaces** crée **2 points de contact** : relation entre une **cuspidie** et **2 dents antagonistes** : deux points sur les **crêtes marginales**, un sur **chaque crête** de chaque dent.

Une **surface convexe** venant en contact avec **3 surfaces** antagonistes crée **3 points de contact** : ainsi une cuspidie entretient **3 contacts** avec la **fosse antagoniste**, ★ le contact occlusal est dit **tripodique**.



Contacts occlusaux punctiformes

Du fait de la forme **convexe** des **cuspidies**, les contacts **inter-occlusaux** provoqués par l'affrontement de deux dents antagonistes déterminent des petites surfaces de contacts dites **punctiformes**. Les **contacts punctiformes**, par la multiplicité de petits points de contacts occlusaux, ont pour avantages :

- ↗ **calage** et **stabilisation** de la dent.
- ↗ **échappement**.
- ∩ **surfaces** en contact.
- ∩ **usure**.
- **transmission axiale** des forces.
- **efficacité maximale** pour un **travail minimum** (économie de structure et de l'énergie).


Les embrasures :

La **zone de contact inter-proximale**, entre deux dents adjacentes, se trouve au carrefour de **4 espaces pyramidaux** ou **embrasures**.

On distingue l'**embrasure gingivale, occlusale, vestibulaire** et **linguale**.

L'**embrasure occlusale** est ainsi l'embrasure située entre le point de **contact proximal** et les **versants externes des crêtes marginales**.

Il est décrit une **loi de symétrie** des embrasures : de part et d'autre du point de contact proximal les **crêtes marginales** dessinent **deux arcs horizontaux symétriques**. Il en est sensiblement de même pour les **lignes de transition** en vue vestibulaire.



Loi de symétrie des embrasures adjacentes

Axe radulaire

L'axe radulaire constitue le **support** de la **face occlusale**, sa **morphologie**, son **orientation** dans l'espace et l'**organisation tissulaire** du parodonte, lui permettent d'**absorber** les **contraintes** appliquées à la face occlusale.

Le parodonte :

Le parodonte assure la **liaison** entre la **dent** et les **os maxillaires** et **mandibulaire** ; il est constitué de la **gencive marginale**, du **cément**, du **desmodonte** et de l'**os alvéolaire**.

Le **desmodonte** joue un rôle d'**amortisseur** et de **récepteur proprioceptif**.

Gencive : partie des muqueuses buccales qui se situe **autour de chaque dent**. Elle recouvre également l'**os alvéolaire**. Elle est la partie la plus **visible** du parodonte et est plus rose que les autres muqueuses de la bouche car elle contient de la **kératine**.

Cément : formé par le **tissu calcifié mésenchymateux, avasculaire**, qui constitue l'enveloppe extérieure de la racine anatomique. Il débute au niveau de la portion **cervicale** de la dent et se prolonge jusqu'à l'**apex**. Il représente le point d'**ancrage** dentaire des **fibres desmodontales**.

Os alvéolaire : la fonction de l'os n'est pas seulement de fournir un **support à la dent**, mais aussi de résister en **absorbant les forces** transmises par l'occlusion. L'os alvéolaire est extrêmement **sensible** à tout changement d'amplitude et direction des forces appliquées. L'épaisseur du tissu osseux alvéolaire est **diminuée** par la **pression** et **augmentée** par la **tension** qu'il subit :

- au **maxillaire** :
 - **importante** sur la **face palatine**.
 - **faible** sur leur **face vestibulaire**.
- à la **mandibule** :
 - **importante** sur la **face vestibulaire**.
 - **faible** sur leur **face palatine**, le phénomène est **inversé**.

Desmodonte et proprioception : La **fixation** de la **racine** à l'**os alvéolaire** est une fonction du desmodonte qui doit également **supporter** et **absorber** les pressions exercées et prévenir les surcharges grâce à ses **capteurs proprioceptifs**.

Ce faisceau, constitué de **fibres obliques**, soutenues par un mécanisme **hydraulique**, offre une grande **résistance** aux **forces verticales** ; ces fibres sont capables de supporter une pression considérable si elle s'exerce selon le **grand axe de la dent**, provoquant une **traction** des fibres, et **non un écrasement**.


Des **capteurs proprioceptifs desmodontaux** sont répartis sur l'**ensemble des dents** mais ils sont **particulièrement sensibles** dans le **secteur antérieur**, s'inscrivant ainsi dans le **gradient antéro-postérieur** de **sensibilité** de la cavité orale. Leur but est de déclencher des **réflexes nociceptifs** le plus souvent d'évitement. Cette sensibilité est **directionnelle**, c'est-à-dire que la réponse est plus **fine** si la **pression** est **tangentielle** plutôt qu'**axiale**.

Morphologie radicaire

La **résistance** de l'**organe dentaire** sera **fonction du nombre** et de la **morphologie** des **racines**, c'est-à-dire de la **surface** radicaire s'opposant au développement des contraintes.

Triangle de sustentation :

- les **molaires mandibulaires** s'inscrivent dans un **triangle à base occlusale**.
- les **molaires maxillaires** s'inscrivent dans un **triangle à base apicale** du fait de la grande **divergence** de leurs **racines**. Ces dernières présentent un triangle de sustentation beaucoup plus **large**.



maxillaire

mandibulaire

Les furcations radiculaires :

Les **premières molaires maxillaire** et **mandibulaire** se caractérisent par la présence de **furcations** ; **zones** situées **entre chaque racine** où se trouvent tous les éléments du **parodonte** (**cément radicaire**, **ligament**, **os alvéolaire**).

On distingue :

- **1 zone de furcation vestibulo-linguale** pour les 1^{ères} molaires **mandibulaires**.
- **3 zones de furcations** pour les 1^{ères} molaires **maxillaires** (**vestibulaire**, **mésiale** et **distale**).

L'**anatomie** et la **position** de ces zones de furcation sont caractérisées par la **hauteur du tronc radicaire**, le **degré de séparation des racines** (angle au départ du tronc radicaire) et la **divergence** des racines (distance entre deux racines qui augmente en direction apicale).

Pour la 1^{ère} molaire maxillaire :

- la **racine mésio-vestibulaire** est généralement **verticale**.
- la **racine disto-vestibulaire** a une projection **distale**.
- la **racine linguale** a une projection **palatine**.

Pour la 1^{ère} molaire mandibulaire :

- la **racine mésiale** est **plus large** que la racine distale tant en **vestibulo-lingual** qu'en **mésio-distal**.
- la **section** de la **racine mésiale** est en forme de **verre de montre**.
- la **section** de la **racine distale** est **circulaire**.

Classification

L'homme, comme tous les mammifères, possède **2 ensembles** de **dents**, dents **temporaires** et **permanentes**. Deux phénomènes **dynamiques** vont conduire à la mise en place de ces dents : la **dentition temporaire** (édification des arcades dentaires de la denture temporaire) et la **dentition permanente** (édification des arcades dentaires de la denture permanente).

Le **premier ensemble** comprend **20 dents** en tout.

A **6 mois** : la **première dent** apparaît.

A **28 mois (+/- 4 mois)** : la **dernière dent temporaire** apparaît.

De **2 à 6 ans** : l'enfant fonctionne avec ses **20 dents temporaires**.

A **6 ans** : la **première dent permanente** apparaît.

De **6 à 12 ans** : les **dents temporaires** sont **remplacées**.

A **12 ans** : apparaît la **2^{ème} molaire permanente (dent de 12 ans)**.

De **18 à 25+ ans** : la **3^{ème} molaire (dent de sagesse)** apparaît,

l'ensemble complet de **32 dents permanentes** est alors constitué. ★

Il y a **3 dentures** chez l'homme :

- ① denture **temporaire** (de **6 mois** à **6 ans**).
- ② denture **mixte** (de **6 à 12 ans**) : cohabitation de dents **temporaires** et **permanentes**.
- ③ denture **permanente** (**12 ans et plus**).

L'homme possède **3 dentures** et **2 dentitions** ★

Si l'homme a une durée de vie moyenne de **70 ans**, il va passer **6%** de sa vie avec ses **dents temporaires** et **91%** avec ses **dents permanentes**.

Il existe **deux arcades dentaires** :

- arcade **maxillaire immobile**.
- arcade **mandibulaire**, supportée par la mandibule (« mâchoire inférieure ») qui est **mobile**.

Chez l'homme, les éléments de la denture **temporaire** ou **permanente** sont répartis de façon **égale** entre les deux arcades.

Il y a donc :

- en **denture temporaire** **10** éléments **maxillaires** et **10** éléments **mandibulaires**.
- en **denture permanente** **16** éléments **maxillaires** et **16** éléments **mandibulaires**.

Sur une base de **forme** et de **fonction**, les dents humaines peuvent être divisées en **4 classes** :

- **3** en denture **temporaire** : **incisives**, **canines** et **molaires**.
- **4** en denture **permanente** : **incisives**, **canines**, **prémolaires** et **molaires**.

*Exemple : les canines sont différentes en forme des molaires dans la mesure où elles ne possèdent qu'une pointe cuspidienne (monocuspidée), alors que les molaires (pluricuspidées) peuvent en avoir de 3 à 5. La forme prédit la fonction dans les deux cas : les **canines** sont des dents de **préhension** tandis que les **molaires** sont des dents de **broyage**.*

Traits d'ensemble → distinction entre dents **temporaires** et **permanentes**. ★ ★

Traits de classe → catégorie fonctionnelle (I, C, PM ou M). ★

Ex : les couronnes compressées dans le sens VL des **incisives** les rendent coupantes en opposition à la forme des **canines** qui les limite à la fonction de **préhension**.

Le **nombre de dents** dans chaque classe constitue la **formule dentaire** donnée uniquement pour le **quadrant supérieur gauche**.

Ex : en denture permanente il y a **2 incisives, 1 canine, 2 prémolaires et 3 molaires** ce qui s'écrit **2-1-2-3**. Pour chaque quadrant les dents les plus proches de la ligne **médiane** sont les **incisives**. La formule dentaire complète s'écrit :

3-2 1-2	2-1-2-3
3-2-1-2	2-1-2-3

Chez l'homme tous les **quadrants** ont le **même nombre de classes** et de **dents par classe** ; on peut alors écrire la formule que pour **un seul quadrant**.

Traits d'arcades → différencient les éléments d'une classe par **rapport** aux éléments de la **même classe** mais de l'**arcade opposée** (maxillaire ou mandibulaire). ★

Ex : dans la classe des **prémolaires**, les prémolaires **maxillaires** ont **deux cuspides d'égale importance** tandis que les **prémolaires mandibulaires** ont leur cuspide **linguale** beaucoup plus **réduite** que la cuspide **vestibulaire**.

Traits types → caractérisent les éléments d'une **même classe** et d'une **même arcade** (1^{ère}, 2^{ème} ...). ★

Identification des éléments dentaires :

Il existe des méthodes rapides de numérotations pour désigner le type de dent et le quadrant où elle se trouve.

La plus pratique utilise des :

- **chiffres arabes** pour les dents **permanentes**.
- des **lettres** ou des **chiffres romains** pour les dents **temporaires**.

Denture temporaire:	incisive centrale	1 : anciennement a ou I
	incisive latérale	2 : anciennement b ou II
	canine	3 : anciennement c ou III
	1ere molaire	4 : anciennement d ou IV
	2eme molaire	5 : anciennement e ou V

Denture permanente:	incisive centrale	1
	incisive latérale	2
	canine	3
	1ere prémolaire	4
	2eme prémolaire	5
	1ere molaire	6
	2eme molaire	7
	3eme molaire	8

★★★★★★

Pour indiquer le **quadrant** les **chiffres** ou **symboles** suivants sont utilisés : ★★★★★★

- 1 : maxillaire droit
- 2 : maxillaire gauche
- 3 : mandibulaire gauche
- 4 : mandibulaire droit
- 5 : maxillaire droit temporaire
- 6 : maxillaire gauche temporaire
- 7 : mandibulaire gauche temporaire
- 8 : mandibulaire droit temporaire

Pour **chaque classe**, le même ordre sera suivi en décrivant les **5 vues** pour chaque dent : **vestibulaire, lingual, mésial, distal** et **incisif** (ou **occlusal**).

Ex : 27 : 2^{ème} molaire maxillaire gauche permanente


Ensemble : dent permanente.

Classe : molaire

Arcade : maxillaire.

Type : 2^{ème}.

Côté : gauche.



©2016 The Awkward Yeti



theAwkwardYeti.com

