

### 2016

**QCM 1 : A propos des lymphatiques du sein, on peut dire :**

- A) Le drainage lymphatique du sein droit arrive à la fin au canal thoracique
- B) Chaque lobe de la glande mammaire est drainé dans son propre nœud lymphatique
- C) La chaîne récurrentielle gauche draine le sein gauche.
- D) La chaîne humérale gauche draine le sein gauche.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

**QCM 2 : A propos du sein, on peut dire que :**

- A) Les lobes de la glande mammaire sont drainés par un conduit lactifère unique et commun qui s'abouche à la papille
- B) La glande mammaire contient 70 à 100 lobes
- C) La peau de la papille est innervé par le rameau antérieur du 5<sup>ème</sup> nerf spinal cervical.
- D) Le muscle radié sous-aréolaire est un muscle strié responsable de la contraction de la plaque aréolo-mammaire.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

### 2015

**QCM 3 : Le drainage lymphatique des deux seins va vers le conduit thoracique (canal lymphatique thoracique, canal thoracique)**

Parce que les deux chaînes axillaires, les deux chaînes thoraciques internes et les deux chaînes sub-clavières se drainent dans le conduit thoracique

- A) VVL
- B) VVNL
- C) VF
- D) FV
- E) FF

**QCM 4 : L'examen d'une patiente paraplégique par section médullaire au niveau du sixième myélomère thoracique ne retrouve pas en général d'anesthésie de l'aréole du sein,**

Parce que la sensibilité de l'aréole du sein est sous la dépendance du deuxième myélomère thoracique.

- A) VVL
- B) VVNL
- C) VF
- D) FV
- E) FF

### 2014

**QCM 5 : A propos du sein et de ses vaisseaux, on peut dire que**

- A) Le drainage lymphatique du sein droit se fait normalement vers le conduit (canal) thoracique.
- B) La chaîne lymphatique axillaire est sur le bord médial de l'artère axillaire
- C) La chaîne lymphatique axillaire est sur le bord latéral de l'artère axillaire
- D) La chaîne lymphatique thoracique interne ne draine que le sein droit.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

**QCM 6 : A propos du sein, on peut dire que :**

- A) La sensibilité du mamelon provient du myélomère T8.
- B) La sensibilité du mamelon provient du myélomère T2
- C) La glande mammaire est formée par 30 à 45 lobes de chaque côté.
- D) Les lobes s'abouchent à la papille par un seul canal galactophore.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

## 2013

**QCM 7 : Concernant la glande mammaire, quelle(s) est (sont) la ou les propositions exactes :**

- A) Elle est vascularisée, en partie, par les branches de l'artère axillaire.
- B) Elle est vascularisée par la 10<sup>ème</sup> artère intercostale.
- C) Le processus glandulaire axillaire est constant.
- D) Le mamelon est innervé par le rameau antérieur du 10<sup>ème</sup> nerf intercostal
- E) Les proposition A, B, C et D sont fausses.

**QCM 8 : Concernant la glande mammaire, quelle(s) est (sont) la ou les proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les rétinaculums cutanés fixent le fascia pré-mammaire et le fascia rétro-mammaire
- B) Les cancers lobulaires sont les cancers du sein les plus fréquents.
- C) Les cancers tubulaires sont les cancers du sein les plus fréquents.
- D) La glande mammaire peut perdre sa mobilité en cas d'envahissement de l'espace rétro-mammaire.
- E) Les proposition A, B, C et D sont fausses.

## 2012

**QCM 9 : On peut dire que le sein est comparable à une pelote ou un œuf dans une chaussette**

**Parce que la glande mammaire est forée par un lobule glandulaire entouré par une expansion du fascia pectoral**

- A) VVL
- B) VVNL
- C) VF
- D) FV
- E) FF

**QCM 10 : La lymphe de la glande mammaire droite se draine vers les chaînes lymphatiques thoracique interne, axillaire et sous clavière puis vers le conduit thoracique**

**Parce que toutes les formations lymphatiques aboutissent au conduit thoracique**

- A) VVL
- B) VVNL
- C) VF
- D) FV
- E) FF

## 2012

**QCM 11 : Un cancer du sein qui envahit le fascia superficialis peut entraîner un phénomène clinique nommé peau d'orange**

**Parce que la glande mammaire, et le fascia superficialis qui l'enveloppe, sont rattachés à la peau par des ligaments cutanés qui en se rétractant donnent à la peau un aspect de peau d'orange.**

- A) VVL
- B) VVNL
- C) VF
- D) FV
- E) FF

## **CORRECTION**

1)	D	2)	E	3)	E	4)	C	5)	E	6)	E	7)	AC
8)	CD	9)	C	10)	E	11)	A						

### **2016**

#### **QCM 1 : D**

- A) Faux : Le drainage lymphatique du sein D arrive au conduit lymphatique.  
B) Faux  
C) Faux : la chaîne récurrentielle draine la lymphe du larynx, de la trachée, de la thyroïde et de l'œsophage, rien à voir avec le sein #UE12  
D) Vrai : la chaîne humérale fait partie de l'ensemble des nœuds axillaires

#### **QCM 2 : E**

- A) Faux : chaque lobe possède son propre conduit lactifère  
B) Faux : elle en contient entre 12 et 20  
C) Faux : la papille ou mamelon est innervée par T4 (le 4<sup>ème</sup> nerf thoracique).  
D) Faux : le muscle radié est un muscle lisse (sa contraction n'est pas volontaire mais réflexe).

### **2015**

#### **QCM 3 : E**

Alors là tout est faux, le fait et la raison : seulement le sein G va se drainer dans le conduit thoracique (par l'intermédiaire des chaînes axillaire, thoracique interne, subclavière G). Le sein D va se drainer dans le conduit lymphatique.

#### **QCM 4 : C**

Le fait est vrai mais la raison est fautive : la sensibilité du mamelon et de la zone de l'aréole est assurée par T4. Donc en cas de lésion au niveau de T6 on n'aura normalement pas d'anesthésie de la zone de l'aréole.

### **2014**

#### **QCM 5 : E**

- A) Faux : le sein D se draine dans le conduit lymphatique  
B) Vrai  
C) Faux  
D) Faux : il y a une chaîne thoracique interne à droite pour le sein D et une à gauche pour le sein G.

#### **QCM 6 : E**

- A) Faux : la sensibilité du mamelon provient de T4  
B) Faux  
C) Faux : 12 à 20 lobes de chaque côté  
D) Faux : chaque lobe est drainé par son propre canal  
E) Vrai

### **2013**

#### **QCM 7 : AC**

- A) Vrai  
B) Faux : elle est vascularisée par la 7<sup>ème</sup> artère intercostale  
C) Vrai : les trois autres sont inconstants  
D) Faux : le mamelon est innervé par T4

#### **QCM 8 : CD**

- A) Faux : ils relient le fascia pré-mammaire à la peau (mais HP depuis plusieurs années).  
B) Faux  
C) Vrai  
D) Vrai : c'est ce que l'on cherche à l'examen clinique lors de la mobilisation de la glande mammaire : si elle apparaît fixe par rapport au plan postérieure c'est qu'il y a un sus-cis d'ordre inflammatoire ou cancéreux.

## 2012

### **QCM 9 : C**

Le fait est juste. (Bien connaître les métaphores de 2P +++)

La raison est fausse : la glande mammaire se trouve dans un dédoublement du fascia superficiel, et est constituée de 12 à 20 lobules et non pas un seul.

### **QCM 10 : E**

Le fait et la raison sont fausses. Le sein D se draine vers les chaînes lymphatiques thoracique interne, axillaire et sous clavière qui aboutissent au conduit lymphatique.

Le conduit thoracique draine la lymphe sous diaphragmatique et de la moitié gauche de la partie sus diaphragmatique.

## 2012

### **QCM 11 : A**

*Voilà pour les annales de notre cher 2P. Comme vous pouvez le voir, il est très important de bien connaître le drainage lymphatique du sein (et surtout la différence canal thoracique à G et conduit lymphatique à D).*

*Si vous avez des questions sur tout ça → Gooooo forum !!*

*Plein de bisous et de courage ♥♥♥*