

*En gris ce sont les items tombés avant le cours en présentiel et qui sont donc hors programme.*

**QCM 1 : À propos de l'appareil génital féminin (AGF), donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) À part l'ovaire, l'ensemble de l'AGF est péritonisé
- B) Le périnée cutané est formé d'un triangle centré sur le vagin et d'un triangle centré sur l'anus
- C) Le col de l'utérus repose sur la paroi antéro-supérieure du vagin
- D) Les ovaires sont des glandes amphicrines
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 2 : À propos de l'innervation de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le ¼ postérieur du périnée est innervé par le nerf rectal inférieur
- B) Les ¾ antérieurs sont innervés par les rameaux antérieurs de L1 et L2
- C) Le nerf pudendal est formé des rameaux antérieurs de S2/S3/S4
- D) L'AGF a une innervation orthosympathique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 3 : À propos de l'appareil génital féminin (AGF), donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le vagin est concave en arrière
- B) Après badigeonnage à l'acide acétique, le col utérin devient rose en cas de cancer
- C) La trompe utérine possède 3 tuniques (muqueuse, musculaire, séreuse)
- D) L'utérus est péritonisé seulement sur sa face supérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 4 : À propos de l'appareil génital féminin (AGF), donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) La corticale de l'ovaire a uniquement un rôle endocrine alors que la médulla a un rôle exocrine en plus
- B) Le lugol colore les cellules saines de l'utérus en brun
- C) Les trompes sont entièrement péritonisées
- D) Le ligament utéro-ovarien sous-tend le mésosalpinx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 5 : À propos de l'appareil génital féminin (AGF), donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'utérus est antéversé et antéfléchi
- B) Le vagin se projette sur l'ischion
- C) Une partie du clitoris est issue d'une expansion des grandes lèvres
- D) Les glandes de Skene sécrètent la cyprine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 6 : À propos du ligament large, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le mésosalpinx est l'aileron supérieur
- B) Le mésovarium est l'aileron antérieur
- C) Le ligament rond sous-tend l'aileron postérieur
- D) Le méso-funiculaire sous-tend l'aileron inférieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 7 : Vous êtes gynécologue. Madame Douglas vient vous voir pour faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. Elle veut être sûre que tout va bien avant d'avoir un 3<sup>ème</sup> enfant. Donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Au toucher rectal vous constatez que le col utérin de Mme D présente plusieurs diverticules
- B) Afin de visualiser le col utérin vous utiliserez un spéculum
- C) Vous pouvez utiliser 3 colorations pour dépister le cancer du col : acide acétique, lugol ou bleu de méthylène
- D) Le cancer apparaîtra blanc après coloration à l'acide acétique
- E) Les cellules utérines étant lugophiles, un col utérin sain deviendra brun après badigeonnage au lugol

**QCM 8 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le péritoine viscéral se dépose sur le corps et le fond de l'utérus
- B) En dehors des petites lèvres on retrouve le sillon inter-labial
- C) En dedans des petites lèvres on retrouve le vestibule
- D) La commissure labiale postérieure des petites lèvres forme le frein du clitoris
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) vraie(s) :**

- A) Les glandes urétrales de Skene permettent la lubrification vaginale
- B) Au niveau de son corps, le clitoris est rattaché à la symphyse pubienne par le ligament suspenseur du clitoris
- C) Le nerf pudendal innerve le périnée
- D) Le NFCP est un élément de stabilité des organes génitaux.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 10 : À propos de l'appareil génital féminin, on peut dire que : (*inspiré des annales*)**

- A) C'est au niveau des plis palmés du corps de l'utérus que se développe les cancers du col (à la jonction corps/col)
- B) L'aile supérieure du ligament large est sous-tendu par l'artère ovarienne
- C) Un cancer de l'ovaire pourra rapidement donner des métastases péritonéales
- D) Le toucher vaginal permet d'explorer le recessus recto-utérin (de Douglas)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 11 : À propos de l'appareil génital féminin (AGF), donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il comporte 2 parties : externe et interne (= pudendum)
- B) Les oviductes sont bilatérales et permettent le transfert de l'œuf
- C) L'ensemble de l'AGF est sous-péritonéal
- D) L'ensemble de l'AGF est péritonisé
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 12 : À propos du périnée cutané, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) On l'appelle aussi périnée superficiel
- B) On le compare à un losange composé de deux triangles, gauche et droit
- C) Il est limité en avant par la symphyse pubienne et en arrière par le coccyx
- D) Il est composé des grandes et petites lèvres, du clitoris, de différentes glandes et du méat urétral (non exhaustif)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 13 : À propos du périnée cutané, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le mont de Vénus est en regard de la symphyse pubienne
- B) Les petites lèvres sont appelées « nymphes »
- C) Les glandes para-urétrales de Skene sont bilatérales et de part et d'autre du vagin
- D) Les glandes vestibulaires majeures sécrètent un liquide lubrifiant différent de la cyprine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 14 : À propos du périnée cutané, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'hymen peut prendre 4 formes différentes selon la vie génitale de la femme
- B) L'hymen est une membrane imperméable physiologiquement, et qui se percera lors d'un premier rapport
- C) Le clitoris et le bulbe vestibulaire (muscle en cornet) sont les corps érectiles de la femme
- D) Les corps érectiles sont superficiels
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 15 : À propos du périnée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le triangle antérieur est centré sur la fente uro-génitale
- B) Le triangle supérieur est innervé par le nerf pudendal en partie
- C) Le triangle postérieur est centré sur l'anus
- D) Le triangle inférieur est vascularisé par l'artère rectale inférieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 16 : À propos de l'appareil génital interne, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'ensemble de l'appareil génital est intra-péritonéal
- B) L'ovaire est non péritonisé
- C) Le vagin est l'organe de la gestation
- D) Les oviductes sont bilatérales au niveau des cornes de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 17 : À propos du périnée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il a la forme d'un losange, séparé en 2 triangles, antérieur et postérieur
- B) Le triangle antérieur est inférieur et centré sur la fente uro-génitale
- C) Non, il est supérieur et centré sur l'orifice anal
- D) Le triangle postérieur est inférieur et centré sur l'orifice uro-génitale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 18 : À propos du périnée, quelles sont ses délimitations :**

- A) La symphyse pubienne, en avant
- B) Le promontoire, en arrière
- C) Les tubérosités ischiatiques, en latéral
- D) Le rectum, en bas
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 19 : À propos des différentes formes d'hymen, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il existe 4 formes d'hymen chez la femme vierge
- B) L'hymen de la femme primipare possède des caroncules hyménéales
- C) L'hymen de la femme nullipare possède des caroncules myrtiformes
- D) L'hymen de la femme multipare n'existe pas
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 20 : À propos du périnée, donnez la (les) proposition(s) exactes(s) :**

- A) Le triangle antérieur est innervé en partie par les rameaux antérieur de L1 et L2
- B) Le nerf pudendal est formé par les rameaux postérieurs de S2/S3/S4
- C) Le nerf rectal inférieur est issue de S3
- D) L'artère rectale inférieure est issue de S4
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 21 : À propos du péritoine et de ses réflexions, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'ovaire est intra-péritonéal et péritonisé
- B) La partie supérieure du vagin (au niveau du col de l'utérus) est péritonisé et forme en arrière le cul-de-sac recto-vaginal
- C) L'utérus est péritonisé sur ses faces supérieures et inférieures mais pas latérales
- D) La face supérieure de la vessie est péritonisé et forme en arrière le cul-de-sac utero-vésical
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 22 : À propos du périnée, donnez la (les) proposition(s) exactes(s) :**

- A) Le triangle antérieure (ou supérieur) est centré sur l'orifice de l'urètre et celui du vagin
- B) Le triangle inférieur (ou postérieur) est centré sur l'anus
- C) Le périnée est délimité en latéral par les épines ischiatiques droite et gauche
- D) En avant il délimité par la symphyse pubienne, et en arrière par le coccyx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 23 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il existe 8 formes d'hymen
- B) Nullipare signifie qu'une femme n'a pas encore subi d'accouchement
- C) Primipare signifie « qui a subi un ou plusieurs accouchements »
- D) Multipare signifie que la femme est ménopausée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 24 : À propos du périnée musculaire, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il est superficiel
- B) La contraction des muscles en cornet permet l'érection féminine
- C) Le muscle constricteur de la vulve se trouve en dehors du bulbe-spongieux
- D) Le vestibule est en dedans des petites lèvres
- E) On retrouve les muscles transverses à droite et à gauche

**QCM 25 : À propos de l'hymen, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'hymen est physiologiquement imperforé, il se perforera lors des premières règles
- B) L'hymen semi-annulaire est une forme d'hymen de la femme vierge
- C) Les caroncules hyménéales sont typiques de la femme nullipare
- D) Les caroncules myrtiformes sont présents chez la femme multipare, et ont la forme de myrte
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 26 : À propos de l'innervation du périnée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'ensemble du triangle antérieur est innervé par L1 et L2
- B) Le nerf pudendal innerve le triangle postérieur en entier
- C) Le triangle inférieur est innervé par les rameaux postérieurs de S2/S3/S4
- D) Le périnée reçoit une innervation du système nerveux végétatif
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 27 : À propos du périnée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les petites lèvres se rejoignent par deux commissures labiales (antérieure et postérieure)
- B) La commissure labiale antérieure forme le capuchon du clitoris
- C) La commissure labiale postérieure forme le frein du clitoris
- D) Les différentes glandes du périnée se trouvent entre petites et grandes lèvres
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 28 : À propos du périnée cutanée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les glandes urétrales sont également appelées glandes de Skene
- B) De part et d'autre du méat urétéral on trouve des glandes sécrétant un liquide lubrifiant différent de la cyprine
- C) Les Bartholinites entraînent une hypertrophie des glandes vestibulaires majeures entraînant une production excessive de cyprine
- D) Les grandes lèvres sont aussi appelées nymphes
- E) En regard de la symphyse pubienne on retrouve le mont de Vénus (ou mont du pubis)

**QCM 29 : À propos du périnée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le triangle uro-génital est innervé par L1
- B) Le triangle anal est innervé par L4
- C) Le triangle antérieur est innervé par le nerf pudendal
- D) Le triangle postérieur est innervé par le nerf pudendal
- E) Le triangle inférieur est innervé par L2

**QCM 30 : Quels sont les nerfs innervant le périnée cutané antérieur**

- A) S2
- B) L1
- C) L2
- D) L3
- E) S4

**QCM 31 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'angle vaginal fait 60°
- B) Le frein du clitoris est recouvert par le capuchon
- C) Le clitoris est rattaché à la symphyse pubienne via le muscle érecteur du clitoris
- D) Les bulbes vestibulaires sont composés de 2 parties chacun
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 32 : À propos du périnée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) On peut retrouver un hymen cribiforme chez la femme vierge
- B) Les Bartholinites peuvent entraîner une sécheresse vaginale
- C) Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent à la partie supérieure du vestibule
- D) Certains muscles en cornet, comme le muscle constricteur de la vulve, s'effacent à mesure des accouchements
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 33 : À propos du vagin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il se projette sur la symphyse pubienne
- B) Il est en arrière et en-dessous de la vessie
- C) Le fornix (= voûte du vagin) accueille le col de l'utérus et est accessible au toucher rectal
- D) Il possède 2 faces qui forment une cavité réelle
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 34 : À propos du vagin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s)**

- A) Sa face antérieure à l'aspect d'un palais de chien
- B) Le trigone vaginal est la projection du trigone utérin
- C) Les rides transversales de la face antérieures sont peu marquées car elles s'estompent avec l'âge, alors que celles de la face postérieure sont très marquées
- D) Il est composé de 3 tuniques. La tunique externe correspond au péritoine tandis que la tunique interne correspond à une conjonctive
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 35 : À propos de l'utérus, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'utérus est rétroversé et rétrofléchi physiologiquement
- B) On distingue le fond, le corps et le col (endocol + exocol) (liste exhaustive)
- C) 2 ligaments partent de la partie supéro-latérale du corps de l'utérus : ligament rond et ligament large
- D) Le col utérin varie selon la vie génitale de la femme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 36 : À propos des tuniques de l'utérus, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'utérus comporte 4 tuniques
- B) Le péritoine (tunique externe) se trouve sur les faces supérieures et inférieures
- C) Le fascia utérin tapisse, en dedans, le péritoine
- D) Le myomètre (tunique moyenne) est formé de 3 couches de fibres musculaires lisses
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 37 : À propos des trompes et de l'ovaire, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les trompes sont formées de 4 portions : intra-utérine, isthme, ampoule, pavillon
- B) Les trompes sont péritonisées
- C) L'infundibulum s'ouvre dans la cavité utérine et possède des franges, notamment la frange ovarique qui recouvre l'ovaire
- D) L'ovaire est une glande amphicrine, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un rôle exocrine (ovulation) et endocrine (oestrogènes/progestérone)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 38 : À propos de l'utérus, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le fond de l'utérus est aussi appelé lac spermatique
- B) Le myomètre est composé de 3 couches de fibres musculaires lisses
- C) L'endomètre est la tunique interne de l'utérus
- D) Le col utérin est composé de l'isthme, de l'endocol et de l'exocol
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 39 : À propos des trompes, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les trompes sont entièrement péritonisées
- B) L'ampoule est le lieu de la fécondation
- C) La grossesse peut avoir lieu dans la trompe en physiologie
- D) La position des trompes varie au cours de la vie sexuelle de la femme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 40 : À propos des ovaires, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'ovaire possède une corticale (périphérique) et une médulla (centrale)
- B) La corticale de l'ovaire sécrète la progestérone
- C) Le méso de l'ovaire est appelé mésovarium
- D) L'ovaire est rattaché à l'utérus via la trompe
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 41 : À propos du vagin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il se projette sur le foramen obturé
- B) Il fait un angle de 80° avec l'horizontal
- C) C'est un organe élastique
- D) Il est accessible au spéculum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 42 : À propos des organes génitaux féminins, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) On retrouve le col de l'utérus sur la paroi postéro-sup du vagin
- B) La colonne antérieure du vagin est en rapport avec l'uretère féminin
- C) Le col utérin est accessible au toucher vaginal
- D) Le ligament rond rejoint les grandes lèvres
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 43 : À propos des organes génitaux interne féminins, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le vagin se projette sur l'ischion
- B) Le vagin se dirige vers le bas et l'arrière
- C) Le toucher vaginal permet d'examiner le col et le corps de l'utérus
- D) Le vagin est élastique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 44 : À propos des organes génitaux interne féminins, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le trigone vaginal est la projection du trigone vésical
- B) La cavité vaginale est réelle
- C) La tunique interne est un épithélium pavimenteux
- D) L'utérus à la forme d'un tronc de cône aplati
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 45 : À propos des organes génitaux interne féminins, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'utérus est seulement péritonisé sur sa face supérieure
- B) Le myomètre est formé de cellules musculaires striées
- C) L'endomètre est rosé et lisse
- D) Le col de l'utérus a un aspect en « museau de tanche »
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 46 : À propos des organes génitaux interne féminins, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le cancer du col de l'utérus touche majoritairement la femme âgée
- B) Les tumeurs du myomètre sont appelées myomes
- C) La séreuse des trompes utérines est la partie la plus interne
- D) Le ligament utero-ovarien part en avant des cornes utérines et rattache l'ovaire à l'utérus
- E) La médulla de l'ovaire sécrète l'oestrogène

**QCM 47 : À propos des organes génitaux interne féminins, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) La trompe de la femme multipare à une direction transversale
- B) L'ovaire de la multipare est en avant de l'uretère
- C) L'ovaire de la femme nullipare est en arrière de l'uretère
- D) Le rôle exocrine de la corticale ovarienne est la sécrétion de progestérone
- E) Le mésovarium est sous-tendu par le ligament utero-ovarien

**QCM 48 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le Noyau Fibreux central est un élément de stabilité des organes du petit bassin
- B) Au niveau de l'exocol l'endomètre forme des plis palmés
- C) La trompe est entièrement péritonisée
- D) L'utérus se projette sur le col de fémur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 49 : À propos des réflexions du péritoine, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il recouvre les parois antérieures et postérieures du vagin
- B) Il forme une ligne de réflexion autour de l'ovaire, le mésovarium
- C) Le cul-de-sac utérovésical est aussi appelé cul-de-sac de Douglas
- D) Sur les parois latérales de l'utérus les lignes de réflexions du péritoine forment le ligament large
- E) Le fond de l'utérus est recouvert de péritoine

**QCM 50 : À propos du ligament large, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le ligament large est composé du mésomètre, du paramètre et de la zone des ailerons
- B) La zone des ailerons est la seule zone non péritonisée du ligament large
- C) Le paramètre est la zone plus effilée du ligament large
- D) Le ligament rond sous-tend l'aileron supérieur
- E) Le ligament rond sous-tend le méso-funiculaire

**QCM 51 : À propos de l'AGF, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Pour dépister un cancer du corps de l'utérus on peut utiliser de l'acide acétique
- B) Le col de l'utérus est rosé et sa forme varie au cours de la vie d'une femme
- C) L'isthme est la partie la plus dilatée de l'oviducte et est le lieu de la fécondation
- D) La corticale de l'ovaire contient les follicules ovariens
- E) L'orifice vaginale à un aspect en « museau de tanche »

**QCM 52 : Parmi ces ligaments, le ou lesquel(s) sous-tendent le ligament large ?**

- A) Ligament rond
- B) Ligament sacro-utérin
- C) Ligament sacro-épineux
- D) Ligament utéro-ovarien
- E) Ligament lombo-ovarien

**QCM 53 : À propos de l'AGF, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Un tissu conjonctif recouvre les parties latérales de l'utérus
- B) La tunique interne de l'utérus a 3 couches
- C) Le ligament rond part en avant des cornes de l'utérus et vient se perdre dans les petites lèvres
- D) Le trigone vaginal (sur le face antérieure du vagin) est la projection du trigone vésicale
- E) La colonne postérieure du vagin est en rapport avec l'urètre féminin

**QCM 54 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) La clé de voute du périnée se trouve entre le vagin et le rectum
- B) Les cancers du col utérin ont lieu à la jonction isthme/endocol
- C) En cas de grossesses extra-utérines, il y a un risque de déchirure de la trompe
- D) Le col utérin d'une femme n'ayant jamais eu d'enfant est annulaire et régulier
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 55 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les cellules vaginales sont lugophiles
- B) Les cellules du col utérin sont acidophiles
- C) Lors d'un dépistage du cancer du col utérin au lugol, on fera la biopsie dans la zone où les cellules se sont colorés, témoignant de la présence de cellules cancéreuses
- D) En cas de péritonite, les substances purulentes s'accumulent dans le cul-de-sac recto-utérin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 56 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le récessus recto-utérin (de Douglas) est bordé par le torus uterinus
- B) Sur une coupe sagittale du ligament large on retrouve deux éléments fibreux (ligament lombo-ovarien et utéro-sacré)
- C) L'articulation entre le vagin et le col utérin est appelé cul-de-sac cervico-vaginal (=fornix)
- D) Le fornix est le lac spermatique (lieu de l'éjaculation)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 57 : À propos du ligament large, on peut dire que : (relu par le professeur Baque)**

- A) L'aileron postérieur est sous-tendu par le ligament utéro-sacré
- B) L'aileron supérieur est sous-tendu par le ligament lombo-ovarien
- C) C'est une formation péritonéale paire et symétrique sur les bords latérales de l'utérus
- D) Les vaisseaux iliaques externes y circulent
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 58 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) vraie(s) :**

- A) Les glandes urétrales de Skene permettent la lubrification vaginale
- B) Au niveau de son corps, le clitoris est rattaché à la symphyse pubienne par le ligament suspenseur du clitoris
- C) Le nerf pudendal innerve le périnée
- D) Le NFPC est un élément de stabilité des organes génitaux.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 59 : Chez une femme adulte vierge et nullipare examinée et installée en position de taille ou gynécologique on peut :**

- A) Constater au toucher rectal, que l'orifice du col utérin est annulaire et régulier
- B) Retrouver un hymen cribiforme
- C) Voir le capuchon du clitoris en avant et au dessus du corps du clitoris
- D) Retrouver des poils de section polygonal au niveau du vestibule
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 60 : À propos des angles du vagin on peut dire que**

- A) L'angle vaginal est de 135°
- B) L'angle d'antéflexion de 135°
- C) L'angle d'antéversion est de 90°
- D) Son grand axe passe par S2
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 61 : À propos des annexes de l'utérus, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le ligament rond traverse l'orifice inguinal profond
- B) Le ligament utéro-ovarien rejoint le pôle inférieur de l'ovaire
- C) Le ligament lombo-ovarien provient de l'aorte
- D) La frange de Richard est la seule qui ne soit pas libre dans la cavité péritonéale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 62 : À propos des pathologies de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Une maladie infectieuse peut être à l'origine de synéchie
- B) Les douleurs pelviennes peuvent avoir de nombreuses origines, surtout à gauche
- C) En cas de grossesse extra-utérine avec déchirure de la trompe, l'artère utérine se rompt brutalement. C'est une urgence vitale
- D) Une stérilité tubaire peut être d'origine tubaire (synéchies) mais pas péritonéale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 63 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'orifice du vagin est centré sur l'épine sciatique
- B) L'ovaire est dans la convexité de la trompe
- C) Le col utérin s'appuie sur la paroi postérieure et inférieure du vagin
- D) À l'examen gynécologique c'est surtout la paroi antérieure et supérieure qui sera visible
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 64 : À propos de la vascularisation et de l'innervation de l'appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les vaisseaux iliaques sont recouverts de péritoine
- B) L'artère utérine donne l'artère ovarique
- C) Le périnée est innervé par le 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> nerf lombaire spinal
- D) L'artère hypogastrique vascularise tous les organes pelviens
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 65 : À propos de l'innervation et de la vascularisation de l'appareil génital féminin, on peut dire que :**

- A) Le périnée est innervé par les 1<sup>er</sup>, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> myélomères sacrés
- B) Le tronc postérieur de l'artère iliaque interne donne des artères pour le vagin, l'utérus, le rectum et la vessie
- C) L'artère utérine est tortueuse car elle doit pouvoir se dilater lors de la grossesse
- D) L'artère ovarique s'anastomose avec les arcades ovariennes et tubaires, qui elles-mêmes sont des branches de l'artère utérine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 66 : À propos des différents moyens de stabilité et de fixité de l'appareil génital féminin, on peut dire que :**

- A) Le noyau fibreux central du périnée est un élément de stabilité
- B) Le ligament lombo-ovarien est issue de l'aorte et rejoint le pôle inférieur de l'ovaire
- C) Le ligament utéro-sacré participe à la formation du torus utérinus
- D) Le ligament rond s'étend du mont du pubis jusqu'aux petites lèvres
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses