

Examen LE VRAI : Épreuve ECUE 09 – Anatomie Petit Bassin

Tutorat 2023-2024



QCM 1 : Concernant le testicule, indiquez-la ou les propositions(s) exacte(s) :

- A) Le muscle dartos sous cutané est un résidu du muscle peaucier de l'abdomen des mammifères
- B) Le fascia crémasterique interne est situé entre le testicule et la séreuse vaginale testiculaire
- C) Le fascia crémasterique interne est un prolongement du fascia superficialis de l'abdomen
- D) Un épanchement de liquide entre les 2 feuillets de la vaginale testiculaire s'appelle un hydrocèle testiculaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : Concernant la vascularisation du testicule, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les artères génitales (testiculaires) sont issues de l'aorte au niveau de T12
- B) Les artères vésiculo-déférentielles sont une branche de l'artère iliaque externe
- C) La veine génitale droite se draine dans la veine rénale droite
- D) La veine génitale gauche se draine directement dans la veine cave inférieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : Concernant la paroi pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le muscle piriforme est situé entre le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéroux
- B) Le muscle obturateur interne est inséré sur la membrane obturée et sort du petit bassin par la grande incisure ischiatique
- C) Le muscle obturateur interne est inséré sur la membrane obturée et sort du petit bassin par la petite incisure ischiatique
- D) Le ligament sacro-épineux est plus antérieur que le ligament sacro-tubéroux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 4 : Concernant le diaphragme pelvien, indiquez la ou les proposition (s) exacte(s) :

- A) On retrouve à sa face profonde 2 muscles avec le muscle ilio-coccygien le plus profond et le muscle pubo-coccygien au dessus du précédent qui est plus dynamique et plus épais
- B) Le muscle pubo-coccygien présente un faisceau pubo-vésical et pubo-prostatique puis un faisceau pubo-périnéal, un faisceau pubo-rectal et un faisceau pubo coccygien
- C) Le muscle pubo-coccygien est responsable de la continence anale en augmentant l'angle du cap anal (angle anorectal)
- D) Le cap anal est ouvert en arrière avec un angle de 110°
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 5 : Concernant la prostate indiquez-la ou les proposition(s) exacte (s) :

- A) Le toucher rectal permet la palpation du pôle antérieur de la prostate
- B) L'isthme prostatique est situé en arrière de l'urètre et représente le plus gros volume de parenchyme prostatique réparti en lobe droit et gauche
- C) La prostate crâniale est appelée plan rétro séminal et sera le site préférentiel du cancer de la prostate souvent responsable de dysurie
- D) La prostate caudale ou périphérique est dépendante des œstrogènes et sera le site préférentiel des adénomes de prostate qui est rarement responsable de dysurie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : Concernant les organes génitaux féminins indiquez la ou les proposition(s) exacte(s):

- A) L'ensemble des organes génitaux féminins sont sous-péritonéaux sauf l'ovaire qui est non péritonisé et intrapéritonéal
- B) Le périnée cutané est de forme losangique avec un triangle antérieur uro-génital et un triangle postérieur anal
- C) Les $\frac{3}{4}$ antérieurs du périnée cutané sont innervés par les nerfs spinaux L1L2
- D) Les $\frac{3}{4}$ antérieurs du périnée cutané sont innervés par les nerfs spinaux S2S3S4 formant le nerf pudendal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : Concernant le périnée cutané, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le clitoris présente un frein antérieur et un capuchon postérieur
- B) Le méat urétral est situé en avant du clitoris et il est entouré des glandes para-urétrales (de Skène) sécrétant un lubrifiant
- C) A la partie postérieure du vestibule on retrouve les glandes vestibulaires majeures dont l'inflammation peut donner une Bartholinite
- D) Les grandes lèvres et les petites lèvres sont séparées par le sillon interlabial
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Concernant la vulve de la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'hymen annulaire, semi-lunaire ou cribliforme sont spécifiques de la femme ayant déjà accouché
- B) L'hymen avec des caroncules hyménales est spécifique de la femme vierge
- C) L'hymen avec des caroncules myrtiforme se retrouve chez la femme ayant déjà accouché
- D) Le clitoris présente un corps, un genou et un gland
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : Concernant les organes génitaux internes de la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le trigone vaginal est situé sur la paroi postérieure du vagin sous le col de l'utérus
- B) L'utérus est le plus souvent antéversé et il est composé d'un fond, d'un corps, d'un isthme et d'un col de l'utérus
- C) L'utérus est fixé aux grandes lèvres par le ligament rond de l'utérus
- D) L'utérus présente une tunique externe (sérosuse péritonéale sur le fond et fascia utérin latéralement) ainsi qu'une tunique musculaire (le myomètre) et une tunique interne (l'endomètre)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : Concernant les organes génitaux internes de la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) La fécondation se fait en général au niveau de l'ampoule de l'oviducte
- B) L'ovaire est une glande endocrine et exocrine
- C) L'examen au spéculum d'une femme nullipare retrouve un col avec plusieurs diverticules et irrégularités
- D) Le col utérin sain présente une couleur rosée après badigeonnage avec de l'acide acétique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : Concernant le col de l'utérus, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Après badigeonnage avec de l'acide acétique, le cancer du col de l'utérus est de couleur blanche
- B) Le col utérin sain présente une couleur rosée après badigeonnage avec de lugol
- C) Après badigeonnage avec de lugol, le cancer du col de l'utérus est de couleur blanche
- D) Après badigeonnage avec de lugol, le cancer du col de l'utérus est de couleur acajou
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : Concernant le ligament large, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) La partie basse du ligament large est formée par le mésomètre en bas et le paramètre en haut
- B) L'aileron antérieur du ligament large se forme autour de l'oviducte (la trompe) et s'appelle le mésosalpinx
- C) L'aileron supérieur du ligament large se forme autour du ligament rond et s'appelle le mésofuniculaire
- D) L'aileron supérieur du ligament large se forme autour de l'ovaire et s'appelle le mésovarium
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : Concernant les organes uro-génitaux, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les chaînes lymphatiques iliaque interne et iliaque externe se drainent vers les chaînes lymphatiques aorto-cave pour se drainer par le conduit thoracique
- B) Le sphincter strié de l'urètre est situé entre le pôle inférieur de la vessie et la prostate
- C) Le canal déférent passe sous l'uretère pour rejoindre le pôle postérieur de la prostate
- D) La prostate a une forme de châtaigne avec une base inférieure et un bec supérieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : Concernant l'urètre masculin, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sinus prostatique présente à sa partie haute l'ouverture des 2 canaux éjaculateurs et à sa partie basse l'ouverture de l'utricule prostatique
- B) Au moment de l'éjaculation, l'influx parasympathique permet la contraction du sphincter lisse de la vessie qui limite l'éjaculation rétrograde
- C) Au moment de l'éjaculation, l'influx orthosympathique amène la contraction des vésicules séminales et de la prostate ce qui permet l'éjaculation vers le méat urinaire
- D) Au niveau de l'urètre bulbaire masculin, on retrouve des glandes bulbo-spongieuses responsable de la lubrification
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : Concernant la coupe sagittale du petit bassin de la femme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s):

- A) On retrouve d'avant en arrière le pubis, la vessie, l'utérus et le vagin, le rectum puis le sacrum
- B) L'orifice du vagin est situé entre l'urètre et le clitoris
- C) Un fascia vésico-vaginal sépare la paroi postérieure de la vessie et la paroi antérieure du vagin
- D) Un cul de sac péritonéal recto-vagino-utérin est le point le plus déclive de la cavité péritonéale et un épanchement à ce niveau peut être palpé par le toucher rectal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses