

CORRECTION OFFICIEUSE DU CONCOURS 2011-2012

UE 9 : ANATOMIE DU PETIT BASSIN DE LA FEMME



QCM n°1 : Réponse A

- A) VRAI
 - B) FAUX : ce QCM ne concerne que le bord antérieur de l'os coxal.
 - C) FAUX
 - D) FAUX
 - E) FAUX : ce QCM ne concerne que le bord antérieur de l'os coxal.
- pour ce QCM il suffit de vous reporter au schéma de la vue latérale/médiale de l'os coxal.

QCM n°2 : Réponses A, B, C et D

- A) VRAI
- B) VRAI
- C) VRAI : c'est une symphyse possédant un fibrocartilage.
- D) VRAI : bien faire attention entre la notion de ligament de « renforcement » et ligament « à distance ».
- E) FAUX

QCM n°3 : Réponses A, B, C et D

- A) VRAI
 - B) VRAI
 - C) VRAI
 - D) VRAI
 - E) FAUX
- pour ce QCM c'était cadeau, tout est dans le 1^{er} cours et à été abordé à la tut' rentrée.

QCM n°4 : Réponses A, B et C

- A) VRAI
- B) VRAI
- C) VRAI : il est sur la pôle inférieure qui regarde en avant et en dehors, donc il se trouve dans un plan oblique en bas en avant et en dehors.
- D) FAUX : l'épine ischiatique est entre la grande et la petite incisure ischiatique et non fémorale.
- E) FAUX

QCM 5 : Réponse E

- A) FAUX : le drainage lymphatique de la vulve se fait vers les nœuds inguinaux superficiels
- B) FAUX : elle est innervée par le nerf pudendal (issu essentiellement de S3)
- C) FAUX : le mont de venus/du pubis est une masse grasseuse recouverte de peau et de poils à section polygonale de type sexuel
- D) FAUX : les glandes vestibulaires majeures de Bartholin s'ouvrent dans le vestibule du vagin. Ce sont les glandes urétrales de Skene qui s'ouvrent dans le canal de l'urètre !
- E) VRAI

QCM 6 : Réponses A, B

- A) VRAI : le muscle ilio-coccygien (partie sphinctérienne du levator ani) s'insère sur le fascia de l'obturateur interne
- B) VRAI :
- C) FAUX : car on parle dans l'énoncé des muscle du périnée et du levator ani
- D) FAUX : les muscles transverses superficiels et profonds appartiennent au périnée musculaire, qui se situe en DESSOUS du diaphragme pelvien et donc en DESSOUS du muscle levator ani.
- E) FAUX

QCM n°7 : Réponses A, B et C

- A) VRAI
- B) VRAI
- C) VRAI
- D) FAUX : le vagin est dirigé en haut oui, mais en arrière et non en avant !
- E) FAUX

QCM 8 : Réponse A

- A) VRAI
- B) FAUX : l'examineur PEUT atteindre le cul-de-sac recto-vaginal de Douglas, en introduisant l'index et le majeur dans le vagin
- C) FAUX : il correspond au point le plus déclive de la cavité péritonéale (= le plus bas)
- D) FAUX : la partie la plus basse de la cavité péritonéale (cul-de-sac recto-vaginal de Douglas) se trouve entre le vagin et le rectum
- E) FAUX

QCM9 : Réponse D

- A) FAUX : l'A. Utérine vascularise également, par ses collatérales, le vagin, l'ovaire, la vessie, les trompes et le ligament rond
- B) FAUX : la principale artère vascularisant la vessie est l'A. Ombilicale
- C) FAUX : l'A. Obturatrice est une collatérale de l'A. Iliaque INTERNE. (Appartenant au tronc ANT)
- D) VRAI
- E) FAUX

QCM 10 : Réponse A OU E

- A) ITEM PROBLEMATIQUE : selon les années et les schémas, les versions ne sont pas les mêmes...
- B) FAUX : L'aileron SUP est sous-tendu par la trompe de Fallope formant ainsi le MESOSALPYNX
- C) FAUX : L'aileron ANT est sous-tendu par le ligament rond
- D) FAUX : L'aileron POST est sous-tendu par le ligament utéro-ovarien formant le MESOVARIUM
- E) VRAI ou FAUX.

QCM 11 : Réponse A

- A) VRAI : lors de la contraction des muscles ischio-caverneux, leur tendon comprime les veines du clitoris. Il y a alors diminution du retour veineux entraînant l'augmentation de l'intumescence clitoridienne.
- B) FAUX : le muscle de l'hymen n'existe pas.
- C) FAUX : C'est l'hymen qui disparaît après le premier coït complet
- D) FAUX : le muscle transverse profond s'insère sur l'ischion et le noyau fibreux central du périnée
- E) FAUX

QCM n°12 : Réponses A et B

- A) VRAI
- B) VRAI
- C) FAUX : ce sont les uretères qui s'abouchent à la face postérieure de la vessie au niveau d'un triangle qu'ils délimitent avec l'urètre et où se trouve le détrusor. L'urètre lui prend naissance au niveau du col vésical.
- D) FAUX : le détrusor est innervé par le contingent parasymphatique du plexus hypogastrique inférieur issu des rameaux sacrés S2 – S3 – S4 et non lombaires.

E) FAUX

QCM 13 : Réponse C

- A) FAUX
- B) FAUX
- C) VRAI : La lame SRGP est l'élément essentiel de la fixité de l'utérus (se trouve dans le paramètre/paranèvre)
- D) FAUX : le noyau fibreux central du périnée est le moyen de fixité du vagin, pas de l'utérus.
- E) FAUX

QCM 14 : Réponses C

- A) FAUX : l'artère gonadique est un rameau de l'aorte
- B) FAUX : l'ovaire est vascularisé par l'A. Gonadique, le rameau Ovarique de l'A. Utérine et par le rameau Tubaire qui peut rejoindre le tout
- C) VRAI
- D) FAUX : l'A. Utérine présente un trajet godronné ascendant caractéristique, sur les parois LAT du corps de l'utérus.
- E) FAUX

QCM n°15 : Réponses A, B, C et D

- A) VRAI
 - B) VRAI
 - C) VRAI
 - D) VRAI
 - E) FAUX
- rien de compliquer dans ce QCM, tout est dans le fameux schéma important +++ présentant une section frontale du rectum.