

# Séance de QCMs n°1 : UE12

Tutorat 2012-2013 : Cours de 27 mars 2013



Donner la ou les réponse(s) juste(s) ?

**QCM 1 : A propos du crâne :**

- A) L'écaille du temporal et la grande aile du sphénoïde limitent la fosse temporale
- B) L'écaille du temporal s'articule avec l'os occipital
- C) La suture coronale ou suture pariéto-frontale se situe dans un plan frontal
- D) Le point lambda est visible sur une vue supérieure, postérieure et antérieure du crâne
- E) Aucune des réponses n'est correcte

**QCM 2 : A propos de la cavité orbitaire :**

- A) Elle peut être schématiquement représentée par une pyramide à base antérieure et sommet postéro-latéral
- B) Elle est couchée sur sa face inférieure qui est essentiellement constituée par l'os maxillaire
- C) Elle est perforée par le trou optique qui laisse passer le nerf ophtalmique et l'artère ophtalmique de Willis
- D) La fissure orbitaire supérieure sépare la grande aile du sphénoïde et la petite aile du sphénoïde
- E) Aucune des réponses n'est correcte

**QCM 3 : Parmi ces os du crâne, quels sont ceux qui sont paires ?**

- A) Os frontal
- B) Os sphénoïde
- C) Os maxillaire
- D) Mandibule
- E) Aucune des réponses n'est correcte

**QCM 4 : Dans l'étage moyen de la base du crâne, on retrouve :**

- A) Les filets du nerf olfactif (I) traversant la lame criblée de l'ethmoïde
- B) L'hypophyse dans la selle turcique
- C) Le III, IV, V 1, VI passant par le trou rond
- D) le V 2 passant par le trou ovale
- E) Aucune des réponses n'est correcte

**QCM 5 : Dans le foramen magnum de l'occipital passe(nt) :**

- A) La moelle spinale et la dure mère
- B) Les plexus veineux rachidiens
- C) Le liquide cérébro-spinal (ou liquide cérébro-rachidien)
- D) Le contingent bulbaire des nerfs accessoires (XI bulbaire)
- E) Les artères vertébrales