

UE 9 : ANATOMIE DU PETIT BASSIN DE LA FEMME DEVOIR MAISON N°1/SEANCE DE REVISION

QCM n°1 : concernant les muscles du petit bassin, quelles sont les propositions justes ?

- A) Les muscles des parois du petit bassin appartiennent au membre inférieur
- B) Le tendon du muscle obturateur interne passe en arrière au niveau de la grande échancrure ischiatique
- C) Le muscle coccygien double le ligament sacro-tubéral
- D) La face supérieure du muscle levator ani regarde en haut et en dedans
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM n°2: à propos du périnée musculaire, donnez les propositions justes :

- A) Le sphincter strié de l'urètre fait parti des muscles du diaphragme périnéal
- B) Les muscles transverses sont tendus entre le pubis et le noyau fibreux central du périnée
- C) Le fascia périnéal profond est épais dans sa partie postérieure et flaccide dans sa partie antérieure
- D) Le fascia périnéal superficiel est épais dans sa partie postérieure et flaccide dans sa partie antérieure
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM n°3 : à propos du diaphragme pelvien, donnez les propositions justes :

- A) Le faisceau ilio-coccygien du levator ani s'insère sur le fascia du muscle obturateur interne
- B) Le faisceau pubo-coccygien du levator ani s'étend du pubis au coccyx
- C) Le faisceau pubo-rectal du levator ani s'insère sur le noyau fibreux central du périnée, le rectum et le coccyx
- D) Le muscle coccygien est tendu entre la grosse tubérosité ischiatique et le coccyx
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM n°4 : au sujet des vaisseaux du petit bassin, quelles sont les propositions justes ?

- A) Les artères iliaques communes se divisent en regard de l'articulation coxo-fémorale
- B) Le plan veineux iliaque est en avant du plan artériel iliaque
- C) Les uretères surcroisent les artères en regard du détroit supérieur
- D) L'artère ilio-lombaire peut se rompre lors des traumatismes du bassin avec fracture
- E) Au niveau du Triangle de Scarpa, on trouve du plus interne au plus externe : la veine fémorale, l'artère fémorale et le nerf fémoral

QCM n°5 : concernant la Lamelle Sacro-Recto-Génito-Pubienne, donnez les propositions justes :

- A) La lamelle SRGP est sous-tendue par les artères : obturatrice, utérine et rectales inférieures et moyennes
- B) Le ligament pubo-vésical correspond à l'aileron latéral de la lamelle SRGP
- C) L'aileron latéral de la lamelle SRGP est un élément constitutif du paramètre de l'utérus
- D) L'aileron dorsal relie le rectum à la paroi postérieure
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM n°6 : à propos de la vessie, quelles sont les propositions justes ?

- A) C'est l'organe chargé de la production de l'urine
- B) Elle a la forme d'une pyramide prolongée en avant et en haut par un apex
- C) La capacité maximale de la vessie est d'environ 2 litres
- D) Le sphincter lisse de la vessie correspond à une zone hypertrophiée de la tunique externe
- E) Au niveau de l'abouchement de l'uretère il existe une valve musculaire anti-reflux.

QCM n°7 : A propos du vagin, donnez les propositions justes :

- A) La colonne postérieure du vagin bifurque dans sa partie supérieure en regard du fundus de la vessie
- B) Le vagin est séparé du rectum par le cul de sac de Douglas, le septum recto-vésical et le noyau fibreux central
- C) Les rapports latéraux du vagin sont : la lame SRGP, le levator ani et le périnée
- D) Le drainage lymphatique du vagin se fait vers les nœuds lymphatiques hypogastriques
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM n°8 : un peu de clinique, quelles sont les propositions justes ?

- A) Le cul de sac recto-vaginal de Douglas est accessible par un toucher vaginal ou par un toucher rectal
- B) Les frottis vaginaux permettent notamment d'explorer le cycle menstruel
- C) L'angulation ano-rectal est la cause des problèmes de corps étrangers intra-rectaux
- D) La résection d'une tumeur rectale basse pose le problème de conservation de la continence
- E) Les cancers du rectum de type glandulaire touchent principalement les femmes

QCM n°9 : A propos de l'utérus, donnez les propositions justes :

- A) Le corps de l'utérus est relativement mobile
- B) L'endomètre correspond à la tunique moyenne de l'utérus
- C) Les ligaments ronds et utéro-ovariens s'insèrent au niveau des cornes de l'utérus
- D) Le ligament utéro-ovarien est plus grêle et plus antérieur que le ligament rond
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM n°10 : Concernant le drainage lymphatique du petit bassin, donnez les propositions justes :

- A) Le drainage lymphatique de l'utérus se fait en partie vers les nœuds inguinaux superficiels
- B) Le drainage lymphatique de l'utérus se fait en partie vers les nœuds du promontoire
- C) Le drainage lymphatique de l'ovaire gauche se fait en partie vers les nœuds rénaux gauches
- D) Le drainage lymphatique de l'ovaire se fait en partie vers les nœuds aorto-abdominaux
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM n°11 : A propos du ligament large, donnez les propositions justes :

- A) Le mésovarium correspond à l'aileron antérieur du ligament large
- B) Le mésovarium correspond à l'aileron postérieur du ligament large
- C) Le mésosalpinx correspond à l'aileron supérieur du ligament large
- D) Le paramètre correspond à la partie supérieure du ligament large
- E) Toutes les propositions sont fausses

QCM n°12 : concernant le rectum, quelles sont les propositions justes ?

- A) L'anus est l'orifice cutané périnéal de l'ampoule rectale
- B) L'angle ano-rectal est dû à la présence du muscle Levator Ani tel une fronde
- C) La muqueuse rectale est, de l'ampoule à l'anus, de type glandulaire digestive
- D) La sous-muqueuse est la zone de terminaison de la vascularisation
- E) Ainsi les plexus hémorroïdaires se trouvent dans la sous-muqueuse au niveau du canal anal

QCM n°13 : concernant la musculature rectale, quelles sont les propositions justes ?

- A) Elle est composée de 3 couches : plexiforme interne, circulaire moyenne et longitudinale externe
- B) Le sphincter lisse de l'anus est formé à partir d'un épaissement de la couche musculaire longitudinale externe
- C) Le muscle curigator cutis ani est formé par des fibres issues de la couche circulaire moyenne
- D) Le ligament inter-sphinctérien de Parks est tendu entre la musculature longitudinale externe du rectum et le muscle curigator cutis ani
- E) Le sphincter strié de l'anus est directement inséré sur le muscle Levator Ani

QCM n°14 : concernant la statique pelvienne, quelles sont les propositions justes ?

- A) Les femmes âgées multipares sont plus à risque d'avoir des prolapsus
- B) Ceci est dû à une distension répétée des éléments de la statique pelvienne devenu peu à peu défectueux
- C) Le muscle ilio-psoas s'insère sur le grand trochanter fémoral
- D) L'étoile fibreuse de Rogie est formée par l'épaississement du fascia pelvien pariétal
- E) Le vagin se trouve dans l'étage antérieur

QCM n°15 :

- A) Les septums vésico-vaginal et recto-vaginal interviennent dans le système de sustentation de la statique pelvienne
 - B) Le paramètre est tendu entre le col utérin et la paroi interne du pelvis
 - C) Les artères issues de l'artère hypogastrique et destinées à la vascularisation des viscères pelviens empruntent les ligaments constitutifs des lames sacro-recto-génito-vésico-pubiennes de Delbet
 - D) La coélio-scopie permet de voir les organes pelviens en vue inférieure
 - E) L'utérus est anté-versé grâce à un angle de 90°-110° ouvert en avant entre le vagin et l'utérus
-