Correction des QROC de dermatologie

QROC 1
Indice de Breslow (épaisseur de la lésion < 1mm)

QROC 2
Carcinome spinocellulaire ou carcinome épidermoïde

QROC 3
Carcinome basocellulaire

QROC 4
1) Phase vasculaire : hémostase
2) Phase de inflammatoire : détersion
3) Phase de réparation, épithélialisation et de maturation

QROC 5
1) Traitement des poussées : dermocorticoïde + Inhibiteur de la calcineurine + anti-hstaminique
2) Traitement d'entretien : Eviction de l'allergène + émollient + mesures d'hygiène + Vaccination
3) Traitement d'exception : Photothérapie + ciclosporine

QROC 6
Phase 1 : phase de sensibilisation → phase asymptomatique, premier contact avec l'haptène et sensibilisation des Lt naïf par les cellules présentatrice d'Ag

Phase 2 : phase de déclenchement ou de resensibilisation → Activation des LT patroulleurs en LT effecteurs

Phase 3 : phase de régulation par les LT régulateurs soit par inhibition direct avec les LT effecteurs ou par sécrétion de cytokines : TGFβ et IL10

QROC 7
Prélèvement : on coupe de façon stérile la vésicule au scalpel et on écouvillonne le plancher pour récupérer les cellules infectées. On fait 2 écouvillonnages (1 Virocult et 1 lame au lit du malade)

Examen virologique : Imunofluorescence sur le prélèvement

QROC 8
LT effecteurs
LT mémoires
LT régulateurs

QROC 9
1) Le nombre de mélanocytes
2) Capacité des mélanocytes à former des dendrites
3) Quantité et qualité de la mélanine
4) Transfert des mélanosomes des mélanocytes aux kératinocytes
5) Localisation et profondeur des pigments
6) Le taux de dégradation et d'élimination des mélanosomes
7) Ph à l'intérieur des mélanosomes

QROC 10
Etape 1 : Activation de la protéine p53 par les UV qui stimule l'expression de POMC.
Etape 2 : Dégradation de POMC en alpha-MSH

Etape 3 : sécrétion de alpha-MSH des kératinocytes aux mélanosomes
Etape 4 : Liaison de l'alpha-MSH à son récepteur transmembranaire MCR-1. Transduction du signal (voie de l'AMPc) qui active le gène MITF.
Etape 5 : La protéine MITF sera responsable de :

- la synthèse des enzymes de la mélanogenèse : Tyrosinase, DCT et TRP
- la synthèse des molécules de transports des mélanosomes : mélanophiline, myosine Va et RAB27

QROC 11
Hémoglobines, Mélanine et l'eau

QROC 12
Perte de substance cutanée superficielle guérissant sans séquelle cicatricielle

QROC 13

- Les médicaments : lithium, antiarythmique (béta bloquants, IEC), sevrage aux corticoïdes, AINS et APS (anti-paludéen de synthèse)
- Stress
- Infections bactériennes
- Alcool + VIH
- Traumatisme

QROC 14
Escarre

QROC 15
1) Différenciation et prolifération des mélanocytes
2) Diminution des cellules de Langerhans
3) Apoptose des lymphocytes T