

Les parois du petit bassin



Le diaphragme pelvien



Le périnée et diaphragme uro-génital

QCM 1 : A propos de la ceinture pelvienne. Donner les vraies :

- A) Les 2 os coxaux s'articulent entre eux en avant par la symphyse pubienne
- B) L'os coxal s'articule avec le sacrum en arrière par l'articulation sacro-iliaque
- C) Le sacrum est une pyramide à double convexité postérieure dans les plans horizontal et sagittal
- D) L'os coxal a la forme d'une hélice de bateau à 2 pâles avec un moyen central formé par l'acétabulum
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 1 : ABCD

- A) Les 2 os coxaux s'articulent entre eux en avant par la symphyse pubienne
- B) L'os coxal s'articule avec le sacrum en arrière par l'articulation sacro-iliaque
- C) Le sacrum est une pyramide à double convexité postérieure dans les plans horizontal et sagittal
- D) L'os coxal a la forme d'une hélice de bateau à 2 pâles avec un moyen central formé par l'acétabulum
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 2 : A propos du périnée.

Donner les vraies :

- A) Le périnée est constitué d'un périnée cutané et d'un périnée musculaire (= diaphragme uro-génital)
- B) Le périnée a dans son ensemble une forme losangique délimité en avant par le pubis, en arrière par le coccyx et latéralement par les ischions
- C) Le mont du pubis = mont du pudendum constitue la partie antérieure du triangle antérieur du périnée cutané
- D) Le périnée est situé en-dessous du diaphragme pelvien
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 2 : ABCD

- A) Le périnée est constitué d'un périnée cutané et d'un périnée musculaire (= diaphragme uro-génital)
- B) Le périnée a dans son ensemble une forme losangique délimité en avant par le pubis, en arrière par le coccyx et latéralement par les ischions
- C) Le mont du pubis = mont du pudendum constitue la partie antérieure du triangle antérieur du périnée cutané
- D) Le périnée est situé en-dessous du diaphragme pelvien
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 3 : A propos du périnée cutané en vue gynécologique. Donner les vraies :

- A) Le sillon génito-pectoral sépare les membres inférieurs du périnée cutané
- B) La position genu-pectoral correspond à la position d'étude du périnée cutané, cuisse en l'air et jambes écartées
- C) Le mont du pubis ou mont du pudendum contient de la graisse pour rendre la copulation plus confortable
- D) La vulve se trouve en arrière de la symphyse pubienne, elle est antérieure et frontale après la puberté
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 3 : BC

A) Le sillon génito-pectoral sépare les membres inférieurs du périnée cutané

B) La position genu-pectoral correspond à la position d'étude du périnée cutané, cuisse en l'air et jambes écartées

C) Le mont du pubis ou mont du pudendum contient de graisse pour rendre la copulation plus confortable

D) La vulve se trouve en arrière de la symphyse pubienne, elle est antérieure et frontale après la puberté

E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 4 : A propos du diaphragme pelvien. Donner les vraies :

- A) Le muscle levator ani, principal muscle du diaphragme pelvien, a la forme d'un entonnoir
- B) Le muscle coccygien est tendu entre l'épine du pubis et le sacrum et le coccyx
- C) Le muscle piriforme, petit muscle du diaphragme pelvien, est entouré de son propre fascia et occupe la région postérieure
- D) Lors d'une défaillance du diaphragme pelvien, on peut avoir des descentes d'organes comme des rectocèles, des cystocèles ou des hystérocèles
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 4 : AD

A) Le muscle levator ani, principal muscle du diaphragme pelvien, a la forme d'un entonnoir

B) Le muscle coccygien est tendu entre l'épine du pubis et le sacrum et le coccyx

C) Le muscle piriforme, petit muscle du diaphragme pelvien, est entouré de son propre fascia et occupe la région postérieure

D) Lors d'une défaillance du diaphragme pelvien, on peut avoir des descentes d'organes comme des rectocèles, des cystocèles ou des hystérocèles

E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 5 : Cause à effet

Le sacrum constitue la partie basse et fixe du rachis

CAR

Les 5 vertèbres sacrées ont fusionné pour constituer une pyramide à base supérieure et à pointe inférieure sur lequel s'appuie en haut le rachis mobile

QCM 5 : A (VV)

Le sacrum constitue la partie basse et fixe du rachis

CAR

Les 5 vertèbres sacrées ont fusionné pour constituer une pyramide à base supérieure et à pointe inférieure sur lequel s'appuie en haut le rachis mobile

QCM 6 : Cause à effet

Le diaphragme pelvien est situé dans un plan plus profond que le diaphragme uro-génital

CAR

Le diaphragme et le fascia pelvien sont plus puissants et plus résistants que le diaphragme périnéal

QCM 6 : B (VV non liés)

Le diaphragme pelvien est situé dans un plan plus profond que le diaphragme uro-génital

CAR

Le diaphragme et le fascia pelvien sont plus puissants et plus résistants que le diaphragme périnéal

QCM 7 : Item

Dans l'anatomie modale, l'uretère gauche passe AU-DESSUS et EN DEDANS de la division de l'artère iliaque primitive alors que l'uretère droit passe AU-DESSOUS et EN DEHORS de la division.

QCM 7 : VRAI

Dans l'anatomie modale, l'uretère gauche passe AU-DESSUS et EN DEDANS de la division de l'artère iliaque primitive alors que l'uretère droit passe AU-DESSOUS et EN DEHORS de la division.