

# *La filière uro-génitale*

Le tutorat est gratuit. Toute vente ou reproduction est interdite.

# **QCM 1 : A propos de la structure de la vessie. Donner les vraies :**

- A) La vessie est composée de 3 tuniques : la tunique supérieure correspond au péritoine, la tunique moyenne correspond au détrusor et la tunique inférieure correspond au sphincter lisse de la vessie
- B) Le détrusor est un muscle lisse innervé par le nerf pudendal et dont la contraction volontaire chasse l'urine de la vessie dans l'urètre
- C) La couche moyenne de la vessie est constituée de 3 parties musculaires lisses : les fibres circulaires (couche profonde), les fibres plexiformes (couche superficielle) et les fibres longitudinales (couche intermédiaire)
- D) Le sphincter strié de l'urètre est formé par la condensation des fibres circulaires du détrusor et sa contraction est responsable de la continence urinaire
- E) Les propositions ABCD sont fausses

# QCM 1 : E

A) La vessie est composée de 3 tuniques : la tunique supérieure correspond au péritoine, la tunique moyenne correspond au détrusor et la tunique inférieure correspond au sphincter lisse de la vessie

B) Le détrusor est un muscle lisse innervé par le nerf pudendal et dont la contraction volontaire chasse l'urine de la vessie dans l'urètre

C) La couche moyenne de la vessie est constituée de 3 parties musculaires lisses : les fibres circulaires (couche profonde), les fibres plexiformes (couche superficielle) et les fibres longitudinales (couche intermédiaire)

D) Le sphincter strié de l'urètre est formé par la condensation des fibres circulaires du détrusor et sa contraction est responsable de la continence urinaire

**E) Les propositions ABCD sont fausses**

# **QCM 2 : A propos du vagin. Donner les vraies :**

- A) La paroi du vagin comprend une tunique moyenne composée de fibres musculaires striées ainsi qu'une tunique externe conjonctive
- B) L'introït vaginal est partiellement fermé chez la femme vierge par l'hymen, il se poursuit par le vagin qui se trouve dans un plan frontal
- C) La tunique interne du vagin correspond à une muqueuse pavimenteuse soumise à desquamation en fonction du cycle hormonal
- D) Le cul de sac postérieur du vagin est le plus volumineux, il est le lieu de l'éjaculation
- E) Les propositions ABCD sont fausses

# QCM 2 : BCD

A) La paroi du vagin comprend une tunique moyenne composée de fibres musculaires striées ainsi qu'une tunique externe conjonctive

**B) L'introït vaginal est partiellement fermé chez la femme vierge par l'hymen, il se poursuit par le vagin qui se trouve dans un plan frontal**

**C) La tunique interne du vagin correspond à une muqueuse pavimenteuse soumise à desquamation en fonction du cycle hormonal**

**D) Le cul de sac postérieur du vagin est le plus volumineux, il est le lieu de l'éjaculation**

E) Les propositions ABCD sont fausses

## **QCM 3 : Cause à effet**

Si à la coloration acétique certaines cellules du col de l'utérus deviennent blanches, il faut suspecter un cancer du col de l'utérus

### **CAR**

Les cellules cancéreuses sont acidophiles

# QCM 3 : A (VV liés)

**Si à la coloration acétique certaines cellules du col de l'utérus deviennent blanches, il faut suspecter un cancer du col de l'utérus**

**CAR**

**Les cellules cancéreuses sont acidophiles**

# **QCM 4 : A propos de l'utérus et de ses annexes. Donner les vraies :**

- A) L'ovaire possède une double fonction : exocrine par sa médulla (expulsion de l'ovule) et endocrine par sa corticale (production d'œstrogènes)
- B) La nidation de l'œuf fécondé a lieu physiologiquement dans l'utérus mais il existe en pathologie des grossesses extra-utérines
- C) L'ovaire est un organe intra-péritonéal mais non péritonisé
- D) Les trompes et les ovaires assurent la maturation et le transport de l'ovule
- E) Les propositions ABCD sont fausses

# QCM 4 : BCD

A) L'ovaire possède une double fonction : exocrine par sa médulla (expulsion de l'ovule) et endocrine par sa corticale (production d'œstrogènes)

**B) La nidation de l'œuf fécondé a lieu physiologiquement dans l'utérus mais il existe en pathologie des grossesses extra-utérines**

**C) L'ovaire est un organe intra-péritonéal mais non péritonisé**

**D) Les trompes et les ovaires assurent la maturation et le transport de l'ovule**

E) Les propositions ABCD sont fausses