



LA FILIERE GENITALE

LES MALFORMATIONS DE LA FILIERE GENITALE

✧ La filière génitale féminine normale est la filière Mullerienne (fusion des 2 canaux de Muller).

Pendant il existe 2 types d'anomalies :

Anomalies de persistance d'éléments Wolffiens → anomalies Wolffiennes

- * **Hydatide vésiculaire** = vésiculeux = sessile, appendu au pavillon (peut être douloureux)
- * **Épophoron**, en regard de l'ovaire
- * **Par(a)ophoron**, en regard du corps de l'utérus (sur le côté de l'utérus)
- * **Canal para-utérin** = qui peut aller jusqu'à en para-vaginal

Ces anomalies de persistance sont assez fréquentes et peuvent présenter des inflammation voir des processus néoplasiques.

Anomalies de fusion des canaux de Muller → anomalies Mulleriennes (ne sont pas si rares que ça)

- * Utérus avec persistance d'un éperon central (susceptible d'entraîner la stérilité)
- * Utérus avec cloison centrale (comme un éperon plus grand)
- * Utérus bicorps mais un seul col (+ difficile à réparer, risque stérilité +++)
- * Utérus bicorps et bicervical (2 corps, 2 cols, 2 orifices) mais avec 1 seul vagin (rare +++)

Anomalies Wolffiennes



Anomalies Mulleriennes

Eperon central	Cloison centrale	Bicorps + col unique	Bicorps Bicervical
----------------	------------------	----------------------	--------------------

