

SUJET

Les parois du petit bassin

QCM 1 : A propos des détroits du bassin. Donner les vraies :

- A) Le détroit supérieur est oblique en bas et en avant car il fait un angle de 60° ouvert en arrière avec l'horizontal
- B) Le détroit supérieur a la forme de 2 ovoïdes sécantes
- C) Le détroit inférieur fait un angle de 60° avec l'horizontale
- D) Le détroit inférieur est une zone délimitée par le bord supérieur de la symphyse pubienne, le bord inférieur de l'os coxal et l'écartement des 2 branches ischio-pubiennes
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 2 : A propos du sacrum (et d'autres choses). Donner les vraies :

- A) La face postérieure du sacrum est convexe et regarde en haut et en arrière
- B) Le plateau supérieur de la vertèbre S1 décrit un angle de 40° ouvert en arrière
- C) Les ligaments sacro-tubéraux sont tendus entre le sacrum et la tubérosité ischiatique
- D) Le muscle piriforme s'insère sur le bord antérieur des corps vertébraux de S1, S2, S3
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 3 : A propos du coccyx. Donner les vraies :

- A) Le coccyx correspond le plus souvent à la fusion de 3 (ou 4) vertèbres coccygiennes
- B) Le coccyx est mobile chez la femme lors de l'accouchement
- C) Le coccyx est rattaché au sacrum via des ligaments
- D) Physiologiquement, l'articulation sacro-coxale est immobile
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 4 : A propos du bord antérieur de l'os coxal. Donner les vraies :

- A) L'éminence ilio-pubienne est située au-dessus de la gouttière du psoas
- B) Le muscle quadriceps s'insère sur l'épine du pubis
- C) L'épine iliaque antéro-supérieure se situe dans le même plan frontal que l'épine du pubis et est palpable
- D) La grande échancrure sciatique est très arrondie chez la femme
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 5 : A propos des articulations des os du bassin. Donner les vraies :

- A) L'articulation inter-pubienne est une articulation de type symphyse renforcée par une capsule et des ligaments de renforcement
- B) L'articulation sacro-iliaque est une articulation cartilagineuse de type presse-bouton
- C) Le ligament interosseux de l'articulation sacro-iliaque s'insère dans l'os par les fibres de Sharpey ce qui le rend peu résistant
- D) Les articulations des os du bassin sont des articulations très peu mobile voire immobile
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 6 : A propos des parois musculaires du petit bassin. Donner les vraies :

- A) Le muscle obturateur interne se situe sur le pourtour du trou obturé, se dirige dans la petite échancrure ischiatique et s'insère sur le grand trochanter du fémur
- B) Le muscle piriforme s'insère sur la partie antérieure des vertèbres sacrées S2, S3 et S4, se dirige dans la petite échancrure ischiatique et s'insère sur le grand trochanter du fémur
- C) Le muscle psoas-iliaque se situe sur la face médiale de l'aile iliaque, passe dans la vallée du psoas et s'insère sur le petit trochanter du fémur
- D) Le muscle obturateur interne et le muscle piriforme sont entourés par leurs fascias respectifs
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 7 : A propos de l'os coxal. Donner les vraies :

- A) Le pubis possède une branche supérieure, une branche inférieure et un corps
- B) La crête iliaque est un épaississement de l'ilion sur son bord supérieur
- C) La surface quadrilatère correspond à la projection du cotyle sur la face endopelvienne
- D) L'ischion possède une branche supérieure, une branche inférieure et un corps
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 8 : A propos de l'os coxal. Donner les vraies :

- A) Sur la face latérale de l'ilion on retrouve 3 champs d'insertion pour les muscles petits, moyens et grands fessiers
- B) La ligne innommée fait un angle de 60° ouvert en arrière avec l'horizontale
- C) Le foramen obturé se trouve entre l'ischion et le pubis et a la forme d'un anneau brisé par la gouttière sous-pubienne
- D) La fosse iliaque interne correspond à la face endopelvienne (= interne) de l'aile iliaque, au dessus du détroit supérieur
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 9 : A propos d'une vue médiale de l'os coxal. Donner les vraies :

- A) La ligne arquée est tendue entre le bord interne de la symphyse pubienne et la surface sacrée de l'os coxale
- B) En arrière de la surface auriculaire on retrouve la tubérosité iliaque, criblée d'orifice pour l'insertion du ligament interosseux
- C) On peut voir le muscle ilio-psoas tapisser la fosse iliaque interne
- D) Le cotyle est encrouté de cartilage et correspond à l'articulation avec la tête du fémur
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 10 : A propos de l'os coxal. Donner les vraies :

- A) La gouttière ou vallée du psoas est située sur le bord antérieur du pubis
- B) Les épines iliaques antéro-supérieur et postéro-supérieur sont palpables
- C) La petite échancrure ischiatique se situe entre l'épine ischiatique et la tubérosité ischiatique
- D) Sur un schéma d'une vue médiale de l'os coxal la crête iliaque est concave vers le bas
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 11 : A propos des orientations des parois osseuses du petit bassin. Donner les vraies :

- A) La face externe de l'ischion, du pubis et du foramen obturé regarde en bas, en dehors et en avant
- B) La face interne de l'ilion regarde en haut, en dedans et en avant
- C) Les surfaces articulaires des processus articulaires de S1 regardent vers l'arrière et le dedans
- D) Sur une vue latérale du sacrum on peut voir que le plateau supérieur de S1 est dirigé vers le bas et l'avant
- E) Les propositions ABCD sont fausses

Le périnée

QCM 12 : A propos des fascias périnéaux. Donner les vraies :

- A) Le fascia périnéal superficiel est très peu résistant et divise la graisse en 2 : la graisse superficielle et la graisse profonde
- B) Le fascia périnéal supérieur est très résistant et recouvre le muscle transverse profond par sa partie supérieure
- C) Le fascia périnéal profond est constitué du fascia périnéal supérieur et du fascia périnéal inférieur
- D) Le fascia périnéal inférieur tapisse les muscles transverses superficiels et profonds par leur partie inférieure
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 13 : Donner les vraies :

- A) Le clitoris et le bulbe vestibulaire constituent les corps érectiles de la femme
- B) Le clitoris constitue le corps caverneux de la femme
- C) L'érection clitoridienne chez la femme est imparfaite contrairement à l'érection des bulbes vestibulaires
- D) Les bulbes vestibulaires ont la forme d'un V à concavité antérieure
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 14 : A propos de tout et n'importe quoi. Donner les vraies :

- A) Le muscle transverse profond est situé en-dessous du muscle transverse superficiel
- B) Le muscle transverse profond a une contraction volontaire et est innervé par le nerf pudendal
- C) L'érection clitoridienne est un phénomène orthosympathique
- D) Une déchirure de la symphyse pubienne n'entraînera jamais une déchirure du clitoris car il est court et mobile
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 15 : A propos du diaphragme périnéal. Donner les vraies :

- A) Les muscles en cornets sont des muscles creux de type strié squelettique et enserrant les corps érectils féminins
- B) Les sphincters lisses de l'anus et de l'urètre sont respectivement innervés par le nerf rectal inférieur = anal et le nerf pudendal
- C) Le muscle constrictor de la vulve est un petit muscle situé dans le triangle antérieur et qui enserre le pénis de l'homme lors de la copulation
- D) Le muscle grand fessier ou glutéus majus est un muscle clé dans le rôle de soutien du diaphragme périnéal
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 16 : A propos des fascias périnéaux. Donner les vraies :

- A) Il existe un fascia périnéal superficiel qui se situe en sous-cutané et n'enveloppe pas le diaphragme uro-génital
- B) Le fascia périnéal profond et aussi appelé fascia du diaphragme uro-génital et se divise en 2 feuillets
- C) Le feuillet supérieur du fascia périnéal profond recouvre par le dessus les muscles transverses profonds
- D) Le feuillet inférieur du fascia périnéal profond recouvre entre autres les muscles du triangle antérieur du périnée musculaire
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 17 : A propos de l'innervation du périnée :

- A) Le nerf pudendal est le nerf principal de l'innervation de la vulve, il s'occupe de la partie moyenne et interne
- B) La motricité des muscles du diaphragme périnéal est assurée essentiellement par le nerf rectal inférieur et le nerf pudendal
- C) Le sphincter strié de l'anus est volontaire, innervé essentiellement par des nerfs provenant de la racine S4
- D) L'innervation sensitive des corps érectiles est permise par le nerf ilio-hypogastrique provenant de L1
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 18 : A propos de la vascularisation du périnée. Donner les vraies :

- A) Le retour du sang veineux du périnée se fait en sens contraire de la vascularisation artérielle, par des veines du même nom que les artères
- B) L'artère iliaque externe, qui devient ensuite artère fémorale, est en dedans de la veine iliaque externe
- C) L'artère iliaque interne vascularise la vulve essentiellement par sa branche pudendale interne mais aussi par sa branche rectale inférieure (pour l'anus)
- D) Le diaphragme périnéal est essentiellement vascularisé par les vaisseaux fémoraux
- E) Les propositions ABCD sont fausses

La filière uro-génitale

QCM 19 : A propos des mécanismes de la miction. Donner les vraies :

- A) Lorsque la vessie est pleine, l'activation du parasymphatique et le relâchement de l'orthosymphatique permettent respectivement la contraction du détrusor et le relâchement du sphincter lisse de l'urètre
- B) A la fin de la miction, le parasymphatique est inhibé et l'orthosymphatique est activé ce qui entraîne la relaxation du détrusor et la fermeture du sphincter lisse de l'urètre
- C) Le sphincter strié urétral est innervé par le nerf pudendal : c'est la composante volontaire du phénomène de la miction
- D) Le contrôle de la miction fait intervenir à la fois le système végétatif (parasymphatique et orthosymphatique) et somatique (volontaire)
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 20 : A propos de l'appareil urinaire. Donner les vraies :

- A) L'urètre est un conduit musculo-membraneux unique permettant l'écoulement de l'urine depuis la vessie

- B) L'urothélium urétéral forme un repli (= valve anti-reflux) entre la vessie et l'uretère qui se ferme pour éviter la remontée de l'urine dans les voies urinaires supérieures
- C) Les uretères présentent 2 rétrécissements : un au niveau de l'abouchement sur la face postérieure de la vessie (= base) et l'autre lorsqu'il pénètre dans le grand bassin
- D) L'uretère croise l'artère utérine en passant au-dessus d'elle : on dit que l'uretère surcroise l'artère utérine
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 21 : A propos de l'appareil urinaire. Donner les vraies :

- A) Le cathétérisme sus-pubien est réalisé en rentrant une aiguille dans la vessie pleine, au-dessus de la symphyse pubienne
- B) Le sondage vésical de la femme est réalisé en écartant les grandes et les petites lèvres et en introduisant une sonde trempée dans un liquide lubrifiant et anesthésiant
- C) L'ouraque est un reliquat embryonnaire qui s'étend de l'apex de la vessie, partie inférieure effilée, jusqu'à l'ombilic
- D) Le dôme vésical existe uniquement lorsque la vessie est en globe vésical
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 22 : A propos de la paroi de la vessie. Donner les vraies :

- A) La paroi de la vessie est épaisse car elle est formée de 3 couches : une couche externe formée par le péritoine et le fascia vésical, une couche intermédiaire de plusieurs cm d'épaisseur formée par un muscle très volumineux (le détrusor) et une couche interne formée par l'urothélium
- B) Le fascia vésical constitue la couche externe de la paroi vésical et se situe à l'endroit où la vessie est non péritonisée
- C) L'urothélium a une couleur jaune pâle visible à l'endoscopie vésicale
- D) L'urothélium est aréolaire et présente des replis chez la petite fille et se lisse chez l'adulte
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 23 : A propos de rapports de la vessie. Donner les vraies :

- A) La vessie est en dedans du muscle Levator Ani
- B) La vessie est entièrement péritonisée
- C) La vessie est séparée du vagin par le fascia vésico-vaginal qui est un accolement péritonéal fibrosé au niveau duquel se trouve le point G
- D) La vessie se situe dans la loge vésicale, en arrière de l'espace graisseux pré-vésical et rétro-pubien de Retzius
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 24 : A propos de la vascularisation de la vessie. Donner les vraies :

- A) La vascularisation artérielle de la vessie provient essentiellement de l'artère ombilicale qui peut donner l'artère vésicale supérieure et l'artère vésicale inférieure
- B) L'artère utérine, l'artère obturatrice et l'artère vaginale participent accessoirement à la vascularisation de la vessie
- C) La vessie a une vascularisation relativement pauvre, ainsi les nécroses vésicales sont fréquentes
- D) Le drainage veineux de la vessie se fait en sens inverse de la vascularisation artérielle
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 25 : A propos de l'appareil urinaire. Donner les vraies :

- A) Le sphincter strié de l'urètre appartient au diaphragme uro-génital
- B) Les glandes lubrifiantes de la vulve contenu dans l'urètre sont de 2 types : des très petites situées dans la paroi urétérales et de plus importantes dont l'orifice est situé juste en dehors du méat urétéral
- C) Les glandes para-urétrales de Skene sécrètent un liquide lubrifiant et peuvent s'infecter comme les glandes de Bartholin
- D) L'urètre descend en avant des lombes
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 26 : A propos de l'appareil urinaire. Donner les vraies :

- A) L'uretère constitue l'élément le plus profond du petit bassin
- B) La valve anti-reflux est un élément de l'urothélium de l'uretère
- C) L'uretère vésical s'abouche au-niveau du trigone vésical, dans le fundus de la vessie
- D) L'uretère est difficile à repérer bien qu'il soit animé de mouvements permanents péristaltiques
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 27 : A propos du vagin. Donner la (ou les) vraie(s) :

- A) Lors d'un examen du vagin au speculum, il faut d'abord introduire les 2 valves du spéculum dans le plan de la fente vulvaire, c'est-à-dire le plan sagittal, puis il faut incliner ces 2 valves dans le plan du vagin, c'est-à-dire le plan frontal
- B) Le vagin est un étui aplati d'avant en arrière dont l'extrémité supérieure correspond au fornix du vagin
- C) Le rectum est séparé du vagin par le fascia recto-vaginal et constitue donc un rapport direct du vagin
- D) Le vagin mesure 8 cm de long et est peu extensible
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 28 : Cause à effet

L'imperforation de l'hymen chez la femme peut entraîner des douleurs atroces lors des premières menstruations

CAR

Lorsque l'hymen est imperforé, les menstruations s'accumulent en amont de l'hymen

QCM 29 : A propos du vagin. Donner la ou les vraie(s) :

- A) L'éjaculation de l'homme se fait dans le lac spermatique du vagin, c'est-à-dire le cul de sac antérieur du vagin
- B) La muqueuse interne du vagin est soumise à un phénomène de transsudation parasympathique lubrifiante lors du coït ainsi qu'un phénomène de desquamation variable au cours du cycle hormonal de la femme
- C) Le triangle de Pawlick (triangle du vagin) correspond à la bifurcation de la colonne antérieure du vagin et est en rapport avec le trigone vésical
- D) La lame sacro-recto-génito-pubienne est un rapport supérieur majeur du vagin
- E) Les propositions A, B, C, et D ont fausses

QCM 30 : A propos de l'utérus. Donner la (ou les) vraie(s) :

- A) L'utérus est l'organe permettant la copulation ainsi que l'expulsion du bébé lors de l'accouchement grâce au muscle lisse utérin
- B) Le col de l'utérus est la partie inférieure et rétrécie correspondant à l'ouverture de l'utérus dans le vagin
- C) L'utérus est composé dans sa partie supérieure du corps avec un fond, des cornes (en latéro-supérieur) et 2 parois latérales
- D) L'utérus est un organe intra-péritonéal et il est péritonisé seulement au niveau du fond, qui pointe à l'intérieur de la cavité péritonéale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 31 : A propos de l'utérus et de ses annexes. Donner les vraies :

- A) Les cornes de l'utérus correspondent à l'abouchement des trompes dans l'utérus et sont le point de départ du ligament rond et du ligament utéro-ovarien
- B) Au niveau de l'exocol on retrouve les replis palmés de l'utérus qui sont remplis de mucus et sont le lieu de passage des spermatozoïdes
- C) Les trompes possèdent la même structure que l'utérus et sont composées de 4 parties dont 1 extra-utérine et 3 intra-utérine
- D) L'ovaire ou gonade féminine est responsable de l'expulsion de l'ovule (ou ovocyte ou ce que vous voulez, pas de piège la dessus ^^) et de la sécrétion des hormones sexuelles féminines
- E) Les proposition ABCD sont fausses

QCM 32 : A propos de l'utérus. Donner la (ou les) vraie(s) :

- A) L'orifice du col utérin de la nullipare (= sans accouchement) est en général punctiforme mais il peut être transversal chez certaines femmes
- B) Le ligament rond s'implante sur les cornes de l'utérus et se dirige vers les grandes lèvres de la vulve
- C) La portion intra-pariétale du col utérin est examinable à l'œil nu
- D) Les cellules du col utérin sont acidophiles et se colorent donc en acajou avec la coloration au Lugol
- E) Les propositions A, B, C et D ont fausses

QCM 33 : A propos de la structure de l'utérus. Donner la (ou les) vraie(s) :

- A) La tunique externe est formée en partie par le fascia vésical qui remplace le péritoine là où il n'est pas présent
- B) La tunique interne est accessible à l'hystéroscope et est formée par le paramètre
- C) Les replis palmés du myomètre au niveau du col utérin forment l'arbre de vie de l'utérus

D) La jonction entre l'endocol à épithélium unistratifié et l'exocol à épithélium pavimenteux se fait au niveau du tiers supérieur du col de l'utérus

E) Les propositions A, B, C et D ont fausses

QCM 34:

L'artère utérine présente un trajet godronnée le long du corps de l'utérus

CAR

L'utérus se dilate et grossit durant la grossesse

Les moyens de fixité

QCM 35 : A propos du ligament large. Donner la ou les vraie(s) :

A) L'aileron postérieur de la ligne de réflexion utérine du ligament large, ou mésosalpinx, est sous-tendu par la trompe de l'utérus

B) L'aileron antérieur de la ligne de réflexion utérine du ligament large, ou mésoovarium, est sous-tendu par le ligament rond

C) L'aileron supérieur de la ligne de réflexion utérine du ligament large est sous-tendu par le ligament utéro-ovarien et s'arrête au niveau du hile de l'ovaire

D) Le ligament large présente 2 lignes de réflexion : une pariétale sur le muscle Levator Ani, et une utérine

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 36 : A propos du ligament large et de la lame sacro-recto-génito-pubienne (SRGP). Donner la ou les vraie(s) :

A) Au niveau de la base du ligament large on retrouve le passage de l'aileron latéral de la lame sacro-recto-génito-pubienne et des vaisseaux du petit bassin

B) L'aileron latéral de la lame sacro-recto-génito-pubienne est sous-tendu par les branches de l'artère iliaque interne et repose sur le muscle Levator Ani

C) L'aileron antérieur du ligament large est sous-tendu par le ligament rond et s'étend entre les cornes de l'utérus et la peau des grandes lèvres

D) Le ligament utéro-recto-sacré passe dans l'orifice inguinal et sous-tend l'aileron postérieur du ligament large

E) Les proposition ABCD sont fausses

QCM 37 : A propos du ligament large. Donner les vraie(s) :

A) Le péritoine va être soulevé par le ligament rond, la trompe et le ligament lombo-ovarien pour former les 3 ailerons du ligament large

B) La ligne de réflexion pariétale du ligament large comprend une partie inférieure élargie correspondant à la projection sur la paroi de la la partie inférieure de la ligne de réflexion utérine

C) Le péritoine recouvre presque toute la paroi constituée par le Levator Ani sauf au niveau de la ligne de réflexion pariétale du ligament large

D) Au niveau des paramètres du ligament large ont retrouve le passage de l'uretère et de l'artère utérine

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 38 : Les moyens de fixité des organes pelviens en général sont :

A) La lame sacro-recto-genito-pubienne

B) Le noyau fibreux central de l'utérus

C) La vessie

D) Le muscle Levator Ani

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 39 : Les moyens de fixité des organes pelviens en général sont :

A) Le ligament large

B) Le ligament rond

C) L'artère utérine

D) Le muscle piriforme

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Etude synthétique

QCM 40 : A propos d'une vue de coelioscopie de la cavité pelvienne. Donner la ou les vraie(s) :

- A) En dedans de l'artère ombilicale se trouve une fossette péritonéal : la fossette inguinale interne
- B) En dedans de l'artère ombilicale se trouve une fossette péritonéal : la fossette inguinale externe
- C) En arrière de la trompe on peut voir l'ovaire et le ligament utéro-ovarien
- D) On peut voir le ligament utéro-recto-sacré qui correspond à l'aileron dorsal de la lame sacro-recto-génito-pubienne entre l'utérus, le rectum et le coccyx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 41 : A propos d'une coupe frontale des organes pelviens au niveau de la vessie. Donner la ou les vraie(s) :

- A) De haut en bas on retrouve la vessie, le col de l'utérus, le vagin, le noyau fibreux central du périnée
- B) On retrouve le canal pudendal d'Alcock où passent les vaisseaux pudendaux et le nerf pudendal
- C) Le noyau fibreux central du périnée qui est un moyen de fixité important de l'utérus (par l'intermédiaire du vagin qui s'y appuie)
- D) On peut voir des muscles du diaphragme périnéal et du diaphragme pelvien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 42 : A propose d'une coupe frontale des organes pelviens au niveau du rectum. Donner la ou les vraie(s) :

- A) Au niveau de la partie latérale du rectum on retrouve le passage du ligament utéro-recto-sacré
- B) On peut voir la fosse ischio-rectale et l'espace péri-anal qui sont remplis de graisse
- C) Les muscles iliaques et psoas se rejoignent pour former le muscle ilio-psoas
- D) Le muscle Levator Ani, oblique, s'insère sur le rectum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 43 : A propos d'une coupe sagittale du petit bassin. Donner la ou les vraie(s) :

- A) Le péritoine recouvre la face supérieure de la vessie, la face antérieure de l'utérus et du vagin, la face postérieure de l'utérus, une partie du rectum
- B) Le péritoine recouvre la face supérieure de la vessie, la face antérieure de l'utérus, la face postérieure de l'utérus, le cul de sac postérieur du vagin, une partie du rectum
- C) Le rectum possède une partie supérieure large et une partie inférieure étroite
- D) Le vagin se trouve au dessus de la vessie, en arrière de l'utérus et en avant du rectum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Les annexes de l'utérus

QCM 44 : A propos des trompes ou oviducte de l'utérus. Donner la (ou les) vraie(s) :

- A) La trompe ou oviducte de l'utérus est composée de 4 parties : une partie intra-utérine, un pavillon, une ampoule et un isthme
- B) La frange ovarique de Richard est un élément de l'isthme de l'oviducte, retient l'ovaire et va recueillir la ponte ovulaire
- C) Les oviductes ou trompes de l'utérus sont extrêmement mobiles et sont rétro-péritonéales
- D) Une nidation tubaire est aussi appelée grossesse extra-utérine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 45 :

Une hystérogazie peut permettre à une femme stérile d'avoir un enfant

CAR

L'air envoyé peut déboucher une trompe non perméable par accumulation de mucus

QCM 46 : A propos des ovaires. Donner la (ou les) vraie(s) :

- A) L'ovaire a la forme d'une amande de 3 à 4 cm bosselée par les follicules de De Graff
- B) L'ovaire est dans la grande cavité péritonéale mais non recouvert de péritoine, on dit qu'il est péritonisé et sous-péritonéal
- C) Le rameau ovarien de l'artère utérine ainsi que l'artère gonadique rejoignent l'ovaire en passant par le hile ovarien
- D) Le kyste ovarien est une pathologie fréquente chez la femme et se traite par un traitement hormonal
- E) Les propositions A, B, C et D ont fausses

QCM 47 : A propos des trompes ou oviducte de l'utérus. Donner la (ou les) vraie(s) :

Le cancer de l'ovaire est redoutable et diffuse facilement dans la grande cavité péritonéale

CAR

L'ovaire est non péritonisé et intra-péritonéal

QCM 48 : A propos de la vascularisation et du drainage lymphatique de l'ovaire. Donner la (ou les) vraie(s) :

- A) La vascularisation artérielle de l'ovaire est essentiellement assurée par le rameau ovarien de l'artère utérine
- B) L'artère ampolaire et l'artère gonadique, issue de l'aorte thoracique, vascularise accessoirement la gonade femelle
- C) La veine gonadique droite se jette directement dans la veine porte
- D) Le drainage lymphatique de l'ovaire se fait majoritairement vers la chaîne iliaque interne
- E) Les propositions A, B, C et D ont fausses

Recap vascularisation

QCM 49 : A propos de l'artère utérine. Donner les vraies :

- A) L'artère utérine a un trajet tortueux au niveau des parois latérales de l'utérus avant de se diviser en 2 branches terminales
- B) L'artère utérine est issue de l'artère iliaque externe, passe en dessous de l'uretère puis se termine au niveau des parois latérales de l'utérus
- C) Le rameau ovarien de l'artère utérine est une collatérale qui participe à la vascularisation de l'ovaire
- D) L'artère rétrograde du fond de l'utérus est une collatérale de l'artère utérine
- E) Les propositions ABCD sont fausses

QCM 50 : A propos de la vascularisation et du drainage lymphatique de la vessie. Donner les vraies :

- A) L'artère vésicale est l'artère principale de la vascularisation de la vessie, et elle est sous-tendue par le fascia ombilico-pré-vésical
- B) Les artères obturatrices et ombilicales, issues de l'artère pudendale interne (= honteuse interne) participent à la vascularisation de la vessie
- C) Le drainage lymphatique de la vessie se fait dans les nœuds iliaques internes
- D) Les nœuds iliaques externes participent également au drainage lymphatique de l'ovaire
- E) Les propositions ABCD sont fausses

CORRECTION

Les parois du petit bassin

QCM 1 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : C'est le détroit supérieur qui fait un angle de 60° avec l'horizontale
- D) Faux : Bord inférieur de la symphyse pubienne
- E) Faux

QCM 2 : AC

- A) Vrai (visible sur les schémas, et si la face antérieure est concave la postérieure est convexe ☺)
- B) Faux : L'angle est ouvert en avant
- C) Vrai
- D) Faux : Il s'insère sur S2 S3 S4
- E) Faux

QCM 3 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le coccyx est la seule partie du bassin mobile notamment lors de l'accouchement
- D) Faux : L'item est vrai mais dans l'énoncé, on parle du coccyx donc aucun rapport
- E) Faux

QCM 4 : C

- A) Faux : L'éminence ilio-pectinée est située en dessous de la gouttière du psoas. Le prof met souvent des items sur bord antérieur / postérieur de l'os coxal, ce qui est au-dessus ou en-dessous donc apprenez bien !
- B) Faux, c'est le muscle grand droit (de l'abdomen)
- C) Vrai
- D) Faux : Attention à l'énoncé, on parlait du bord antérieur de l'os coxal et la grande échancrure ischiatique se trouve sur le bord postérieur. Mais l'item en lui-même est vrai
- E) Faux

QCM 5 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est une articulation synoviale arthrodie et non pas cartilagineuse
- C) Faux : Le ligament interosseux est très résistant (résiste à 500 kg à l'arrachement)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Il passe dans la grande échancrure sciatique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux, ça c'est le pubis
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : attention on parle d'une vue médiale !
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Le fascia périnéal supérieur est peu résistant et extrêmement grêle
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les bulbes vestibulaires ont une érection imparfaite de même que le clitoris, mais celle du clitoris est un peu meilleure
- D) Faux : A concavité inférieure
- E) Faux

QCM 14 : B

- A) Faux : Le muscle transverse profond est au-dessus du muscle transverse superficiel
- B) Vrai
- C) Faux : C'est un phénomène parasympathique
- D) Faux : Une déchirure de la symphyse pubienne peut entraîner une déchirure du clitoris et concernant la 2^{ème} partie de la phrase cela concerne l'urètre chez la femme (qui est court et mobile et que ne se déchirera donc pas)
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est les sphincters striés de l'urètre et de l'anus qui appartiennent au diaphragme uro-génital
- C) Vrai
- D) Faux : Le muscle grand fessier ne fait pas parti du diaphragme périnéal, il se trouve dans la fesse
- E) Faux

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est par le nerf pudendal (S2 S3 S4)

E) Faux

QCM 18 : AC

A) Vrai

B) Faux : l'artère est en dehors de la veine (visible sur les schémas)

C) Vrai

D) Faux : Par les vaisseaux pudendaux = honteux interne

E) Faux

QCM 19 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 20 : AB

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : Dans le petit bassin

D) Faux : Il passe au-dessous de celle-ci ++ donc il la sous-croise

E) Faux

QCM 21 : AB

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : Partie antérieure effilée

D) Faux : Le dôme vésical est lorsque la vessie est pleine physiologiquement et non pas uniquement en cas de pathologie ou ça devient globe vésical

E) Faux

QCM 22 : B

A) Faux : La paroi vésicale est très fine (1 ou 2 cm) et bien que le détrusor constitue la couche la plus épaisse de la vessie, ce n'est quand même pas un très volumineux muscle !!

B) Vrai

C) Faux : L'urothélium est rosé. C'est un piège un peu bateau mais De Peretti considère que c'est quelque chose que vous devez savoir !

D) Faux : C'est l'inverse, il est lisse chez la petite fille et devient aréolaire (avec des replis) chez l'adulte.

E) Faux

QCM 23 : ACD

A) Vrai

B) Faux : Elle est uniquement sous-péritonéale et non pas entièrement péritonisée !

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 24 : ABD

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : La vessie est très bien vascularisée donc les nécroses de la vessie sont très rares

D) Vrai

E) Faux

QCM 25 : AC

A) Vrai

- B) Faux : Paroi **urétrale** et méat **urétral**
- C) Vrai
- D) Faux : C'est l'uretère pelvien qui descend en avant des lombes et non pas l'urètre
- E) Faux

QCM 26: ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : justement comme il est séparé du vagin par le fascia recto-vaginal, le rectum n'est pas un rapport direct du vagin
- D) Faux : il est très extensible

QCM 28 : A

VV et liés

QCM 29 : C

- A) Faux : le lac spermatique correspond au cul de sac postérieur mais c'est bien le lieu de l'éjaculation
- B) Faux : le phénomène de transsudation est orthosympathique et non pas parasymphatique
- C) Vrai
- D) Faux : C'est un rapport latéral

QCM 30 : BC

- A) Faux : c'est l'organe de la gestation et de l'accouchement mais pour la copulation (= l'acte sexuel) c'est le vagin
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'utérus est sous-péritonéal, il pointe dans la cavité péritonéale mais ça ne veut pas dire qu'il est à l'intérieur de celle-ci. Il est péritonisé au niveau de ses parois supérieures (le fond), antérieure et postérieure mais pas latérales
- E) Faux

QCM 31 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : au niveau de l'endocol
- C) Faux : c'est 3 parties extra-utérines et 1 intra-utérine
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la portion intra-vaginale qui est visible à l'œil nu contrairement à la portion intra-pariétale
- D) Faux : elles ne sont pas acidophiles mais au contraire glycogénophiles

QCM 33 : E

- A) Faux : fascia vésical c'est pour la vessie et là on nous parle bien de l'utérus
- B) Faux : par l'endomètre et non pas le paramètre
- C) Faux : replis palmés de l'endomètre et non pas du myomètre
- D) Faux : elle se fait au niveau de l'orifice externe du col de l'utérus

QCM 34 : A

VV et bien liés

QCM 35 : D

- A) Faux : aileron postérieur = mésoovarium = du ligament utéro-ovarien
- B) Faux : aileron antérieur = du ligament rond
- C) Faux : aileron supérieur = mésosalpinx = de la trompe
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : C'est le ligament rond qui passe dans l'orifice inguinal, et il correspond à l'aileron antérieur
- E) Faux

QCM 37 : BCD

- A) Faux : pas ligament lombo-ovarien mais ligament utéro-ovarien
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 40 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : BCD

- A) Faux : de haut en bas c'est utérus, vessie, vagin, NFCP
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : BC

- A) Faux : pas la face antérieure du vagin !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : en dessous de l'utérus, en arrière de la vessie, en avant du rectum
- E) Faux

Les annexes de l'utérus

QCM 44 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : élément du pavillon de l'oviducte
- C) Faux : elles sont sous-péritonéale et s'ouvre dans la grande cavité péritonéale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : A

VV et liés

QCM 46 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : l'ovaire est dans la grande cavité péritonéale = intra-péritonéal et non recouvert de péritoine = non péritonisé
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : A

VV et les 2 items sont bien liés

QCM 48 : E

- A) Faux : la vascularisation est assurée +++ par l'artère ovarique (= gonadique)
- B) Faux : l'artère gonadique est issue de l'aorte abdominale et vascularise +++ l'ovaire
- C) Faux : la veine gonadique droite se draine dans la VCI
- D) Faux : le drainage lymphatique de l'ovaire se fait = vers la chaîne iliaque externe + lombo-aortique + chaîne rénale à gauche + nœuds lymphatiques autour de la VCI à droite
- E) Vrai

Recap vascularisation

QCM 49 : E

- A) Faux : L'artère utérine donne plus de branches terminales que ça (mais Depé n'a pas dit combien cette année donc on s'en fout combien, juste retenir que il y a au moins le rameau ovarien, l'artère retrograde du fond, l'artère tubaire)
- B) Faux : L'artère utérine est issue de l'artère iliaque interne
- C) Faux : Le rameau ovarien est une branche terminale
- D) Faux : L'artère rétrograde du fond est une branche terminale
- E) Vrai

QCM 50 : C

- A) Faux : c'est l'artère ombilicale qui correspond à cet item
- B) Faux : elles sont issues de l'artère iliaque interne
- C) Vrai
- D) Faux : l'item est vrai en lui-même mais rien à voir avec l'énoncé attention !
- E) Faux