

DM 2 – Le Périnée - Correction

Pour gagner de la place je ne mettrais que la correction des réponses fausses;))

Généralités :

- 2 - Dans son ensemble, le périnée a une forme **losangique** à grand axe antéro-postérieur
- 3 - Le périnée est délimité en 2 triangles : postérieur (centré par l'anus) et antérieur (centré par le **pudendum**)

Périnée cutané 1^{er} plan :

- 1 - L'anus se trouve au niveau du triangle postérieur, ses pourtours ont des **plis radiés**
- 2 - La vulve (pudendum) se trouve en arrière de la symphyse pubienne, elle est assez **antérieure** et frontale chez la petite fille puis devient plus **postérieure** et sagittale après la puberté
- 5 - Le pubis possède une pilosité triangulaire à base supérieure (caractère sexuel secondaire), **le poil est polygonal pour justement retenir les parasites (et qu'ils ne rentrent pas dans le vagin) !!**
- 8 - Les petites lèvres (nymphe) : sont **plus courtes = atrophiées** que les grandes lèvres chez la femme âgée (elles sont plus longues chez l'adolescente)
- 11 - Le méat **urétral** présente des glandes **urétrales** de Skene (orthosympathique ++) de part et d'autre qui servent à la lubrification de la vulve lors des rapports sexuels (faites gaffe à ce piège ;)
- 14 - Après le 1^{er} accouchement, l'hymen disparaît presque complètement, il reste quelques vestiges appelés caroncules **myrtiformes (en forme de grain de myrtilles)**
- 15 - Après la 1^{ère} pénétration complète (défloration), l'hymen se déchire, saigne et présente des caroncules **hyménales**

Périnée cutané 2^{ème} plan – Le clitoris :

- 3 - Le genou du clitoris est l'angle entre **les piliers** et le corps

Périnée cutané 2^{ème} plan – Le bulbe vestibulaire :

- 1 - Il a une érection plus **faible** que le clitoris

Périnée musculaire :

- 1 - Il est aussi appelé diaphragme pelvien **FAUX !!**
- 4 - Le ligament sacro-tubéral **n'appartient pas au périnée**
- 8 - Les muscles en cornet sont des muscles **striés volontaire commandés par les SNC**
- 9 - Les muscles ischio-caverneux entourent les racines du clitoris et se réunissent en **avant** par un tendon commun qui passe au-dessus des vaisseaux clitoridiens
- 11 - Le muscle constricteur de la vulve est en **dedans** des muscles bulbo-spongieux
- 15 - Les muscles transverses du périnée sont à contraction volontaire et innervés par le **nerf pudendal**
- 16 - Le muscle transverse profond est un muscle plat entre l'ischion et le NFCP, il est **épais !**
- 18 - Le fascia périnéal est composé de **3 fascia : un superficiel, un supérieur et un inférieur**
- 19 - Le fascia périnéal **superficiel** est sous-cutané et sépare la graisse profonde de la graisse superficielle

Innervation :

- 1 - La vulve dans sa partie antérieure est innervée par le rameau ant de **L1 (ilio-hypogastrique)** et rameau ant de **L2 (nerf génito-fémoral nerf)**

Vascularisation :

- 2 - La vulve dans sa partie postérieure et profonde est vascularisée par les vaisseaux honteux (branches des vaisseaux hypogastriques = **iliaques internes**)