

Questions des Étudiants

Question 1: *Quel est le pourcentage d'hypospadias ?*

Réponse 1: C'est une maladie assez rare. C'est de l'ordre de 0,3 à 0,5 %.

Question 2: *Le canal de Müller donne-t-il le 1/3 tiers supérieur ou les 2/3 tiers supérieurs du vagin ?*

Réponse 2: Ce n'est pas quelque chose qui a de l'importance pour le concours ! Mais ce sont les 2/3 supérieurs du vagin qui viennent du canal de Müller. L'autre tiers vient du sinus urogénital.

Question 3: *Lors d'une mutation inactivatrice du gène codant pour la 5 alpha réductase, le fœtus 46XY peut-il voir apparaître à la puberté une croissance mammaire de type féminin ?*

Réponse 3: Non, cela apparaît dans le syndrome d'insensibilisation aux androgènes. Pour la mutation de la 5alpha-réductase, on n'a pas présence de développement de glande mammaire car il y a un mécanisme qui le bloque (mais il ne vous dira pas lequel, c'est le suspense 😊)

Question 4: *Les stades extrêmes de Prader sont-ils normaux ou pathologies ?*

Réponse 4: Ils sont bien normaux, le stade 1 est la « féminisation normale » et le stade 5 est la « masculinisation normale ».

Question 5: *Quel est l'origine des gonocytes primordiaux ? Peut-on dire qu'ils viennent de l'épiblaste (car ça donne les 3 feuillets) ou ils viennent strictement de l'endoblaste ?*

Réponse 5: (Assez surpris par ma question il était ^^) Nous pouvons sûrement dire les deux. Le piège (s'il existe) ne sera pas aussi vicieux.

Question 6: *La différenciation sexuelle du cerveau permet à l'individu de fixer son identité sexuelle et son orientation sexuelle ? Ou seulement son identité sexuelle ?*

Réponse 6: (Pour ce la, il y a répondu en cours donc vous l'aurez dans la ronéo ^^) donc la différenciation sexuelle du cerveau **fixe** l'identité sexuelle (qui est définitive) et c'est au cours de la puberté de l'individu qu'apparaît l'orientation sexuelle. Cette dernière est réversible au cours de la vie.