

QCM 1 : A propos du diaphragme pelvien :

- A) Le diaphragme pelvien possède 3 fonctions
- B) Les fonctions du diaphragme pelvien sont : soutient des organes, rôle sphinctérien du rectum et permettre la manœuvre de Vasalva
- C) Le muscle coccygien est innervé par le nerf rectal inférieur
- D) Le muscle Levator Ani est tendu entre le pubis, le fascia de l'obturateur interne, l'ischion, le raphé ano-coccygien, le sphincter strié du rectum, le NFCP, et la fente uro-génitale
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 2 : A propos du fascia du diaphragme pelvien :

- A) Le diaphragme pelvien soutient toute la filière uro-génitale et rectale, il est donc renforcé par le fascia pelvien qui est constitué de 3 feuillettes
- B) Le fascia pelvien supérieur est le fascia élévateur de l'anus
- C) Le fascia pelvien inférieur est extrêmement grêle sauf au niveau du ligament sacro-épineux
- D) Le fascia pelvien supérieur est grêle
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 3 : A propos des glandes du périnée :

- A) Les glandes urétrales de Skene (orthosympathique) servent à la lubrification de la vulve lors des rapports sexuels et si elles sont hypertrophiées/hypersensibles on a le phénomène des femmes fontaines
- B) Les glandes de Bartholin sont situées dans la partie inférieure du vestibule du vagin et sont les glandes vestibulaires majeures
- C) Les glandes de Bartholin sécrètent la cyprine (liquide lubrifiant)
- D) Les glandes de Bartholin sont, à l'inverse des glandes de Skene, innervées par le parasympathique
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 4 : A propos du triangle antérieur du diaphragme uro-génital :

- A) Les muscles bulbo-spongieux émettent des expansions antérieures qui rejoignent le tendon commun des ischio-caverneux
- B) Le noyau fibreux central du périnée est la clé de voute de toutes les structures formant le périnée
- C) Le muscle transverse inférieur est profond
- D) Le muscle transverse supérieur est superficiel
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 5 : A propos du rectum :

- A) Les colonnes annales se trouvent au dessus de la ligne ano-rectale
- B) Il existe 3 plexus veineux hémorroïdaires dans le rectum : supérieur, inférieur et superficiel
- C) La paroi du rectum est composée de seulement 2 couches : la muqueuse et la musculuse (circulaire interne et longitudinale externe)
- D) L'orthosympathique entraîne la dilatation du sphincter interne lisse du rectum
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 6 : A propos de la vascularisation du rectum :

- A) L'artère rectale supérieure est inconstante et provient d'un rameau terminal de l'artère mésentérique inférieure
- B) L'artère rectale moyenne est constante et provient d'un rameau de l'artère hypogastrique
- C) L'artère rectale inférieure est un rameau relativement constant de l'artère pudendale
- D) Le drainage veineux du rectum se fait via les veines rectales supérieure vers la veine mésentérique supérieure et via les veines rectales inférieures et moyennes vers les veines iliaques internes
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 7 : A propos de la vessie :

- A) La vessie est un organe musculaire
- B) La vessie est tapissée par le péritoine au niveau de sa partie inférieure
- C) L'inconvénient du cathétérisme sus-pubien est qu'il perfore la cavité péritonéale
- D) C'est un organe sous-péritonéal
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 8 : A propos de la vessie :

- A) Elle est constituée par 3 tuniques : le fascia vésical, le détroisor et l'urothélium
- B) Entre les orifices des uretères on retrouve le bourrelet muqueux latéral
- C) L'espace de Reitzus est un espace rétro-pubien accolé à la paroi de la symphyse pubienne
- D) Elle est vascularisée essentiellement par l'artère iliaque interne
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 9 : A propos du vagin :

- A) C'est un organe aplati d'avant en arrière faisant un angle de 60° avec l'horizontale
- B) Le col de l'utérus est visible à l'œil nu lors d'un examen au spéculum et palpable
- C) La colonne du vagin, visible sur la face antérieure, bifurque en haut, en regard du trigone fémoral, et porte le nom de triangle de Pawlick
- D) Sécrétée par les glandes majeurs de Skene, la cyprine sert à la lubrification
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 10 : A propos de l'utérus :

- A) Tout comme la vessie, il n'est péritonisé que sur sa partie inférieure
- B) En avant des cornes s'insèrent les oviductes ainsi que le ligament large
- C) Le ligament utéro-ovarien s'insère en arrière
- D) Il est antéfléchi mais rétroversé
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 11 : A propos des parois du petit bassin :

- A) Les crêtes sacrées médianes délimitent en bas les cornes du sacrum par où passe S5
- B) L'artère glutéale supérieur passe dans le canal sus-piriformique tandis que l'artère glutéale inférieure passe dans le canal sous-piriformique
- C) À gauche, l'uretère croise les vaisseaux iliaques et en dedans de la bifurcation primitive entre externe et interne
- D) Le nerf sciatique est innervé par les mêmes racines que le plexus lombaire
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

QCM 12 : A propos des parois du petit bassin :

- A) Le promontoire est le bord antérieur de C1
- B) L'acétabulum regarde en bas, en avant et en dehors
- C) La symphyse pubienne est une articulation synoviale
- D) L'ilio-psoas tapisse la face supérieure du petit bassin
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

Les QCM 13 à 15 sont des relations de cause à effet (Vrai Vrai lié, VV non-lié, Vrai Faux, Faux Vrai, Faux Faux)

QCM 13 : A propos du SNV du petit bassin :

S'il y a une déficience du parasymphatique, l'homme aura une éjaculation rétrograde **CAR** le parasymphatique permet la contraction involontaire du sphincter lisse.

- A) VVL B) VVNL C) VF D) FV E) FF

QCM 14 : A propos du périnée cutané chez la femme :

Le poil du mont pubis est de forme polygonal **CAR** si il était circulaire comme un cheveu il ne pourrait pas permettre l'adhérence des parasites.

- A) VVL B) VVNL C) VF D) FV E) FF

QCM 15 : A propos du triangle antérieur du diaphragme périnéal :

Durant l'excitation sexuelle on a une augmentation de la turgescence du gland clitoridien **CAR** les muscles ischio-caverneux vont se contracter, ce qui chasse le sang des piliers vers le gland et permet au ligament commun des ischio-caverneux de comprimer les vaisseaux pour éviter le retour sanguin.

- A) VVL B) VVNL C) VF D) FV E) FF