

CORRECTION ANAT 4:

- 1) A
2) A
3) C: C'est parce que les artères qui la vascularise sont grêles
4) C: C'est l'angle externe qui va s'ouvrir.
5) D: Face postérieure de la patellaire
6) E
7) A
8) E
9) D L'articulation sacro iliaque est une articulation synoviale mais pratiquement immobile
10) E Hélice à 2 pales. L'os coxal est formé par la fusion de 3 os: l'ilion; l'ischion et le pubis (QCM année 2007)
11) C Seule la partie périphérique de l'acetabulum est encrouté de cartilage
12) D Vue endopelvienne
13) A
14) E (QCM 2000) Le détroit supérieur a la forme de 2 ovoïdes centrés vers l'avant → le bébé devra tourner la tête pour passer par l'un des 2 ovoïdes
15) B
16) B
17) C
18) C : Mobilité possible du coccyx pouvant faciliter le passage du détroit inférieur
19) E : oblique en arrière et en dds, la FOI sépare maxillaire et sphénoïde
20) A
21) B
22) B : les artères cérébelleuses supérieures peuvent être issues de la partie proximale des cérébrales postérieures.
23) A
24) C : c'est le tronc basilaire qui est issu de l'anastomose
25) D La suture métopique précède la synostose des frontaux
26) D
A: Le fémur est l'os de la cuisse
B: Tarse, métatarse et phalanges
C: Seulement les os longs
27) B
2: C'est l'angle postérieur
5: Un **angle** postérieur!
28) A: Fossette du ligament rond non encroutée de cartilage
29) D: Du grand aDDucteur attention!
30) E
2: Pas la fibula
3: C'est l'inverse
31) D: Il travaille en arrachement
32) B
A: Le 1/3 externe
C: Ce sont les vaisseaux circonflexes et les artères issues de muscles environnants
E: Endosté
33) C (tout est sur le schéma, donc a savoir refaire les yeux fermés)
A: Convexe
B: Rétro-spinale
E: Allez on se calme et on recommence
34) A
35) A: C'est 50% de la **rotation** qui se fait entre C1 et C2
36) A
37) C (QCM de l'année dernière ☺)
38) C
La vessie se projette en regard le trou obturateur
C'est le col de l'utérus qui est en regard de l'épine ischiatique
Le détroit supérieur a la forme de 2 ovoïdes centrés vers l'avant
39) C
40) D
41) E (QCM 2003)
42) E : -nerf VIII
- la surdité verbale ne s'observe qu'en cas d'atteinte du côté dominant
- c'est l'inverse
43) D – le sinus sagittal inférieur se draine dans le sinus droit qui se jette ensuite dans le carrefour - circulation qui e fait d'avant en arrière
- partie postérieure du foramen jugulaire
- caverneux se draine dans le sinus pétreux supérieur qui rejoint ensuite le sinus transverse
44) B : 3- apophyse coronioïde (odontoïde = axis)
4- styloïde = tympanal et mastoïde = rocher
5- le bregma se voit sur une vue supérieure
45) D
46) C – foramen magnum = passage du XI med
- trou condylien = passage du XII
47) E – Le canal central de la moelle es virtuel !
- angulaire = T => P/O
- dans la concavité du ventricule latéral
- la fissure pariéto-occipitale se voit essentiellement sur une vue médiale.
48) E
49) A 1- ce sont les fissures primordiales !
4- il s'agit d'un signe de l'ataxie tabétique
50) D