



QCM 1 : A propos des trous visibles sur la vue supérieure intra crânienne de la base du crâne, on peut dire que : donnez la/les vraies

- A) Le nerf optique passe dans le foramen ophtalmique
- B) Les filets du nerf facial passent par le foramen temporal
- C) Le III passe dans le trou rond
- D) Le IV passe dans le trou rond
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos des trous visibles sur la vue supérieure de la base du crâne, on peut dire que :

- A) Les filets du nerf olfactif passent dans la lame criblée du frontal
- B) Le IV passe dans le trou ovale
- C) L'artère méningée moyenne passe dans le trou condylien
- D) L'artère vertébrale pénètre dans le crâne en passant par le foramen magnum du temporal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos des artères de la tête et du cou, on peut dire :

- A) L'encéphale est exclusivement vascularisé par les artères carotides internes
- B) L'artère carotide interne gauche naît du tronc brachiocéphalique gauche
- C) L'artère sous-clavière droite naît de la crosse de l'aorte
- D) Le trigone carotidien se projette en regard du corps de C6
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos de l'artère carotide interne, on peut dire :

- A) Qu'elle ne donne pas de rameau artériel collatéral
- B) Que ses deux branches terminales sont l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure
- C) Qu'après son origine, elle traverse le diaphragme stylien et pénètre dans la glande parotide
- D) Qu'elle sort du rocher par le foramen pétreux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : Parmi les rameaux collatéraux ou terminaux de l'artère carotide externe, on peut citer :

- A) L'artère vertébrale
- B) L'artère ophtalmique
- C) L'artère thyroïdienne moyenne
- D) L'artère thyroïdienne inférieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos des nerfs de la tête et du cou, on peut dire que :

- A) Le nerf phrénique naît du rameau antérieur du quatrième nerf cervical
- B) Le nerf vague chemine dans l'angle dièdre postérieur entre l'axe carotidien et la veine jugulaire interne
- C) L'anse cervicale est un rameau du nerf phrénique
- D) Le nerf laryngé inférieur ou nerf récurrent est le nerf sensitif du larynx, ceci est sa fonction principale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos de la sensibilité de la tête du cou, on peut dire que :

- A) Le V1 innerve la peau de la mandibule
- B) La région auriculaire est innervée par un rameau du troisième nerf spinal cervical
- C) La peau de la région occipitale est innervée par le rameau postérieur du deuxième nerf spinal cervical
- D) La peau de la partie basse de la gorge est innervée par le rameau cervico-facial du VII
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 :

La section du nerf facial entraîne la paralysie des muscles de la mandibule

Parce que le nerf facial innerve les muscles peauciers de la tête et du cou

