

ANNALES CLASSEES : FORMATION SQUELETTE CRANIOFACIAL (1)

QCM 1 : A propos de la mise en place de la face et de la cavité buccale (semaine 6/7 et 7/8 du développement embryonnaire) (2013) :

- A) Le processus intermaxillaire est issu de la fusion des processus nasaux médians et des bourgeons maxillaires
- B) La gouttière naso-lacrymale se situe entre le processus nasal médian et le processus nasal latéral
- C) La partie inférieure de la joue est faite de la fusion des parties latérales des bourgeons nasaux et maxillaires
- D) Les bourgeons nasaux latéraux fusionnent avec les bourgeons mandibulaires et participent à la formation des ailes du nez
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos de la mise en place de la cavité buccale entre les semaines 7 et 10 de la vie intra-utérine (2015) :

- A) Les ailes du nez sont formées par la fusion des bourgeons nasaux médians avec les bourgeons maxillaires
- B) Les bourgeons nasaux médians fusionnés constituent le processus intermaxillaire d'où dérive le palais secondaire
- C) Le massif latéral de la face à l'origine des parties latérales de la lèvre supérieure et de la joue est constitué par la confluence entre les extrémités des bourgeons maxillaires et mandibulaires
- D) Le septum nasal médian est formé à partir du bourgeon fronto-nasal et des bourgeons nasaux médians
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos des fentes labiales, labio-alvéolaires et/ou labio-palatines (2015) :

- A) La fente labiale atteint aussi bien la lèvre inférieure que supérieure, elle est due à une altération de la fusion des bourgeons maxillaire ou mandibulaire avec le bourgeon nasal médian du même côté
- B) La fente labio-alvéolaire va jusqu'au canal palatin postérieur et porte aussi sur l'arcade dentaire par manque de fusion entre le palais primaire et secondaire
- C) La fente palatine est due à l'absence de fusion des os palatins, elle met en communication la cavité buccale avec une seule fosse nasale ou les deux
- D) La moitié des fentes labiales ou labio-palatines font partie d'environ 300 syndromes malformatifs différents à hérédité mendélienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : Mise en place de la face et de la cavité buccale. A propos des différents bourgeons de la face (2016) :

- A) Le septum nasal médian est formé à partir du bourgeon fronto-nasal et des bourgeons nasaux médians
- B) La gouttière naso-lacrymale est constituée par la dépression entre le bourgeon nasal latéral et le bourgeon maxillaire
- C) Le 2^{ème} arc pharyngé est scindé en bourgeons maxillaires et mandibulaires
- D) Les bourgeons nasaux médians se développent pour s'unir sur la ligne médiane ; ils constitueront le dos, la partie moyenne et la pointe du nez
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : Mise en place de la face et de la cavité buccale. A propos du palais (2016) :

- A) Les bourgeons nasaux médians fusionnés constituent le processus intermaxillaire d'où dérive le stomodeum
- B) L'aileron nasal sépare la cavité nasale unique de la cavité buccale à la 10^{ème} semaine intra-utérine
- C) Le palais résulte de la confluence de 3 bourgeons : le bourgeon prémaxillaire, le bourgeon palatin et le bourgeon prépalatin
- D) Le bourgeon prémaxillaire ou palais primaire dérive du bourgeon nasofrontal via les bourgeons nasaux médians et le processus intermaxillaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

CORRECTION

QCM 1 : E (p.3)

- A) Faux: Le processus intermaxillaire est issu de la fusion des bourgeons nasaux médians
- B) Faux: La gouttière naso-lacrymale est entre le bourgeon nasal latéral et le bourgeon maxillaire
- C) Faux: La partie inférieure de la joue est faite de la fusion des bourgeons maxillaires et mandibulaires
- D) Faux: Ailes du nez = fusions des bourgeons nasaux latéraux et des bourgeons maxillaires

QCM 2 : D

- A) Faux : ce sont les bourgeons nasaux latéraux qui fusionnent avec les bourgeons maxillaires (p.3)
- B) Faux : c'est le palais primaire qui dérive du processus intermaxillaire (p.5)
- C) Faux : le massif latéral est constitué par la confluence des bourgeons maxillaires et le processus intermaxillaire (p.4)
- D) Vrai (p.4)

QCM 3 : E (p.9)

- A) Faux : la fente labiale n'atteint que la lèvre supérieure
- B) Faux : elle va jusqu'au canal palatin antérieur
- C) Faux : la fente palatine est due à l'absence de fusion des processus palatins (≠ os palatins)
- D) Faux : 30%

QCM 4 : ABD

- A) Vrai (p.4)
- B) Vrai (p.3)
- C) Faux : 1^{er} arc (p.2)
- D) Vrai (p.3)

QCM 5 : D

- A) Faux : palais primaire, partie antérieure de l'arcade dentaire maxillaire et le philtrum
- B) Faux : aileron nasal = 6^{ème} semaine (p.4)
- C) Faux : bg prémaxillaire + 2 bgs palatins (p.5)
- D) Vrai (p.4)