

## **RELATION DE CAUSE À EFFET**

La première partie de la phrase exprime un fait, la seconde donne la raison de ce fait.

A = le fait et la raison sont tous deux justes et liés

B = le fait et la raison sont tous deux justes mais non liés

C = le fait est juste mais la raison est fausse

D = le fait est faux mais la raison est juste

E = le fait et la raison sont faux

### **QCM 1 :**

Les femmes multipares sont des patientes ayant un risque de cystocèle relativement plus élevé que la moyenne CAR la fréquence de survenue des traumatismes périnéaux augmente avec le nombre d'accouchements par voie basse.

### **QCM 2 :**

l'ovaire droit peut se drainer vers les nœuds lymphatiques du rein droit,

CAR

La veine ovarienne droite se jette dans la veine rénale droite

### **QCM 3 :**

Sur une radiographie centrée sur l'acétabulum chez l'enfant on peut observer des zones non ossifiées

CAR

L'os coxal résulte de la fusion de 3 os, cette dernière étant incomplète à la naissance.

### **QCM 4 :**

L'acétabulum est visible sur une vue antérieure de l'os coxal CAR l'acétabulum est antéversé de 30°.

### **QCM 5 : Concernant l'appareil urinaire, donnez la réponse vraie :**

A. L'urine entre dans la vessie par l'urètre et en sort par l'uretère.

B. La capacité d'une vessie de femme est d'environ 2L.

C. L'uretère gauche croise l'artère iliaque commune gauche de dedans en dehors de celle-ci.

D. L'urètre présente 2 rétrécissements, un au niveau du détroit inférieur et un à la jonction urétéro-vesical.

E. Les artères qui vascularisent la vessie sont toutes issues de l'artère iliaque externe : l'A. ombilicale, l'A. vaginale, l'A. utérine, l'A. honteuse interne et l'A. obturatrice.

### **QCM 6 : Concernant l'anatomie générale du petit bassin de la femme, donnez la réponse vraie :**

A. Le noyau fibreux central du périnée est l'élément principal de la stabilité pelvienne.

B. Au centre du triangle postérieur du périnée musculaire se trouve le sphincter lisse de l'anus.

C. Le bulbe vestibulaire va en se contractant abaisser le genou du clitoris et le durcir.

D. Le faisceau ilio-coccygien du muscle levator ani est lui-même composé de 2 faisceaux, le pubo-génital et le pubo-rectal.

E. Le diaphragme pelvien se trouve dans un plan plus superficiel que le diaphragme uro-génital.

### **QCM 7 : Concernant l'utérus et ses annexes, donnez la réponse fausse :**

A. Le ligament large unit l'utérus aux parois latérales de la cavité pelvienne

B. Le ligament large est constitué par la réflexion du péritoine sur l'utérus et ses annexes

C. Le mésosalpynx recouvre les trompes et constitue l'aileron postérieur du ligament large

D. Le mésovarium recouvre le ligament utéro ovarien

E. Le paramètre, segment caudal du ligament large est fixe et large.

**QCM 8 : Parmi ces propositions, donnez la proposition juste :**

- A. Sur une coupe sagittale du petit bassin, l'utérus du fait de son antéversion entre en contact direct avec la face dorsale de la vessie
- B. Le ligament suspenseur du clitoris le relie à la symphyse pubienne
- C. L'espace pré vésical de Retzius est recouvert de péritoine et contient des plexus veineux
- D. Sur un coupe horizontale du petit bassin, le ligament rond de l'utérus est visible dirigé vers la paroi postérieure de l'abdomen.
- E. Sur une coupe sagittale du petit bassin , on peut voir d'avant en arrière : l'espace pré-vesical de Retzius – Vessie – Septum Vesico vaginal – anneau fibreux du périnée – Vagin – Septum recto –vaginal - Rectum

**QCM 9 : En ce qui concerne l'appareil génital féminin, donner les réponses justes.**

- 1. Dans son ensemble l'utérus est antéversé
- 2. Le ligament rond par des cornes de l'utérus pour aller jusqu'aux petites lèvres.
- 3. Le vagin présente un angle ouvert de 60° en avant.
- 4. Lors de l'examen clinique du col, le test au lugol permet de différencier l'exocol qui devient brun acajou et l'endocol qui reste rosé.
- 5. Lors de la pose d'un spéculum, on l'insère d'abord selon un plan sagittal, puis on le renverse pour le mettre dans un plan frontal afin de pouvoir observer le col de l'utérus.

A. 1,2,3    B. 2,3,4    C. 3,4    D. 1,4,5    E. 1,4

**QCM 10 : Concernant l'anatomie du petit bassin de la femme, donnez les propositions vraies :**

- 1. Le plexus sacro-coccygien résulte de l'anastomose entre le plexus sacré et le rameau antérieur du nerf coccygien.
- 2. La plus grande diagonale du périnée cutané relie les projections anatomiques des 2 ischions.
- 3. Clitoris et bulbe vestibulaire sont les 2 formations érectiles du sexe féminin.
- 4. Le clitoris présente sur sa face ventrale ses principaux vaisseaux.
- 5. La peau du triangle postérieur du périnée est essentiellement innervée par le plexus sacro-coccygien.

A : 1, 2, 5                      B : 2, 3, 5                      C : 2, 3, 4                      D : 3, 4, 5                      E : 1, 4

**QCM 11 : Concernant l'anatomie du petit bassin de la femme, donnez les propositions fausses :**

- 1. Le feuillet supérieur du fascia pelvien présente 4 épaissements tendus à partir de l'épine iliaque postéro-inférieure.
- 2. Le triangle postérieur du périnée est innervé par les nerfs rectaux inférieurs qui proviennent des plexus honteux.
- 3. Sur le triangle postérieur du périnée cutané, les paquets hémorroïdaires externes se trouvent à 1h, 3h et 8h.
- 4. La muqueuse du rectum va présenter 3 incisures.
- 5. La limite entre la partie ampullaire et le canal anal est constituée par la ligne de réflexion du péritoine à la surface du rectum.

A : 1, 4, 5                      B : 2, 3                      C : 1, 3, 4                      D : 2, 4, 5                      E : 1, 2, 5

**QCM 12 : Concernant le rectum, donnez les propositions vraies :**

- 1. Les colonnes de Morgani sont réunies à leurs extrémités supérieures par des valvules semi-lunaires.
- 2. Le canal anal est délimité en bas par la ligne ano-cutanée et en haut par la ligne ano-rectale.
- 3. Les vaisseaux du rectum sont contenus dans sa couche intermédiaire.
- 4. Les fibres du muscle levator ani viennent s'insérer sur celles du sphincter interne lisse du rectum.
- 5. Le muscle levator ani possède 2 portions, une dite élévatrice et une dite sphinctérienne.

A : 1, 4                      B : 2, 3, 4                      C : 1, 3, 4                      D : 2, 3, 5                      E : 1, 2, 5

**QCM 13 : Concernant l'appareil uro-génital de la femme, donnez les propositions justes ;**

1. Les trompes utérines sont disposées transversalement, légèrement antéversées.
2. Le bord latéral de l'utérus est péritonisé
3. Le ligament lombo-ovarien (ou ligament suspenseur de l'ovaire) relie l'ovaire à la paroi antérieure de l'abdomen
4. L'artère utérine à un trajet ascendant le long du bord latéral de l'utérus
5. L'urètre peut recevoir une partie de sa vascularisation par l'artère utérine.

A : 1, 2, 3                  B : 3, 4                  C : 1, 2, 5                  D : 2, 3, 5                  E : 4, 5

**QCM 14 : Concernant le bassin, donnez les propositions vraies :**

1. Le tendon réfléchi du muscle droit antérieur s'insère au dessus de l'acétabulum.
2. La surface quadrilatère est la projection endo-pelvienne de l'acétabulum.
3. Seule la partie centrale de l'acétabulum est encroûtée de cartilage.
4. Le nerf obturateur passe dans une gouttière creusée le long du bord supérieure de la branche ilio-pubienne.
5. La symphyse pubienne fait un angle de 45° avec l'horizontal.

A : 1, 2, 3                  B : 2, 3, 4                  C : 3, 4, 5                  D : 1, 2, 5                  E : 2, 4, 5

**QCM 15 : Concernant le bassin, donnez les propositions vraies :**

1. Le tubercule du moyen fessier se situe entre le tiers moyen et le tiers postérieur de la crête iliaque.
2. La tubérosité iliaque se situe en arrière de la surface auriculaire.
3. La surface auriculaire forme un angle ouvert en arrière.
4. La ligne arquée rejoint en arrière le promontoire.
5. La tubérosité iliaque est une zone où l'os est fin.

A : 1, 2, 3                  B : 2, 3, 4                  C : 3, 4, 5                  D : 1, 2, 5                  E : 2, 4, 5