

Les organes du petit bassin


I. Le vagin

1) Généralités

♥ **Le Vagin** = étui pénien de la femme, c'est l'organe de la copulation et l'élément le plus bas de la filière génitale de la femme

→ Mesure 8cm et est **extensible++**

→ Le **toucher vaginal** permet de monter jusqu'au cul-de-sac du vagin situé en avant du cul-de-sac recto-vaginal de Douglas (élément le plus déclive de la grande cavité péritonéale++)



NB : On peut arriver au cul de sac de Douglas par le **toucher vaginal** (à *compté VRAI en QCM*)

→ Il fait un **angle de 60°** avec **l'horizontale ouvert en arrière**++ → **concave en arrière** à cause du **cap anal**++

♥ Le vagin est aplati d'avant en arrière, on lui décrit ainsi une **face antérieure** et une **face postérieure**++ On le retrouve entre la vessie en avant et le rectum en arrière.

→ On peut l'explorer au **speculum** (on en trouve des spéciaux pour les femmes vierges).

Le speculum se rentre dans un **plan sagittal** (de la même façon que la fente vaginale) puis il faudra le basculer de 90°. Il permettra de voir l'exocol de l'utérus.

♥ La **partie la plus basse** = **introït vaginal** et la **plus haute** = **dôme vaginal** = **fornix** dans lequel s'insère l'utérus.

→ L'éjaculation se fait au niveau de la **partie postérieure** du **fornix** = **cul-de-sac postérieur** = **lac spermatique**

NB : Le **fornix** correspond à la partie postérieure (=le **fond**) du vagin où s'insère l'utérus, il inclut tous les **culs de sac vaginaux**. À différencier du **lac spermatique**= cul de sac postérieur du **fornix**.

Le **col de l'utérus** (très peu sensible) est repoussé lors de l'éjaculation car le col de l'utérus prendra appui sur la **face postérieure** du vagin ++

Autour du col on retrouve les deux cul-de-sac latéraux.

2) Ses trois tuniques De l'extérieur vers l'intérieur, on retrouve:

- ✓ **La tunique externe conjonctive**
- ✓ **La tunique moyenne musculaire lisse** : à contraction **involontaire** qui donne l'élasticité au vagin
- ✓ **La tunique interne muqueuse pavimenteuse** : soumise à **desquamation** avec variation au cours du cycle de la femme. Lieu de **frottis vaginaux** et de frottis du col de l'utérus.


† **Pathologie :** Lors d'une **péritonite**, la palpation du **cul-de-sac de Douglas** (alors plein de pus) entraîne le **cri de Douglas**. *C'est un cri de douleur brutale émis en cas d'infection de la grande cavité péritonéale.*

♥ Selon Ambroise Paré, le **vagin** de la femme a l'aspect du **palais d'un chien ++** avec ses deux faces aplaties l'une sur l'autre.

→ L'intérieur est **rosé** parfois **brûnatre**, avec au fond, le col de l'utérus.

→ **Sur sa face antérieure:**
On trouve les **rides du vagin** = **crêtes du vagin** = **plis transverses du vagin** (très épais au niveau de la partie basse et s'atténue vers le haut) qui peuvent s'atténuer chez la femme âgée et après les accouchements .

→ **Au centre** on retrouve la **colonne du vagin**, empreinte (4cm) de l'urètre en avant. Au dessus de cette colonne on retrouve le **triangle** = **trigone vaginal** qui correspond à la



projection sur la face antérieure du vagin du trigone vésical .

→ **Sur sa face postérieure:** On retrouve les mêmes éléments de façon **atténuée** et **SANS** colonne ou trigone ++


3) Les rapports du vagin:

→ **En avant:** avec la vessie (séparé par le septum vesico-vaginal=vestige peritoneal) et l'urètre

→ **En arrière:** le cul-de-sac recto-vaginal de Douglas et le septum recto-vaginal

→ **En bas et en arrière:** le NFPCP

→ **Latéralement:** le périnée cutané (en bas), le diaphragme périnéal, la LSRGP (élément de



stabilité fibreux qui entoure les vaisseaux revu ultérieurement) et le L.A++

4) Rappel sur la lubrification vaginale

♥ **L'Orthosympathique** (hypoG supérieur et nerfs viscéraux) entraîne **transsudation** vaginale, et la **lubrification** par la **sécrétion des glandes vestibulaires** majeures et mineures et la **sécrétion des glandes para-urétrales de Skene**.

→ Tout ceci est sous dépendance hormonale (oestrogènes++)

† **Femmes fontaines:** ce n'est **PAS** une **éjaculation féminine++** Il s'agit d'un mix de deux phénomènes:

→ **Hypersécrétion** des **glandes urétrales** et **para-urétrales** sous dépendance de l'orthosympathique .

→ Contraction involontaire du **détrusor** (muscle lisse de la vessie) entraînant des jets d'urine sous dépendance du **parasymphatique** .

ou la reproduction sont interdites.


II. L'utérus

1) Généralités

♥ C'est l'organe de la **gestation** qui mesure **7 cm de haut** et **5 cm de large**

→ Partiellement **péritonisé ++**

→ Situé entre la vessie et le rectum, situé en dessous de la **cavité péritonéale**



→ Forme d'un **tronc de cône à base supérieure**

→ Quatre parties: Fond, corps, isthme et col qui s'ouvre dans le vagin


→ L'utérus présente une **antéversion** (inclinaison vers l'avant) et une **antéflexion** (plié sur lui-même) +++

➤ Le col de l'utérus

♥ Chez la **nullipare**, il est perforé de façon **régulière** soit annulaire soit sous forme de fente transversale

→ Chez la **multipare**, il est **déchiqueté/irrégulier**, on l'assimile à un **museau de tanche**

→ Le col de l'utérus est **rosé** lorsqu'il est **sain ++**



a vente ou la reproduction sont interdites.

♥ Deux examens de dépistage du cancer du col:

	Col de l'utérus sain	Cellules cancéreuses acidophiles
Coloration à l' <u>acide acétique</u>	ROSE	BLANCHES
Coloration au <u>lugol</u>	ACAJOU (riches en glycogène)	ROSÉES

➤ Vue générale de l'utérus

♥ Dans sa partie supérieure, l'utérus présente deux angles: les **cornes de l'utérus** où s'insèrent le **ligament rond** (vers l'avant jusqu'aux **grandes lèvres**), le **ligament utéro-ovarien** et les **trompes** de Fallope ou **oviductes**

→ Il est dans son ensemble **rosé**

2) La cavité utérine

♥ Forme d'un **triangle à base supérieure**, ou d'un **T** (forme d'un stérilet)

→ Cette cavité est prolongée par le **canal du col de l'utérus = endocol** qui présente des **replis palmés**.++
On le nomme **arbre de vie** du col de l'utérus.


3) Ses trois tuniques +++

✓ La tunique **interne muqueuse = endomètre**: soumise aux cycles des menstruations et lieu des curetages.

Au niveau du **col**, cette muqueuse présente des différences histologiques: **unistratifiée (endocol)** et **pavimenteuse (exocol)**. ++

✓ La tunique **moyenne musculaire = myomètre**: muscle utérin formé de différentes fibres qui se contractent lors de l'accouchement pour permettre l'expulsion de l'enfant et la délivrance (=l'expulsion du placenta).

○ **Couche interne plexiforme**



- Couche moyenne **circulaire**
- Couche externe **longitudinale**
- ✓ La tunique **externe conjonctive** : selon la localisation, ce sera du péritoine ou bien le fascia utérin.

4) L'innervation de l'utérus

♥ L'utérus possède:

→ D'une part des **plexus nerveux intra-utérins végétatifs++**

→ Reçoit d'autre part, une **innervation viscérale végétative:**

les nerfs viscéraux issus du **plexus hypogastrique supérieur** qui apporte le **contingent orthosympathique** alors que le **contingent parasymphathique** provient de S2 S3 S4 (nerfs érecteurs d'Eckart).

5) L'innervation du vagin

♥ **Le vagin** possède lui aussi une innervation végétative pour sa **partie supérieure**.

L'innervation de sa **partie inférieure** provient de **S2, S3 et S4** par l'intermédiaire de **nerfs somatiques** (notamment le **nerf honteux**).


† **Péridurale: anesthésie** des **racines lombaires basses et sacrées**. On anesthésie alors la région à **partir de S2, S3 et S4** entraînant l'**analgésie vaginale** mais persistent les douleurs utérines et les contractions car les **cellules nerveuses intra-utérines** elles, ne sont aucunement anesthésiées.

III. Les annexes

1) Les trompes de Fallope = oviductes

♥ **Les oviductes** qui partent des cornes de l'utérus ont la **même composition** que celui-ci mais de **façon réduite**.

→ Ils présentent une **partie intra-utérine** (l'**ostium** dans l'utérus), une partie **rétrécie** (l'**isthme**), une partie **dilatée** (l'**ampoule**) et se terminent par une sorte d'entonnoir à franges (le **pavillon**) qui coiffe l'ovaire avec une frange plus développée que les autres (**frange ovarique de Richard**).



→ Fécondation: dans l'oviducte \neq Nidation: dans la cavité utérine

→ L'oviducte s'ouvre dans la **grande cavité péritonéale**

† **Les pets vaginaux:** physiologiques après copulation par emmagasinement d'air mais peuvent s'avérer dangereux s'ils remontent dans l'oviducte jusqu'à pénétrer dans la **grande cavité péritonéale** et entraînent ainsi un **pneumopéritoine**.

Ce dernier sera visible en imagerie comme un croissant gazeux au niveau d'une coupole diaphragmatique.


2) L'ovaire

♥ **L'ovaire** est la gonade de la femme

→ C'est une **glande située dans la grande cavité péritonéale ++** mais qui n'est **PAS** recouverte de **péritoine+++**

➔ **L'ovaire est donc intra-péritonéal mais non péritonisé ++++++**

† **les cancers de l'ovaire :** deviennent tout de suite des **cancers intra-abdominaux** et se traduisent fréquemment par un envahissement du **péritoine** entraînant une **ascite**.



† **Grossesse extra- utérine :** Lorsque la fécondation et la nidation se font dans l'oviducte, on parle de **grossesse extra- utérine** et cela correspond à une **urgence chirurgicale** car on risque une **rupture de l'oviducte** et une **hémorragie cataclysmique** pouvant entraîner la mort de la patiente.

♥ C'est une glande **exocrine** et **endocrine** :

✓ La **corticale/cortex** assure la **ponte ovulaire** et la **sécrétion de progestérone** (lutéine) par le **corps jaune** → double fonction

- ✓ La médulla/medulla assure la sécrétion des **oestrogènes**.


→ Macroscopiquement, ressemble à une **amande** (4cm de long et 3cm de large). Il est **petit chez la petite fille, se développe à la puberté et s'atrophie à la ménopause**

→ De couleur blanche, on voit à sa surface les **follicules ovariens** et les **cicatrices** après ponte ovulaire → **surface bosselée**

➤ La fixité de l'ovaire

♥ L'ovaire est relativement **mobile** au cours de la vie car :

- ✓ Chez la nullipare, les trompes sont **transversales** et l'ovaire est **antérieur/pré-urétéral** dans la **fossette pré-ovarique**.
- ✓ Chez la multipare, les trompes sont **obliques** et l'ovaire est **postérieur/post-urétéral** dans la **fossette retro-ovarique**.



♥ Les moyens de fixité sont assez rudimentaires :

→ **Ligament utéro-ovarien**

→ **Mésovarium** (un des ailerons du ligament large revu ultérieurement) sous tendu par le ligament utéro-ovarien arrive jusqu'au hile de l'ovaire.

→ **Ligament lombo-ovarien**

→ **Ligament tubo-ovarien**: entre la frange ovarique de Richard et l'ovaire

♥ Il faut savoir que l'artère gonadique part de l'aorte, passe en dehors de la bifurcation de

- Des **artères vésicales** et **vésico-vaginales**
- **L'artère de l'uretère** lors des on croisement avec celui-ci

♥ **L'ovaire** est vascularisé par **l'artère gonadique** qui provient de l'aorte abdominale, par **l'artère tubaire** et par le **rameau ovarique de l'artère utérine**

ATTENTION: faites attention à pas confondre l'artère gonadique qui provient de l'aorte et l'ovarique qui provient de l'utérine.

♥ **Le vagin** est vascularisé par **l'artère obturatrice** (rameau de l'iliaque interne), **PRINCIPALEMENT** par **l'artère vaginale ++** (rameau de l'iliaque interne), par **l'artère ombilicale**, par **l'artère honteuse** et des **rameaux de l'artère utérine** que dit précédemment (notamment les **cervico-vaginales**).

♥ **La trompe** est vascularisée par **l'artère tubaire** (rameau de l'utérine).

Il n'y a jamais de déficience artérielle grâce aux nombreuses anastomoses+++

➤ Drainage lymphatique

♥ **L'utérus**, siège de cancers aux deux extrêmes de la vie: **col** chez la **jeune femme** et **corps** chez la **femme âgée++**

→ Il se draine au niveau de la **chaîne iliaque interne, iliaque externe, iliaque primitive** et même vers les **chaines sacrées** pour remonter vers les **chaines abdomino-aortiques**.

→ Le **ligament rond** part de l'utérus et s'étend jusqu'à la grande lèvre, ainsi le drainage lymphatique de l'utérus peut s'effectuer également au niveau des **noeuds inguinaux superficiels**, c'est-à-dire de part et d'autre de la crosse de la veine grande saphène pour ensuite remonter vers les noeuds les plus supérieurs.

Les **métastases** de cancers de l'utérus peuvent donc s'étendre au niveau du triangle fémoral= triangle de Scarpa.

♥ **Le vagin** possède les mêmes voies de drainage que l'utérus mais **PAS de drainage vers les chaines sacrées**.

→ **L'introït vaginal** étant situé au plus bas peut

donc, de manière identique à l'utérus, se drainer dans les **chaines inguinales superficielles**.

♥ **L'ovaire** se draine vers les **voies iliaques interne et externe**, **l'ovaire droit** se draine dans les **chaines abdomino-aortiques** alors que **l'ovaire gauche** se draine vers les **noeuds lymphatiques du hile rénal gauche** ++++++

V. Les anomalies mülleriennes


† **Malformations utérines** : Les malformations peuvent être source de **pathologies** ou de **stérilité**.

† **L'utérus à éperon central**: au niveau du myomètre, il y a une lame qui divise en deux la cavité utérine

† **L'utérus à cloison centrale**: lorsque l'éperon descend jusqu'au **col**

† **L'utérus bi-corps**: utérus totalement vestigial avec **deux cavités utérines mais un seul col (mono-cervical)**

† **L'utérus bi-corps et bi-col**: **bi-cervicale**



VI. Les anomalies wolffiennes

† **Anomalies wolffiennes** : Il s'agit de persistance chez la femme adulte de canal wolffien qui aurait dû disparaître pouvant entraîner des pathologies qui leur sont propres voire même des cancers spécifiques identifiés par l'anapath.

† **Hydroadite vésiculeux = sessile**: au niveau du pavillon (5)

† **Épooaphore**: entre l'ovaire et la trompe (6)

† **Paraophore**: le long du corps de l'utérus (7)

† **Canal para-utérin**: le long de l'utérus et du vagin (8)

