

DM n°2 : SUJET TYPE CONCOURS

Tutorat 2019-2020 : 15 QCMS – Durée : 20 minutes



QCM 1 : A propos des parois du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'articulation sacro-iliaque est essentielle à la stabilité du bassin, à la différence de la symphyse pubienne
- B) Le bord antérieur de l'aile du sacrum fait partie du détroit supérieur
- C) Le détroit inférieur a un diamètre fixe, il ne peut pas être agrandi
- D) Le ligament ilio-lombaire est tendu entre le sacrum et l'épine ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos des parois du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sacrum est concave vers l'arrière
- B) L'articulation sacro-iliaque est une articulation en presse bouton
- C) La surface auriculaire se trouve au niveau du sacrum
- D) La symphyse pubienne ne possède pas de capsule articulaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos des parois du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le pubis fait partie du détroit supérieur
- B) Le bord postérieur de la tubérosité ischiatique est en dessous de l'épine ischiatique
- C) La grande échancrure ischiatique est au niveau du bord antérieur de l'os coxal
- D) Le bord supérieur du pubis est en dessous de l'épine du pubis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos des parois du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'éminence ilio-pectinée est en dessous de la gouttière du muscle du psoas
- B) L'éminence ilio-pubienne est au-dessus de la petite échancrure ischiatique
- C) La pale supérieure, composée du pubis et de l'ischion regarde en arrière, en bas et en dehors
- D) La cavité cotyloïde est au niveau de la face médiale de l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : Parmi ces artères, lesquelles sont des collatérales de l'artère iliaque interne ?

- A) Vaginale
- B) Utérine
- C) Vésicale inférieure
- D) Rectale moyenne
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 6 : A propos de l'innervation du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le plexus sacro-coccygien innerve la marge anale
- B) Le nerf sciatique passe dans le canal sus-pyramidal
- C) Le plexus lombo-sacré correspond à la réunion des rameaux antérieurs des nerfs spinaux L4 et L5
- D) Une lésion du nerf tibial entraînera le phénomène de steppage
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 7 : A propos de la vascularisation du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'uretère surcroise l'artère iliaque externe à droite
- B) Non ! C'est à gauche que l'uretère surcroise l'artère iliaque externe
- C) L'artère iliaque primitive se divise en artères iliaques interne et externe en regard de l'articulation sacro-iliaque
- D) L'artère glutéale supérieure chemine dans le canal sous-pyramidal
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 8 : A propos du périnée musculaire, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) On retrouve dans le triangle postérieur : le sphincter strié externe de l'anus ; le grand fessier (*liste exhaustive*)
- B) Le sphincter strié externe de l'anus n'est pas en contact avec le NFPC
- C) Le NFPC est qualifié comme « la clef de voute inversée de la statique périnéale », puisque c'est un élément majeur de stabilité
- D) Le muscle transverse superficiel est le plus volumineux des muscles transverses du périnée musculaire
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 9 : A propos des fascias pelviens, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le fascia périnéal supérieur est grêle et n'oppose aucune résistance
- B) Ce fascia tapisse la partie supérieure du muscle transverse profond
- C) Le fascia périnéal inférieur est épais et résistant
- D) Celui-ci s'étend en avant et referme l'espace périnéal
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 10 : A propos du diaphragme pelvien, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cystocèle correspond au phénomène au cours duquel le col de l'utérus glisse dans le vagin et apparaît à la vulve
- B) Les muscles du diaphragme pelvien sont dirigés vers le haut et le dedans
- C) Les muscles du diaphragme pelvien regardent vers le bas et le dedans
- D) Le faisceau pubo-rectal du muscle pubo-coccygien part du pubis, et s'insère sur le sphincter strié externe de l'anus, ainsi que sur le raphé ano-coccygien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos des moyens de stabilité du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La lame sacro-recto-génito-pubienne (LSRGP) tapisse le fascia supérieur du muscle transverse du périnée
- B) Le ligament large, formation ligamentaire ne présentant aucune résistance, recouvre en totalité le corps de l'utérus
- C) A la partie inférieure du cul-de-sac vésico-utérin (péritoine s'insérant entre vessie et utérus), on retrouve un accolement de péritoine : le fascia vésico-utérin
- D) L'aileron supérieur de la ligne de réflexion utérine (latérale) est sous-tendu par l'oviducte ; cette formation est aussi appelée mésosalpinx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos des organes du petit bassin :

- A) Les ovaires droit et gauche ont un drainage identique
- B) L'ovaire se draine vers les voies iliaques externe et interne
- C) Le ligament rond part des cornes de l'utérus pour aller jusqu'aux petites lèvres
- D) L'artère utérine passe en dessous de l'urètre pelvien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes

- A) Le pédicule rectal supérieur se draine vers le ganglion principal (de Mondor) qui se trouve au niveau de la bifurcation de l'artère mésentérique inférieure
- B) La veine mésentérique supérieure rejoint le tronc spléno-mésaraïque pour former la veine porte
- C) Le corigator ani est formé de fibres lisses et de fibres striées
- D) Les valvules semi-lunaires (valvules de Houston) sont des valvules anales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 :

Le muscle obturateur interne est dit pelvi-trochantérien

PARCE QUE

Son insertion distale est au niveau du grand trochanter fibulaire

QCM 15 :

Chez la femme multipare, les trompes sont transversales et l'ovaire se trouve dans la fossette pré-ovarique

PARCE QUE

L'utérus est partiellement péritonisé