

QCM 1 : A propos des parois du petit bassin, donnez la (ou les) vraie(s) :

- A) Le bord supérieur du pubis est dans le même plan que l'épine iliaque antéro-supérieure
- B) La vallée du psoas est sur le bord postérieur de l'os coxal
- C) L'épine iliaque antéro-inférieure est au-dessus de l'échancrure inter-épineuse antérieure
- D) La surface articulaire du pubis est recouverte de graisse chez la femme pour amortir les chocs lors des rapports sexuels
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos des parois du petit bassin, donnez la (ou les) vraie(s) :

- A) Le détroit supérieur est formé du pubis en arrière
- B) Le promontoire est le bord antérieur du corps de S1 et est encroûté de cartilage
- C) Le bord antérieur de l'aile du sacrum fait partie du détroit supérieur
- D) La symphyse pubienne est une articulation synoviale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos des parois du petit bassin, donnez la (ou les) vraie(s) :

- A) La ligne arquée fait partie du détroit supérieur
- B) La symphyse pubienne fait un angle de 45° avec l'horizontale ouvert en arrière
- C) L'épine iliaque antéro-supérieure (palpable) est au-dessus de l'échancrure inter-épineuse antérieure
- D) Le bord supérieur du pubis est en dessous de l'épine ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos du tronc postérieur de l'artère hypogastrique, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Il est composé de trois collatérales de l'artère iliaque interne
- B) L'artère sacrée latérale fait partie de ce tronc
- C) On y retrouve l'artère pudendale interne, qui est l'apport sanguin majoritaire du périnée
- D) L'artère pudendale a un trajet particulier : sortant du petit bassin par le canal sous-pyramidal, elle passe en arrière et en-dehors du ligament sacro-épineux, avant de retourner dans le petit bassin
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 5 : A propos des nerfs du petit bassin chez la femme, on peut dire que :

- A) Les nerfs érecteurs proviennent des myélomères S1, S2 et S3
- B) Le nerf pudendal provient de l'union du tronc lombo-sacré et du rameau antérieur du premier nerf spinal sacré
- C) Le nerf pudendal croise en arrière le ligament sacro-tubéral
- D) Le nerf sciatique (L4-L5-S1-S2-S3) est le plus gros nerf de l'organisme. Il se divise en deux nerfs : fibulaire (L4-L5) et tibial (S1-S2-S3)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos des parois musculaires du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les muscles ilio-psoas et piriforme (encore appelé pyramidal) peuvent être qualifiés de pelvi-trochantériens
- B) Le muscle obturateur interne s'insère sur le pourtour du foramen obturé, se dirige vers l'arrière et passe dans la grande échancrure sciatique
- C) Les muscles pyramidal, obturateur interne et ilio-psoas sont des muscles du membre inférieur
- D) Le muscle pyramidal sépare la petite échancrure sciatique en deux canaux : sus et sous pyramidal. Dans le canal sus-pyramidal passe l'artère glutéale supérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos des parois du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'uretère droit surcroise les vaisseaux pelviens au-dessus et en dehors de la division de l'artère iliaque commune
- B) Le plexus lombo-sacré correspond à l'anastomose des rameaux antérieurs des myélomères L4 et L5
- C) Le vagin se projette sur la surface quadrilatère
- D) Le clitoris se projette sur la symphyse pubienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos du périnée féminin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le muscle uréthro-vaginal est innervé par le nerf pudendal
- B) Le clitoris est un organe érectile, corps spongieux ; il n'est pas soumis à une influence hormonale
- C) Le périnée cutané, dans sa partie antérieure, est innervé par les nerfs ilio-hypogastrique (rameau antérieur de L2) et génito-fémoral (L1)
- D) Le fascia périnéal supérieur est épais et résistant ; il tapisse la partie supérieure du muscle transverse profond
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos des moyens de stabilité, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le ligament large possède une ligne de réflexion utérine (ou médiale) qui est trifoliée
- B) Au niveau de la ligne de réflexion pariétale, la foliole postérieure est sous-tendue par le ligament infundibulo-pelvien
- C) On ne retrouve que deux folioles au niveau de la ligne de réflexion pariétale du ligament large, car on perd le relai du ligament rond au niveau de la paroi
- D) La LSRGP est une formation fibro-conjonctive palpable par la résistance qu'elle offre au doigt, mais dont l'anatomie n'est pas constante car elle est très variable
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos de la filière urinaire, donnez la (les) proposition(s) exactes

- A) L'urètre pelvien croise les vaisseaux iliaques en dehors de la bifurcation à droite
- B) Le drainage lymphatique de la vessie se fait vers les vaisseaux iliaques internes
- C) Le parasymphatique entraîne le relâchement du sphincter lisse de la vessie
- D) Le sphincter lisse de la vessie est formé d'une accumulation de fibres longitudinales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos des organes du petit bassin :

- A) Les femmes fontaines font intervenir l'orthosymphatique et le parasymphatique
- B) L'utérus présente une antéversion (inclinaison vers l'avant) et une antéflexion (plié sur lui même)
- C) Le col de l'utérus chez la femme nullipare est perforé de façon irrégulière
- D) L'exocol présente des replis palmés, on le nomme l'arbre de vie du col de l'utérus
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos des organes du petit bassin :

- A) L'utérus est péritonisé au niveau de sa partie supérieure
- B) L'utérus possède une double innervation : par le plexus nerveux intra-utérin et une innervation viscérale végétative
- C) Le vagin possède une innervation végétative dans sa partie inférieure
- D) Lors d'une péridurale, on anesthésie les racines lombaires basses et sacrées
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes

- A) La tunique moyenne du rectum est composée d'une couche périphérique circulaire et d'une couche interne longitudinale
- B) Au niveau de la sous-muqueuse du rectum on retrouve des valvules semi-lunaires
- C) Les valvules de Houston délimitent des cryptes anales à concavité inférieure
- D) Le sphincter lisse du rectum est à contraction parasymphatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 :

Le diamètre du détroit inférieur peut être agrandi vers l'arrière contrairement au diamètre du détroit supérieur

PARCE QUE

Lors de l'accouchement le coccyx peut se rabattre en arrière

QCM 15 :

Le muscle *levator ani* est responsable de la continence anale

PARCE QUE

Sa contraction va entraîner une augmentation de la plicature du cap anal par effet de « fronde » ; cet effet étant dû à la disposition du *levator ani* autour du rectum