

DM n°5 : SUJET TYPE CONCOURS

Tutorat 2019-2020 : 15 QCMS – Durée : 20 minutes



QCM 1 :

On retrouve du tissu spongieux et une forte épaisseur des os seulement au niveau du détroit supérieur du petit bassin

PARCE QUE

Les lignes de forces passent uniquement par le détroit supérieur

QCM 2 :

Lors de la présentation du bébé, le coccyx peut se rabattre en arrière

PARCE QUE

Les articulations ligamentaires sont mobiles et que le coccyx reçoit une inondation hormonale

QCM 3 :

Au niveau du bord antérieur de l'os coxal, on trouve la tubérosité ischiatique

PARCE QUE

Au niveau du bord postérieur de l'os coxal, on trouve la vallée du psoas

QCM 4 :

L'éminence ilio-pectinée est au-dessus de l'épine du pubis

PARCE QUE

L'échancrure inter-épineuse antérieure est en dessous de l'épine iliaque antéro-supérieure

QCM 5 :

Le muscle obturateur interne peut être qualifié de pelvi-trochantérien

PARCE QUE

Le tronc du nerf sciatique passe dans le canal sus-pyramidal au niveau de la grande échancrure sciatique

QCM 6 :

L'artère obturatrice passe dans le canal sous-pyramidal

PARCE QUE

Cette artère est une terminale de l'artère hypogastrique, faisant partie de son tronc de division antérieur

QCM 7 :

Le nerf tibial provient des myélotômes L4 et L5

PARCE QUE

Le drainage lymphatique de l'ovaire gauche peut aller directement vers la veine cave inférieure en suivant la veine gonadique gauche

QCM 8 :

Le col de l'utérus se projette sur l'épine iliaque antéro-inférieure

PARCE QUE

Les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels se drainent directement vers la chaîne iliaque interne

QCM 9 :

On peut voir au niveau du vestibule du pudendum le méat externe de l'uretère

PARCE QUE

Le sphincter strié externe de l'anus ne s'insère pas sur le NFCP

QCM 10 :

Le muscle coccygien s'insère sur l'ischion latéralement, et sur le coccyx et le sacrum médialement

PARCE QUE

Les muscles du diaphragme pelvien sont uniquement innervés par le nerf pudendal

QCM 11 :

L'aileron latéral de la LSRGP, ou ligament cardinal de l'utérus, est aussi appelé ligament sacro-utérin

PARCE QUE

L'aileron postérieur du ligament large enveloppe l'ovaire

QCM 12 :

Les cancers de l'ovaire se traduisent souvent par un envahissement du péritoine

PARCE QUE

L'ovaire est une glande intra-péritonéale non péritonisée

QCM 13 :

L'éjaculation se fait au niveau du fornix

PARCE QUE

Le fornix est l'équivalent du cul-de-sac postérieur du vagin

QCM 14 :

La miction est sous contrôle parasympathique et orthosympathique

PARCE QUE

Le parasympathique permet la contraction du sphincter lisse et le relâchement du détrusor alors que l'orthosympathique permet le relâchement du sphincter lisse

QCM 15 :

L'ampoule rectale se draine vers les nœuds lymphatiques sacrés, iliaques externes et iliaques internes

PARCE QUE

Le canal anal se draine vers les nœuds lymphatiques inguinaux