

Tutorat n°10 : Épreuve UE9

Tutorat 2019-2020 : 15 QCMS – Durée : 20min – Code épreuve : 0009



QCM 1 : (Inspiré des annales) A propos des parois du petit bassin, donnez la (ou les) vraie(s) :

- A) Le promontoire correspond au bord antérieur du pubis
- B) La ligne arquée est au-dessus de la surface quadrilatère de l'os coxal
- C) L'éminence ilio-pectinée est au niveau du bord antérieur de l'os coxal
- D) La grande échancrure ischiatique est en-dessous de l'épine sciatique ou ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : (Inspiré des annales) Quel est ou quels sont le(s) élément(s) qui participent à la formation du détroit supérieur du bassin :

- A) Le pubis
- B) La surface quadrilatère
- C) La tubérosité ischiatique
- D) La ligne arquée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : (Inspiré des annales) A propos des parois du petit bassin, donnez la (ou les) vraie(s) :

- A) La gouttière du pédicule obturateur est sur le bord supérieur du foramen obturé
- B) Le foramen obturé est en dessous de la surface quadrilatère
- C) La symphyse pubienne possède une capsule articulaire
- D) Les surfaces articulaires de la symphyse pubienne sont encroûtées de cartilage
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : (Inspiré des annales) Sur le bord antérieur de l'os coxal on trouve :

- A) L'échancrure iliaque antérieure entre la vallée du psoas et l'éminence ilio-pectinée
- B) L'épine du pubis
- C) L'épine iliaque antéro-supérieure dans le même plan que l'épine du pubis
- D) La tubérosité ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos des nerfs du petit bassin, on peut dire que :

- A) Les nerfs érecteurs (d'Eckart) véhiculent l'influx parasympathique de la miction, de l'érection et de la défécation
- B) Le nerf obturateur provient du rameau antérieur des nerfs spinaux S2, S3 et S4
- C) Le nerf dorsal du clitoris provient du rameau antérieur du deuxième nerf lombal (lombaire)
- D) Le nerf rectal inférieur (nerf anal) provient du rameau antérieur du quatrième nerf sacral (sacré)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos des vaisseaux du petit bassin et de leur origine, on peut dire que :

- A) L'artère iliaque interne donne une douzaine de rameaux collatéraux
- B) La division de l'artère iliaque primitive se fait en regard de l'articulation sacro-iliaque
- C) L'artère iliaque primitive provient de la division de l'aorte en regard du corps de L5
- D) L'artère obturatrice est un rameau de l'artère iliaque interne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos des parois du petit bassin, on peut dire que :

- A) La vessie en état de réplétion ne se projette pas sur le foramen obturé, à l'inverse d'une vessie vide
- B) Les cadrans internes des nœuds lymphatiques inguinaux superficiels drainent la vulve et la marge anale
- C) Dans le petit bassin, la division artérielle se fait en arrière et en dessous du plan veineux
- D) Dans le canal sous-pyramidal passent entre autres l'artère glutéale inférieure, l'artère pudendale et le nerf sciatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Parmi les muscles du périnée, on peut citer :

- A) Le muscle grand glutéal
- B) Le muscle obturateur médial
- C) Le muscle constricteur de la vulve
- D) Le muscle transverse de l'abdomen
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos des organes génitaux externes de la femme, on peut dire que :

- A) L'hymen semi-annulaire est une forme que peut prendre l'hymen chez la femme vierge
- B) Les petites lèvres, ou nymphes, ont pour rôle de diriger le jet d'urine vers le bas
- C) Une contraction réflexe du muscle constricteur de la vulve est à l'origine du phénomène de penis captivus
- D) Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent dans la lumière vaginale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos du muscle élévateur de l'anus (levator ani) on peut dire que :

- A) Il a la forme d'un cône à sommet supérieur centré sur l'anus
- B) Il présente en avant une fente qui est la fente ou hiatus uro-vaginal
- C) Il est innervé par le nerf obturateur
- D) Il présente un faisceau génito-coccygien et un faisceau pubo-coccygien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos du ligament large, et de la lame sacro-recto-génito-pubienne, on peut dire que :

- A) L'aileron antérieur du ligament large enveloppe l'oviducte
- B) La LSRGP est au-dessus du fascia supérieur du muscle élévateur de l'anus
- C) Le mésovarium fait partie de l'aileron supérieur
- D) L'aileron antérieur de la LSRGP forme les ligaments vésico-utérin et pubo-utérin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : (Inspiré des annales) A propos de la vessie on peut dire que :

- A) Son innervation parasympathique provient des myélomères L2, L3, L4
- B) Le détrusor forme la tunique interne de la vessie
- C) Le trigone vésical formé par l'arrivée des urètres se projette en regard du trigone vaginal
- D) Sa face externe est tapissée par l'urothélium
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : (Inspiré des annales) A propos des organes du petit bassin :

- A) L'angle d'antéversion utéro-vaginal est de 60°
- B) La couche musculaire la plus interne est circulaire
- C) La paroi postérieure et supérieure du vagin est comparable au palais d'un chien
- D) Le fornix est le lac spermatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : (Inspiré des annales) A propos du rectum, on peut dire que :

- A) Le canal est dirigé en bas et en avant
- B) La couche musculaire lisse circulaire s'épaissit dans la partie basse du canal anal pour former le sphincter interne
- C) Le pédicule lymphatique rectal supérieur présente un nœud lymphatique principal au niveau de la division de l'artère mésentérique supérieure
- D) Les colonnes anales se situent en-dessous de la ligne ano-cutanée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : (Inspiré des annales) A propos du rectum, on peut dire que :

- A) La vascularisation lymphatique de l'ampoule rectale se fait préférentiellement en direction des lymphonœuds de la racine du membre inférieur
- B) Les colonnes anales et les valvules rectales sont dans le canal anal
- C) Le canal anal est péritonisé
- D) Le cap du rectum est entre l'ampoule du rectum et le canal anal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses