

DM n°9 : SUJET TYPE CONCOURS

Tutorat 2019-2020 : 15 QCM – 20 min



QCM 1 : A propos des parois du petit bassin, donnez la (ou les) vraie(s) :

- A) L'éminence ilio-pubienne est en dessous du bord supérieur du pubis
- B) L'épine du pubis est au niveau du bord antérieur de l'os coxal
- C) Le pubis fait partie du détroit supérieur
- D) L'articulation sacro-iliaque est une articulation cartilagineuse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos des parois du petit bassin, donnez la (ou les) vraie(s) :

- A) La pôle inférieure de l'os coxal regarde en arrière, en bas en dehors
- B) La ligne arquée est au niveau de la face latérale de l'os coxal
- C) La ligne arquée est oblique et fait un angle de 30° avec l'horizontale
- D) La symphyse pubienne est une articulation synoviale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos des parois du petit bassin, donnez la (ou les) vraie(s) :

- A) L'éventail de sustentation travaille en pression négative
- B) La symphyse pubienne est une articulation essentielle à la stabilité du bassin
- C) L'articulation sacro-iliaque est une articulation essentielle à la stabilité du bassin
- D) L'épine iliaque postéro-supérieure est au-dessus de l'éminence ilio-pectinée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos des parois du petit bassin, donnez la (ou les) vraie(s) :

- A) La symphyse pubienne possède une capsule articulaire
- B) La symphyse pubienne est entourée de ligaments de renforcement : un ligament antérieur et un ligament postérieur
- C) La distance entre les deux lèvres du pubis est de l'ordre d'1 cm
- D) La symphyse pubienne est une articulation figée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : Concernant les parois vasculaires du petit bassin, on peut dire que :

- A) L'aorte bifurque en regard du bord antérieur de L4
- B) Les veines iliaques communes se réunissent en regard de L4
- C) Les nœuds lymphatiques iliaques externes se trouvent de part et d'autre des vaisseaux iliaques internes
- D) L'artère iliaque externe deviendra artère fémorale après avoir passé le triangle de Scarpa (trigone fémoral)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos des nerfs du petit bassin, on peut dire que :

- A) Le nerf sciatique correspond à la réunion du tronc lombo-sacré et du plexus sacré
- B) Le nerf pudendal assure uniquement l'innervation sensitive du périnée
- C) Le nerf obturateur passe dans le canal sous-pyramidal
- D) Le nerf tibial n'est pas issu du nerf sciatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos des parois du petit bassin, on peut dire que :

- A) Les nœuds iliaques primitifs se drainent dans le canal thoracique
- B) Les nerfs érecteurs d'Eckard véhiculent l'influx sympathique de la miction, de la défécation et de l'érection
- C) L'artère ombilicale est l'apport vasculaire majoritaire du vagin
- D) Les nœuds lymphatiques iliaques externes reçoivent la lymphe des nœuds inguinaux superficiels
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Quels éléments peut-on retrouver au niveau du pudendum d'une femme installée en position gynécologique ?

- A) Les grandes lèvres, charnues et poilues
- B) Les piliers du clitoris, avec leur insertion ischio-pubienne
- C) L'introït vaginal
- D) Le capuchon et le gland du clitoris, expansions antérieures des nymphes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : Quels sont les muscles ne présentant pas d'insertion sur le NFCP ?

- A) Sphincter strié de l'anus
- B) Faisceau pubo-génital du muscle pubo-coccygien
- C) Sphincter strié externe de l'urètre
- D) Faisceau pubo-rectal du muscle pubo-coccygien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : Concernant le ligament large de l'utérus et la LSRGP, on peut dire que :

- A) Le paramètre constitue la base du ligament large
- B) L'aileron antérieur du ligament large en projection pariétale (latérale) n'est pas sous-tendu par le ligament rond
- C) Le mésosalpinx est l'aileron moyen ou supérieur du ligament large
- D) L'aileron latéral de la LSRGP, ou ligament cardinal de l'utérus, est au niveau du paramètre du ligament large
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos des organes du petit bassin :

- A) La partie postérieure du fornix est équivalente au lac spermatique
- B) Lors de l'éjaculation, le col de l'utérus prend appui sur la face antérieure du vagin
- C) La tunique moyenne musculaire lisse du vagin a une contraction involontaire
- D) Le vagin a l'aspect du palais d'un chien selon Ambroise Paré
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos des organes du petit bassin :

- A) Les femmes fontaines subissent l'équivalent d'une éjaculation féminine
- B) L'utérus est complètement péritonisé
- C) L'utérus est situé au dessus de la cavité péritonéale
- D) L'utérus présente une antéversion (plié sur lui même) et une antéflexion (inclinaison vers l'avant)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes

- A) Le sphincter strié de l'anus est composé de 3 couches musculaires : profonde, superficielle et sous-cutanée
- B) Le sphincter strié de l'anus est traversé par des fibres transversales lisses et des fibres du levator ani allant jusqu'à la peau
- C) Le corigator ani est à l'origine des plis radiés de l'anus
- D) Le sphincter strié de l'anus a une contraction involontaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes

- A) La veine splénique et la veine mésentérique inférieure donne le tronc spléno-mésaraïque
- B) La veine porte remonte vers le hile du foie pour s'y drainer
- C) En cas d'hyperpression portale, on peut trouver des varices et hémorroïdes
- D) Le drainage du rectum est extrêmement diffus d'où sa difficulté à traiter des cancers du rectum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : À la suite d'un viol, une jeune fille vierge se rend chez un médecin légiste pour faire constater l'agression sexuelle

A l'examen gynécologique au spéculum, le médecin s'attend à trouver un hymen de forme labiée, cribiforme, annulaire ou semi-lunaire

PARCE QUE

Ce sont des formes d'hymen que l'on retrouve chez la femme déflorée nullipare