

# DM n°11 : Périnée

Tutorat 2019-2020 : 16 QCMS - Durée : 21min



**QCM 1 : A propos du périnée, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :**

- A) Il correspond à l'ensemble des parties molles fermant le petit bassin par le bas
- B) Il est composé de deux triangles opposés par leurs bases
- C) Le sommet supérieur du triangle supérieur est le coccyx
- D) Le triangle antérieur est centré sur l'introït vaginal
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

**QCM 2 : A propos des éléments du périnée cutané, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les poils y sont de section polygonale ; les morpions peuvent donc s'y accrocher
- B) Le mont du pubis est une formation charnue et poilue en regard de la symphyse pubienne
- C) Les glandes de Bartholin se trouvent à la partie antérieure du vestibule
- D) Les glandes vestibulaires mineures sont les glandes de Bartholin
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

**QCM 3 : A propos des éléments du périnée cutané, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les glandes vestibulaires majeures permettent la lubrification de la vulve au cours des coïts
- B) L'infection des glandes de Bartholin entraînera un assèchement de la vulve
- C) Le méat urinaire se trouvent à la partie antérieure du vestibule du vagin, en avant du frein du clitoris et de l'introït vaginal
- D) Les glandes responsables de la lubrification de la vulve sont sous contrôle parasymphatique
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

**QCM 4 : A propos des corps érectiles de la femme, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :**

- A) La sensibilité des corps érectiles est assurée par le nerf pudendal (L2-L3-L4)
- B) Le mécanisme de l'érection féminine est entre autres permis par les muscles en cornet qui, en se contractant, vont empêcher le retour veineux
- C) On parle pour la femme d'érection imparfaite : il y a intumescence sans rigidification des corps érectiles
- D) Les corps érectiles de la femme sont le clitoris et les bulbes vestibulaires
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

**QCM 5 : A propos des éléments du périnée cutané, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Une jeune femme déflorée peut présenter un hymen semi-lunaire, cribriforme, annulaire ou labié
- B) Une femme déflorée nullipare présente des caroncules myrtiformes
- C) Une multipare peut présenter un hymen labié, cribriforme, annulaire (liste non exhaustive)
- D) L'hymen disparaît progressivement au cours des accouchements successifs
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

**QCM 6 :**

L'introït vaginal est horizontal

**PARCE QUE**

Les nymphes sont de couleur plus claire que les grandes lèvres

**QCM 7 : Parmi ces muscles, le ou lesquels fait (font) partie du périnée musculaire ?**

- A) Transverse profond
- B) Coccygien
- C) Constricteur de la vulve
- D) Obturateur interne
- E) Pubo-coccygien

**QCM 8 : A propos du diaphragme périnéal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les muscles ischio-caverneux (au nombre de deux), se trouvent en dedans des racines clitoridiennes
- B) Le muscle constricteur de la vulve est en dehors des muscles bulbo-spongieux
- C) Le muscle transverse profond est tendu entre l'ischion et le NFPC
- D) Le nerf rectal inférieur (S4), rameau du nerf pudendal, permet la motricité du sphincter strié de l'urètre
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

**QCM 9 :**

Le fascia périnéal superficiel n'a aucun autre rôle que de séparer la graisse superficielle de la graisse profonde, et n'enveloppe pas les muscles du diaphragme périnéal

**PARCE QUE**

Le fascia périnéal inférieur est épais ; tandis que le supérieur est grêle


**QCM 10 : A propos de la vascularisation du périnée cutané, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) La partie antérieure de la vulve est vascularisée par les vaisseaux pudendaux internes, supérieur et inférieur
- B) Les vaisseaux pudendaux externes sont des rameaux de l'artère hypogastrique
- C) Les vaisseaux honteux internes passent dans le canal pudental d'Alcock ; celui-ci est matérialisé par un dédoublement du fascia du muscle piriforme
- D) La partie postérieure du périnée cutané est vascularisée par l'artère rectale inférieure
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

Pour les QCM 11 et 12 : légendez le schéma suivant.

**QCM 11 : Le numéro 9 désigne :**

- A) Un muscle possédant un fascia superficiel et un fascia profond
- B) Muscle grand fessier
- C) Muscle transverse profond
- D) Muscle bulbo-spongieux
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses



**QCM 12 : Le numéro 2 désigne :**

- A) Ligament sacro-épineux
- B) Ligament sacro-tubéral
- C) Ligament ano-coccygien
- D) Ligament croisé antérieur
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

**QCM 13 :**

La nymphoplastie permet de changer la forme des grandes lèvres hypertrophiées qui entraînent des dyspareunies

**PARCE QUE**

Le fascia profond du muscle transverse superficiel se confond avec le fascia superficiel du muscle transverse profond

**QCM 14 : A propos du périnée féminin, indiquez la (les) propositions exactes :**

- A) Le phénomène de femme fontaine est comparable à une « éjaculation féminine »
- B) Le capuchon du clitoris, ainsi que son gland, sont les expansions antérieures des petites lèvres
- C) Les corps érectiles de la femme sont logés dans des muscles creux, ayant la forme de cornets
- D) Le bulbe vestibulaire possède une partie droite et une partie gauche
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

**QCM 15 : A propos du périnée féminin, indiquez la (les) propositions exactes :**

- A) L'orifice des glandes vestibulaires majeures de Bartholin se trouve à la partie postérieure du vestibule du vagin ; ces glandes permettent la lubrification de la vulve lors des rapports sexuels (contrôle parasympathique de la sécrétion)
- B) Le losange périnéal correspond à la réunion de deux triangles opposés par leurs bases ; et dont leurs sommets latéraux, communs, correspondent aux ischions droit et gauche
- C) Le noyau fibreux central du périnée est la clef de voute inversée de la statique périnéale
- D) Le *penis captivus* est une contraction réflexe du muscle constrictor de la vulve qui se produit au cours d'un rapport sexuel, « emprisonnant » alors le pénis
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses

**QCM 16 : A propos de l'innervation du périnée, on peut dire que :**

- A) L'innervation de la partie antérieure du pudendum est assurée par des nerfs issus des myélotomes L1 et L2
- B) La partie postérieure du pudendum est innervée par des rameaux nerveux issus de la division du nerf pudental (S2-S3-S4)
- C) La marge de l'anus est innervée par le nerf rectal inférieur
- D) Il existe un saut d'innervation au niveau du pudendum ; en effet, aucun nerf entre L2 et S2 n'innerve cette région anatomique
- E) Les propositions A, B, C, D et E sont fausses