



### QCM 1 :

- A) Le rectum est l'organe de la défécation
- B) Le rectum fait suite au colon transverse
- C) Le rectum anatomique débute en S4
- D) L'ampoule rectale est peu mobile
- E) Toutes les réponses sont fausses

### QCM 2 :

- A) Le cap anal se projette au niveau du diaphragme pelvien
- B) Le cap anal présente un angle ouvert en arrière de 110°
- C) Le canal anal est mobile
- D) Le diamètre du canal anal est supérieur au diamètre de l'ampoule rectale
- E) Toutes les réponses sont fausses

### QCM 3 :

- A) Le rectum a un aspect longitudinalement strié
- B) Les hémorroïdes sont des dilatations veineuses dues à des anastomoses porto-caves
- C) Les paquets hémorroïdaires se trouvent à 11h, 6h et 8h
- D) La muqueuse du canal anal est un épithélium glandulaire
- E) Toutes les réponses sont fausses

### QCM 4 :

- A) La muqueuse de l'ampoule rectale est un épithélium pavimenteux
- B) La sous-muqueuse présente des plexus veineux
- C) Le sphincter strié est innervé par le nerf anal issu de S4
- D) Les fibres striées participant à la formation du corrigator ani sont les fibres antérieures élévatrices du Levator Ani
- E) Toutes les réponses sont fausses

### QCM 5 :

- A) Le muscle crisper de l'anus est un élément de stabilité, il peut éviter les rectocèles
- B) Les colonnes du rectum sont des plis muqueux longitudinaux
- C) Les valvules anales sont des valvules semi-lunaires
- D) A la partie basse des valvules rectales, on trouve des sinus anaux
- E) Toutes les réponses sont fausses

### QCM 6 :

- A) L'artère rectale inférieure est issue de l'artère pudendale interne
- B) Au niveau du rectum, on trouve deux drainages veineux : vers le système cave et vers le système porte
- C) Le ganglion de Mondor se situe à la bifurcation de l'artère rectale supérieure
- D) Le péritoine ne recouvre pas les éléments situés en dessous du Levator Ani
- E) Toutes les réponses sont fausses

### QCM 7 :

- A) La fosse latéro-rectale se situe en dessous du Levator Ani
- B) La fascia celluleux retro-rectal se situe entre le rectum et l'utérus
- C) La fosse ischio-rectale se situe au-dessus du LA
- D) La fosse latéro-rectal se situe à la partie antérieure de la lame SRGP
- E) Toutes les réponses sont fausses

### QCM 8 :

- A) L'ampoule rectale est en rapport avec les anses intestinales
- B) La partie latérale du rectum est en rapport avec le levator ani
- C) Au niveau de la fosse ischio-rectale on trouve un corps adipeux et le canal pudendal
- D) Lors d'une exérèse du rectum on enlève aussi le corps adipeux cellulo-graisseux
- E) Toutes les réponses sont fausses

**QCM 9 :**

- A) La fosse latéro-rectale est une fosse péritonéale peu prononcée
- B) L'exérèse du rectum peut entraîner des troubles d'érections et urinaires
- C) Le rectum est stabilisé par le corrigator ani
- D) Le rectum est stabilisé par le NFCP et le ligament ano-coccygien
- E) Toutes les réponses sont fausses

**QCM 10 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes**

- A) Au niveau de l'anus, la partie interne est formée par la marge anale avec au-delà de celle-ci la zone cutanée lisse
- B) Le canal anal présente 3 bosselures
- C) En arrière du rectum on a le fascia recto-vaginal et en avant du rectum on a le fascia recto-sacré
- D) La tunique externe du rectum est composée du péritoine et du fascia recti pour les endroits non péritonisés
- E) Toutes les réponses sont fausses

**QCM 11 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes**

- A) Le sphincter strié de l'anus est composé de 3 couches musculaires (de la plus haute à la plus basse) : profonde, sous-cutanée et superficielle
- B) Le levator ani est à l'origine des plis radiés de l'anus
- C) La défécation se fait par contraction du sphincter lisse
- D) Seules les fibres lisses qui traversent le sphincter strié de l'anus sont responsables du muscle corrigator ani
- E) Toutes les réponses sont fausses

**QCM 12 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes**

- A) Les muscles abdominaux participent au mécanisme de la défécation
- B) La vascularisation du rectum se fait par l'artère mésentérique supérieure et l'artère hypogastrique
- C) L'artère hypogastrique donne l'artère rectale moyenne
- D) L'artère rectale inférieure est un apport vasculaire inconstant du rectum
- E) Toutes les réponses sont fausses

**QCM 13 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes**

- A) L'artère mésentérique inférieure donne uniquement l'artère rectale supérieure droite
- B) L'artère hypogastrique donne l'artère rectale supérieure
- C) La veine splénique et la veine mésentérique supérieure donnent le tronc spléno-mésaraïque
- D) Le tronc spléno-mésaraïque et la veine mésentérique inférieure donnent la veine porte
- E) Toutes les réponses sont fausses

**QCM 14 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes**

- A) Le tronc spléno-mésaraïque et la veine mésentérique supérieure donne la veine porte
- B) Le drainage iliaque interne va se diriger vers le foie
- C) Le ganglion de Mondor se trouve au niveau de la bifurcation de l'artère mésentérique supérieure
- D) Le pédicule lymphatique rectal supérieur se draine vers le ganglion de Mondor
- E) Toutes les réponses sont fausses

**QCM 15 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes**

- A) La marge de l'anus et le canal anal se drainent vers le pédicule lymphatique moyen
- B) Les nœuds lymphatiques inguinaux se situent autour de la crosse de la petite veine saphène
- C) Le pédicule lymphatique rectal sacré se draine vers les nœuds lymphatiques du promontoire
- D) On a 4 pédicules lymphatiques on niveau de rectum
- E) Toutes les réponses sont fausses

**QCM 16 : A propos du rectum, donnez la (les) proposition(s) exactes**

- A) L'artère mésentérique inférieure et l'artère hypogastrique sont les deux apports vasculaires du rectum
- B) La couche la plus basse du sphincter strié de l'anus est la couche superficielle
- C) L'ampoule rectale est en partie péritonisée
- D) Le canal anal est péritonisé
- E) Toutes les réponses sont fausses