

QCM 1 : L'os pariétal s'articule avec : (Annales 2019)

- A) L'os frontal
- B) L'os temporal
- C) L'os occipital
- D) L'os sphénoïde
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : Par le méat auditif interne de la base du crâne passe(nt) :

- A) Le nerf maxillaire
- B) Le nerf facial
- C) Le nerf vestibulo-cochléaire
- D) L'artère méningée moyenne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : Par le foramen jugulaire passe(nt) :

- A) Le nerf glossopharyngien
- B) Le nerf vague
- C) L'artère carotide externe
- D) Le nerf hypoglosse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos du plexus brachial on peut dire que : (Inspiré des annales)

- A) Ses racines proviennent des rameaux antérieurs des nerfs spinaux C3, C4, C5, C6 et C7
- B) Le nerf médian est un rameau terminal
- C) Le nerf phrénique est un rameau collatéral
- D) Le faisceau postérieur est issu des troncs supérieur, moyen et inférieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos des muscles de l'articulation temporo-mandibulaire, donnez la ou les propositions exactes :

- A) Tous les muscles sont innervés par des rameaux du V3
- B) Les deux ventres du digastrique participent tous les deux à l'abaissement de la mandibule
- C) Le muscle ptérygoïdien latéral, muscle occlusif, suit un trajet parallèle au muscle masséter
- D) Le ligament collatéral latéral (ligament de l'antéimpulsion) est tendu entre le tubercule zygomatique antérieur et le col de la mandibule
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : L'articulation temporo-mandibulaire : (Annales 2016)

- A) Est une cylindroïde
- B) Est une ellipsoïde ou condylienne
- C) Est une articulation entre la glène du temporal et la tête de la mandibule
- D) Présente un mouvement d'antéimpulsion de la tête de la mandibule lors de l'ouverture de la bouche
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos des glandes salivaires, on peut dire que : (Inspiré des annales)

- A) La glande sous-linguale est traversée par le plexus de division du nerf facial
- B) La glande parotide est traversée par l'artère carotide interne
- C) La glande sous mandibulaire a un canal excréteur qui s'abouche dans le frein de la langue
- D) La glande sous linguale a un canal excréteur qui s'abouche dans le canal excréteur de la glande sous mandibulaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos de l'artère thyroïdienne inférieure, donnez la ou les propositions exactes :

- A) Elle est issue du tronc thyro-cervical (4^{ème} rameau collatéral de l'artère sub-clavière)
- B) Elle effectue une double crosse au niveau de C4
- C) Elle chemine en avant du muscle scalène antérieur
- D) Elle perfore constamment le ganglion cervical moyen
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : Parmi les branches collatérales de l'artère sub-clavière, on peut citer :

- A) L'artère cérébrale
- B) L'artère scapulaire postérieure
- C) L'artère mammaire interne
- D) L'artère pharyngienne ascendante
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos des fosses nasales, donnez la ou les propositions exactes : (Inspiré des annales)

- A) Le cornet supérieur est un élément éthmoïdien
- B) Le cornet inférieur est un élément sphénoïdien
- C) La tâche vasculaire est alimentée par les artères éthmoïdales antérieure et postérieure ainsi que par l'artère de la cloison nasale (provenant de l'artère sphéno-palatine)
- D) Le vomer et l'éthmoïde participent à la formation de la cloison médiane
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos du larynx, donnez la ou les propositions exactes : (Inspiré des annales)

- A) Le cartilage cricoïde a la forme d'une pyramide à base triangulaire
- B) Le cartilage épiglottique s'articule avec le chaton du cartilage cricoïde
- C) La glande thyroïde se moule sur le cartilage thyroïde du larynx
- D) Le processus musculaire du cartilage thyroïde est sa pointe inférieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Du QCM 12 au QCM 15

Relation de cause à effet

Réponse A : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts et liés par une relation de cause à effet

Réponse B : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet

Réponse C : si le fait est exact mais la raison proposée est fausse

Réponse D : si le fait est faux mais la raison proposée est exacte

Réponse E : si le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 12 : (Inspiré des annales)

Une infection ou une inflammation du pharynx peut entraîner une hyperpression de l'oreille interne

CAR

L'orifice pharyngé du tube auditif (ou trompe d'Eustache) s'ouvre dans le cavum et peut être obstrué dans les atteintes du cavum

QCM 13 :

Une aiguille introduite horizontalement au niveau de la 6^e vertèbre cervicale peut théoriquement traverser 3 artères

CAR

Au niveau de C6, l'artère carotide commune, l'artère vertébrale et l'artère thyroïdienne inférieure se trouvent sur le même axe.

QCM 14 :

Un cancer de l'hémi-langue gauche ne se draine pas dans la chaîne jugulaire interne droite

CAR

Le drainage de la langue est uniquement controlatéral

QCM 15 :

Lors d'une chirurgie de l'artère thyroïde inférieure droite, on risque de couper le nerf récurrent gauche

CAR

Le nerf récurrent gauche suit un trajet vertical