

De la question 1 à la question 9

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?

QCM 1 : A propos du sacrum on peut dire que :

- A) Sa face antérieure présente une double concavité antérieure dans le plan horizontal et dans le plan sagittal
- B) Par le deuxième foramen pelvien passe le rameau antérieur du deuxième nerf spinal sacré
- C) L'articulation sacro-iliaque est une articulation synoviale
- D) Sur l'aile sacrale existe une gouttière qui est la gouttière du tronc nerveux lombo-sacral
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : Sur le bord postérieur de l'os coxal on décrit :

- A) L'épine iliaque antéro-inférieure au-dessus de la grande incisure (échancrure) sciatique (ou ischiatique)
- B) L'épine sciatique (ou ischiatique) au-dessous de la grande incisure (échancrure) sciatique
- C) L'épine sciatique au-dessus de la petite incisure (échancrure) sciatique
- D) La tubérosité de l'ischion au-dessous de la petite incisure (échancrure) sciatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : Sur le pourtour du foramen obturé on décrit :

- A) La pointe de la corne postérieure de l'acétabulum
- B) La pointe de la corne antérieure de l'acétabulum
- C) Le bord inférieur de la fosse acétabulaire
- D) La gouttière du nerf obturateur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos du détroit supérieur on peut dire que :

- A) Il est formé par la ligne arquée, le bord antérieur de l'aile du sacrum et le promontoire
- B) Il est dirigé de bas en haut et d'avant en arrière
- C) Il est dans un plan faisant environ 60° avec le plan horizontal
- D) Il forme la limite supérieure du petit bassin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos des nerfs du petit bassin on peut dire que :

- A) Le tronc lombo-sacral est formé par la réunion du rameau antérieur du nerf spinal lombal L4 et du rameau antérieur du nerf spinal lombal L5
- B) Le nerf sciatique provient des rameaux antérieurs des nerfs spinaux lombaux L4, L5 et des rameaux antérieurs des nerfs spinaux sacrés S2, S2 et S3
- C) Le tronc lombo-sacral ne participe pas à la formation du nerf sciatique
- D) Le nerf pudendal (nerf honteux interne) provient de la réunion des rameaux antérieurs des nerfs spinaux sacrés S2, S3 et S4
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos de l'ovaire on peut dire que :

- A) C'est une glande intra-péritonéale péritonisée
- B) Son cortex a une fonction exocrine
- C) Sa médulla a une fonction endocrine
- D) Le mésovarium est une formation péritonéale qui forme l'aileron postérieur du ligament large et qui s'insère au pourtour du hile de l'ovaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos de la lame sacro-recto-génito-pubienne on peut dire que :

- A) C'est une formation fibro-conjonctive intra-péritonéale sous-tendue par le système nerveux végétatif du petit bassin
- B) Son aileron latéral ou ligament cardinal de l'utérus est au niveau de la base du paramètre
- C) Son aileron dorsal forme le ligament utéro-sacral
- D) Son aileron ventral est de part et d'autre de la vessie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos de la filière génitale on peut dire que :

- A) Le vagin a la forme d'un étui avec une face antérieure et supérieure et une face postérieure et inférieure
- B) Le col de l'utérus d'une femme multipare a un orifice externe comparable à un museau de tanche
- C) L'utérus présente un angle de rétroflexion et de rétroversion
- D) On appelle fornix du vagin la division de la colonne antérieure du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos de l'appareil sphinctérien du rectum on peut dire que :

- A) Le sphincter interne est le sphincter a motricité volontaire
- B) La partie supérieure et profonde du sphincter externe reçoit des fibres musculaires provenant du muscle transverse profond du périnée
- C) La partie superficielle est responsable du relief des plis radiés de l'anus
- D) Il n'y a pas de fibres longitudinales de la musculature du rectum qui descend jusqu'à la marge anale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

De la question 10 à la question 15

Relation de cause à effet

Réponse A : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts et liés par une relation de cause à effet

Réponse B : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet

Réponse C : si le fait est exact mais la raison proposée est fausse

Réponse D : si le fait est faux mais la raison proposée est exacte

Réponse E : si le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 10 :

Lorsqu'une femme présente une bartholinite infectieuse (infection de la glande vestibulaire majeure) avec écoulement purulent on s'attend à retrouver un écoulement au niveau du sillon labial du pudendum (sillon inter-labial de la vulve)

PARCE QUE

C'est à ce niveau que s'abouche le conduit de la glande vestibulaire majeure

QCM 11 :

Lorsqu'une femme présente un cancer du pudendum (vulve) on peut trouver des adénopathies inguinales

PARCE QUE

Le drainage lymphatique du pudendum se fait en partie vers les nœuds inguinaux qui sont autour de la crosse de la veine petite saphène en regard du hiatus saphène du plafond du trigone fémoral (triangle de Scarpa)

QCM 12 :

Si l'on réalise un cathétérisme sus-pubien sur une vessie pleine et distendue, le cathéter traverse successivement la peau, les muscles grands droits ou la ligne blanche, la cavité péritonéale (grande cavité péritonéale) et la paroi vésicale

PARCE QUE

Lorsque la vessie est pleine et distendue la paroi vésicale s'élève en dôme au-dessus de la symphyse pubienne

QCM 13 :

Le drainage lymphatique de l'ovaire droit se fait vers les nœuds rénaux droits

PARCE QUE

Il existe des conduits lymphatiques qui suivent la veine gonadique droite qui se jette dans la veine rénale droite

QCM 14 :

Le toucher rectal permet d'atteindre le cul de sac péritonéal le plus bas de la cavité péritonéale (cul de sac de Douglas)

PARCE QUE

Ce cul de sac est sur la face postérieure du rectum

QCM 15 :

Les fistules anales prennent naissance le plus souvent au niveau de la partie basse des colonnes anales (au niveau des sinus anaux)

PARCE QUE

Au niveau de la marge anale de l'anus les paquets hémorroïdaires sont le plus souvent à 1 heure, 6 heures et 8 heures