

De la question 1 à la question 5

Relation de cause à effet

Réponse A : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts et liés par une relation de cause à effet

Réponse B : si le fait et la raison proposés sont tous deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet

Réponse C : si le fait est exact mais la raison proposée est fausse

Réponse D : si le fait est faux mais la raison proposée est exacte

Réponse E : si le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 1 :

On peut dire que l'articulation sacro-iliaque est une articulation fibreuse ayant la forme d'un bouton pression

PARCE QUE

Entre l'os coxal et le sacrum, au niveau du sinus sacro-iliaque existe le puissant ligament interosseux

QCM 2 :

Un projectile passant par le premier trou sacré pelvien (antérieur) peut entraîner la paralysie d'un ou plusieurs muscles innervés par le nerf sciatique

PARCE QUE

Le tronc du nerf sciatique passe par le canal sous piriforme au niveau de la grande échancrure sciatique

QCM 3 :

La petite échancrure sciatique est au-dessous de l'épine sciatique

PARCE QUE

La gouttière du psoas est au-dessus de l'éminence ilio-pubienne

QCM 4 :

Quel que soit l'état de réplétion de la vessie, une aiguille introduite d'avant en arrière juste au-dessus de la symphyse pubienne ne pourra jamais rentrer dans la vessie sans traverser la grande cavité péritonéale

PARCE QUE

La vessie est un organe sous péritonéal

QCM 5 :

Le drainage lymphatique de l'ovaire droit peut aller directement vers les nœuds rénaux droits en suivant la veine gonadique droite

PARCE QUE

Celle-ci se jette dans la veine rénale droite

De la question 6 à la question 15

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?

QCM 6 : A propos des nerfs du petit bassin, on peut dire que :

A) Les nerfs érecteurs (d'Eckart) véhiculent l'influx orthosympathique de la miction, de l'érection et de la défécation

B) Le nerf honteux provient du rameau antérieur des nerfs spinaux S2, S3 et S4

C) Le nerf dorsal du clitoris provient du rameau antérieur du deuxième nerf lombal (lombaire)

D) Le nerf rectal inférieur (nerf anal) provient du rameau antérieur du premier nerf sacré (sacré)

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : Au niveau du vestibule du pudendum, on peut voir :

- A) Le méat externe de l'uretère
- B) L'orifice du canal des 4 glandes vestibulaires majeures
- C) L'orifice du vagin
- D) De nombreux poils
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos de l'hymen, on peut dire que :

- A) L'hymen semi-lunaire est une variété morphologique de l'hymen de la femme vierge
- B) Les caroncules hyménéales reçoivent l'abouchement des glandes vestibulaires majeures
- C) Les caroncules myrtiformes sont une variété de l'hymen de la femme vierge
- D) Le muscle constricteur de la vulve est dans l'épaisseur de l'hymen
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : Parmi les muscles du périnée, nous pouvons citer :

- A) Le muscle pubo-coccygien
- B) Le muscle ilio-coccygien
- C) Le muscle coccygien
- D) Le muscle piriforme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : Parmi les muscles ayant une insertion sur le noyau fibreux central du périnée, nous pouvons citer :

- A) L'obturateur interne
- B) Le muscle piriforme
- C) Le psoas iliaque
- D) Le sphincter strié de l'urètre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos de la vessie :

- A) Le trigone vésical est au niveau de la face antéro-inférieure de la vessie
- B) Le sphincter lisse de la vessie est au-dessous du sphincter strié
- C) Le système orthosympathique contrôle la contraction du sphincter lisse
- D) La muqueuse normale de la vessie d'une femme adulte est rosée et lisse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : A propos de la lame sacro-génito-pubienne, on peut dire que :

- A) Elle est au-dessus du fascia supérieur du muscle élévateur de l'anus
- B) Son aileron antérieur forme les ligaments vésico-utérin et pubo-vésical
- C) Son aileron latéral forme le ligament cardinal de l'utérus
- D) Son aileron postérieur forme les ligaments recto-utérin et utéro-sacré
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : A propos du rectum, on peut dire que :

- A) Le canal anal n'est pas péritonisé
- B) Le cap du rectum est entre l'ampoule du rectum et le canal anal
- C) Dans sa lumière existent des plis transverses semi-lunaires muqueux
- D) Les colonnes anales et les valvules anales sont dans le canal anal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : A propos du péritoine qui tapisse les organes pelviens et à propos du ligament large, on peut dire que :

- A) L'aileron postérieur du ligament large enveloppe l'ovaire
- B) L'aileron antérieur du ligament large est sous-tendu par l'urètre pelvien
- C) Le mésosalpinx fait partie de l'aileron supérieur
- D) La base du ligament large forme le paramètre et contient l'aileron latéral ou ligament cardinal de la lame sacro-recto-génito-pubienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : A propos du vagin, on peut dire que :

- A) Il est tapissé sur ses parois externes par le péritoine
- B) Son fornix est en rapport direct avec le trigone vésical
- C) La colonne postérieure du vagin est trifurquée en regard du trigone vésical
- D) Les crêtes transversales du vagin ou rides du vagin augmentent avec l'âge et le nombre de grossesse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses