

# DM n°3 : Rectum

## Tutorat 2020-2021 : 10 QCMS



### **QCM 1 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Le rectum présente d'une part une partie au-dessus du rectum du Levator Ani (segment pelvien) et d'autre part une partie en-dessous du rectum (segment périnéal)
- B) Le segment périnéal correspond au cap anal qui est un angle de 110° ouvert en arrière
- C) Le segment pelvien correspond à l'ampoule rectal qui se trouve être dilaté et mobile
- D) La partie inférieure du rectum se trouve être peut mobile et s'ouvre sur l'anus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

### **QCM 2 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Le rectum possède des haustrations (3 à droite, 2 à gauche) au niveau du segment pelvien
- B) Non, le rectum possède des haustrations (2 à droite, 3 à gauche) au niveau du segment périnéal
- C) Au niveau du canal anal on retrouve des colonnes horizontales qui sont les colonnes de Morgagni
- D) Ces colonnes forment des valves à concavité supérieure, elles ont un rôle de rétention de matière fécale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

### **QCM 3 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Le segment pelvien se trouve au-dessus de la ligne ano-rectal
- B) Le segment périnéal correspond en partie à la zone columnaire
- C) Le segment périnéal commence en-dessous de la ligne ano-rectal
- D) La ligne ano-cutanée correspond à la transition entre le segment pelvien et anus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

### **QCM 4 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Sa muqueuse présente deux plis transverses à gauche et un pli transverse à droite
- B) Il s'agit d'un épithélium cylindrique dans l'ampoule
- C) Et pavimenteux dans le canal anal
- D) C'est dans cette muqueuse que l'on retrouve les plexus veineux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

### **QCM 5 : À propos de la vascularisation rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Le rectum est vascularisé en partie par l'artère mésentérique inférieure
- B) L'artère pudendale donne des artères allant irriguer le rectum
- C) L'artère hypogastrique vascularise le rectum via l'artère rectale moyenne entre autres
- D) L'artère rectale supérieure droite est plus volumineuse que la gauche
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

### **QCM 6 : À propos de la vascularisation rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Une partie du rectum sera drainée par le tronc porte
- B) Ce tronc porte est formé par le tronc spléno-mésarique et la VMI
- C) Une partie du rectum sera drainée par VCI
- D) Le rectum possède une anastomose cave-cave fonctionnelle lors d'une hypertension portale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

### **QCM 7 : À propos du drainage lymphatique du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Le rectum possède 4 pédicules lymphatiques
- B) Toutes ces chaînes se drainent in fine vers les nœuds lombo-abdominaux aortique
- C) Le pédicule rectal supérieur se situe à la bifurcation de l'artère rectale supérieure et rejoint directement les nœuds lombo-abdominaux
- D) Non le pédicule rectal supérieur rejoint les nœuds du promontoire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 8 : À propos des rapport du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Le pli recto-utérin ou utéro-rectal est une plicature antéro-postérieur se situant au niveau du canal anal
- B) La fosse latéro-rectal se situe dans la partie post de la LSRGP de part et d'autre du rectum au-dessus du LA
- C) Le fascia celluleux retro-rectal recouvre la partie du rectum non péritonisée
- D) La fosse ischio-rectal se situe dans la partie post de la LSRGP de part et d'autre du rectum au-dessus du LA
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Le rectum est totalement péritonisé
- B) Non, il est recouvert dans sa partie inférieur par le fascia péri-rectal / fascia celluleux retro-rectal
- C) Il présente deux couches musculueuses, une circulaire interne formant le sphincter lisse et une longitudinal externe
- D) La couche longitudinal externe donne l'aspect longitudinale strié du rectum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 10 : À propos du sphincter strié rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :**

- A) Il est composé de 3 couches, de dehors en dedans : profonde, intermédiaire, sous-cutanée
- B) Il est innervé par le nerf rectal inférieur S4
- C) Il peut être issu du nerf pudendal S2-S3-S4
- D) Ce sphincter est traversé par les fibre longitudinal du de la musculueuse externe du rectum, qui sont responsable des plis radiés de l'anus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**CORRECTION**

**QCM 1 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Le segment périnéal correspond au canal anal et non au cap anal, ce dernier et entre le segment pelvien et périnéal (c'est la frontière en gros)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 2 : D**

- A) Faux : 3 à gauche 2 à droite
- B) Faux : segment pelvien et non périnéal
- C) Faux : colonnes verticales et non horizontales
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 3 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Segment périnéal et l'anus
- E) Faux

**QCM 4 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Non c'est dans la sous-muqueuse
- E) Faux

**QCM 5 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 6 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : VMS +++
- C) Vrai
- D) Faux : anastomose porto-cave
- E) Faux

**QCM 7 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Cf C
- E) Faux

**QCM 8 : BC**

- A) Faux : jusqu'à dans la partie basse de l'ampoule +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : En-dessous
- E) Faux

**QCM 9 : BCD**

- A) Faux : cf B
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : BCD**

- A) Faux : La couche intermédiaire se nomme SUPERFICIELLE ++++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

