

DM n°5 : Moyen de stabilité

Tutorat 2020-2021 : 10 QCMS



QCM 1 : À propos de LSRGP, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) C'est une formation fibro-conjonctive, comprenant des éléments nerveux et fibreux
- B) Elle est difficile à visualiser
- C) Elle est aussi difficilement palpable car très souple
- D) Elle joue alors un rôle mineur dans la stabilité des organes du PB
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos de LSRGP, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Elle part du pubis jusqu'au rectum
- B) Elle repose sur le fascia profond du diaphragme pelvien
- C) Elle repose sur le fascia supérieur du Levator ani
- D) Non, elle repose sur le fascia supérieur du fascia périnéal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos des rapport de la LSRGP, on retrouve de haut en bas ?

- A) La LSRGP, diaphragme pelvien, élément nerveux (PHI) et les artères issus de l'artère hypogastrique, ligament large, organe du PB
- B) La LSRGP, diaphragme pelvien, ligament large, élément nerveux (PHI) et les artères issus de l'artère hypogastrique, organes du PB
- C) La LSRGP, élément nerveux (PHI) et les artères issus de l'artère hypogastrique, diaphragme pelvien, ligament large, organes du PB
- D) Le ligament large, la LSRGP, élément nerveux (PHI) et les artères issus de l'artère hypogastrique, diaphragme pelvien, organes du PB
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4: À propos de la composition de la LSRGP, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) L'aileron antérieur part du pubis et arrive jusqu'à la vessie
- B) L'aileron postérieur part de l'utérus et se termine au rectum
- C) L'aileron latéral se trouve au-dessus de la base du ligament large
- D) Il se nomme ligament cardinal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos de la composition de la LSRGP, l'aileron antérieur est composé de ?

- A) Ligament utéro-vésical
- B) Fascia ombilico-pré-vésical
- C) Ligament rond
- D) Ligament vesico-utérin
- E) Ligament pubo-utérin

QCM 6 : À propos du ligament large, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Il se situe entre le péritoine pariétal et l'utérus
- B) C'est une formation ligamentaire qui présente une bonne résistance
- C) Il donne une bonne stabilité aux organes du PB
- D) Ce ligament va recouvrir l'entièreté de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos du ligament large, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le ligament large possède deux ou trois lignes de réflexion suivant la vue
- B) L'aileron antérieur sous-tend le ligament rond
- C) L'aileron postérieur sous-tend le ligament utéro-ovarique
- D) L'aileron supérieur sous-tend l'oviducte
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos du ligament large, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le ligament large va former différents culs de sac péritonéaux
- B) L'un d'entre eux va former le cul de sac recto-utérin, il est palpable au touche rectal et utérin
- C) Lors d'une péritonite on pourra observer le crie de douglas au niveau de ce cul de sac
- D) C'est au niveau au niveau du cul de sac vessico-prostatique que l'on retrouve ce qui aussi
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos du ligament large, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La bas du ligament large se nomme le paramètre
- B) Il se repose sur le diaphragme pelvien
- C) Il est au-dessus du diaphragme pelvien
- D) Le mésomètre correspond à la partie moyenne du ligament large
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos du ligament large, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Sur une vue médiale et latéral on voit toujours le ligament rond sous-tendue par l'aileron antérieur du ligament large
- B) Sur une vue médiale et latéral on voit toujours le ligament utéro-ovarique sous-tendue par l'aileron postérieur du ligament large
- C) Sur une vue médiale et latéral on voit toujours l'oviducte sous-tendue par l'aileron supérieur du ligament large
- D) Sur une vue latéral on peut voir le ligament lombo-ovarien sous-tendue par le ligament large
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

CORRECTION

QCM 1 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : facilement palpable
- D) Faux : STABILITE MAJEUR +++
- E) Faux

QCM 2 : BC

- A) Faux : pubis → sacrum
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Cf B,C
- E) Faux

QCM 3 : D

- A) Faux :
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Vrai :Cf cour +++
- E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux : pubis → utérus
- B) Faux : utérus → sacrée
- C) Faux : au-DESSOUS
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : COUUUUURS
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 6 : A

- A) Vrai
- B) Faux : faible résistance +++
- C) Faux : aucune stabilité +++
- D) Faux : SEULEMENT LA PARTIE LATERAL +++
- E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai : 3 en vue médial et 2 en vue latéral(pariétal)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : cul de sac utéro-rectal ☹
- C) Vrai
- D) Vrai : c'est vrai chez l'homme ☺
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Il se trouve bien au dessus du diaphragme pelvien mais repose sur le LSRGP +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Sur une vue latéral on peut voir uniquement le ligament rond et ligament lombo-ovarien +++
- C) Faux :
- D) Vrai
- E) Faux