

DM n°1 : Annales saison 10 + Rectum 2010/2011

Tutorat 2020-2021 : ... QCMS



Cette année il n'y a pas eu de QCM sur les OGE féminin/masculin pour toutes les épreuves d'anatomie en PACES

2010/2011 : Donnez les réponses fausses

QCM 1 : A propos des lymphatiques que l'on trouve sur les parois du petit bassin, on peut dire que : apprenez vos schémas on sait jamais 😊

- A) Le groupe intermédiaire de la chaîne externe est entre l'artère et la veine iliaque externe
- B) Le groupe interne et inférieur de la chaîne iliaque externe est en dedans de la veine iliaque externe
- C) Le groupe iliaque interne se draine dans les nœuds lymphatiques iliaques primitifs (communs)
- D) La chaîne iliaque externe se draine dans les nœuds lymphatiques de la chaîne iliaque interne
- E) Les nœuds lymphatiques iliaques primitifs (communs) se drainent dans les nœuds aorto-abdominaux

QCM 2 : A propos des vaisseaux qui vont vasculariser le petit bassin, on peut dire que :

- A) Les artères gonadiques naissent en L4
- B) Les artères artères rénales naissent en L1
- C) L'aorte se divise en L5
- D) La veine iliaque externe est en dedans de l'artère iliaque externe
- E) L'artère iliaque externe présente deux troncs (antérieur et postérieur)

QCM 3 : A propos de la vulve, on peut dire que :

- A) Les petites lèvres forment le capuchon du clitoris
- B) Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent de part et d'autre du méat urétral
- C) L'imperforation de l'hymen lors des premières règles donnera une douleur chez la jeune fille
- D) Le bulbe vestibulaire est un corps érectile qui enserre le vestibule de la vulve
- E) Le clitoris s'insère sur les branches descendantes pubiennes

QCM 4 : A propos du rectum anatomique, on peut dire que :

- A) Il présente un segment supérieur qui constitue l'ampoule rectale
- B) Le canal anal représente le segment pelvien du rectum
- C) Les colonnes anales sont situés au niveau du canal anale
- D) Sa limite supérieure est en S3
- E) La partie supérieure du rectum pelvien est péritonisée, la partie inférieure ne l'est pas

QCM 5 : A propos du rectum, on peut dire que :

- A) La zone cutanée de l'anus ne contient pas de poil
- B) Le sphincter strié volontaire est un épaississement de la tunique musculuse du rectum
- C) Les colonnes anales (de Morgagni) sont à la partie haute du canal
- D) Les valvules anales (de Morgagni) sont à la base des colonnes anales
- E) Au-delà de la marge anale de l'anus apparaissent glandes et poils

QCM 6 : A propos du rectum, on peut dire que :

- A) Les fibres issues du muscle levator ani ne pénètrent pas dans le sphincter strié
- B) Le muscle du levator ani ferme l'angle du cap du rectum en se contractant
- C) L'ampoule rectale est relativement mobile
- D) Le canal anal est amarré par le muscle levator ani, le centre tendineux du périnée, le ligament ano-coccygien
- E) Le cap du rectum est un élément favorisant la continence anale

QCM 7 : A propos des rapports du rectum féminin, on peut dire que :

- A) Le cul de sac recto-utérin péritonéal (de Douglas) est la partie la plus déclive de la cavité abdominale
- B) La totalité du sacrum est en arrière du rectum anatomique
- C) Le ligament large délimite latéralement le rectum
- D) Le septum recto-utérin sépare le rectum du vagin
- E) Le fascia recto-rectal (en postérieur du rectum) sépare le rectum du sacrum et du coccyx

QCM 8 : Les moyens de fixité de l'utérus sont :

- A) Les ligaments ronds
- B) Cul-de-sac de Douglas
- C) Les méso-funiculaires
- D) Le paramètre
- E) Les méso-salpinx

CORRECTION

QCM 1 : D

La chaîne iliaque externe se draine vers les nœuds lymphatiques de la chaîne iliaque **commune ou primitive**

QCM 2 : ACD

La division de l'aorte en deux artères iliaques communes ou primitives se fait en regard du **corps vertébral de L4** (et non pas en regard du promontoire)

L'aorte se divise en L4 +++

C'est l'artère iliaque interne +++

QCM 3 : B

Les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin) s'abouchent à la **partie postérieure/moyenne du vestibule du vagin**

Ce sont les glandes para-urétral qui sont à niveau

QCM 4 : B

L'ampoule rectale est pelvienne ; le canal anal est **périnéal**

QCM 5 : B

Le sphincter strié externe du rectum est un muscle à part entière. C'est le sphincter interne lisse qui est un épaississement de la musculature rectale

QCM 6 : A

Les fibres du LA **pénètrent** dans le sphincter strié, pour s'amarrer à la peau et former le corrugator cutis ani

QCM 7 : BC

Puisque le rectum commence en S3, on ne peut pas dire que **la totalité** du sacrum se trouve en arrière du rectum anatomique ; uniquement une partie

WTF le ligament large se situe au niveau de l'utérus

QCM 8 : B

C'est un simple cul-de-sac, il n'a aucun rôle dans la fixité de l'utérus ☺

