

De la question 1 à la question 15

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?

QCM 1 : On peut dire que sur le bord antérieur de l'os coxal :

- A) L'éminence ilio-pubienne (ilio-pectinée) est au-dessous de la gouttière du psoas (vallée du psoas)
- B) L'épine sciatique est en arrière de la cavité cotyloïde
- C) La branche horizontale du pubis est en avant de la symphyse
- D) Le corps de l'ischion est au-dessous de l'épine ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos de la ceinture pelvienne on peut dire que :

- A) Le sommet des crêtes iliaques se projette en regard du disque L4, L5
- B) L'articulation sacro-iliaque est une articulation synoviale
- C) L'articulation pubienne est une articulation cartilagineuse
- D) Les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral sont des ligaments à distance de l'articulation sacro-iliaque
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos de la ceinture pelvienne on peut dire que :

- A) Elle est formée par l'articulation des deux os coxaux au sacrum et entre eux
- B) Le détroit supérieur est dans un plan oblique en bas et en avant
- C) Le détroit supérieur a chez la femme une forme oblongue où sont inscrites deux ellipses
- D) Le détroit inférieur est entre les deux tubérosités ischiatiques, le coccyx et le bord inférieur de la symphyse pubienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos de l'os coxal on peut dire que :

- A) La cavité cotyloïde (acétabulum) comprend un toit et deux cornes
- B) Le cotyle « regarde » en bas en avant et en dehors
- C) Le foramen obturé (trou obturateur) est dans un plan oblique en avant et en dehors
- D) L'épine sciatique est entre la grande et la petite incisure fémorale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos de la vulve on peut dire que :

- A) Le drainage lymphatique se fait vers les nœuds glutéaux
- B) Elle est innervée par le 5^{ème} nerf lombaire spinal
- C) Le mont de vénus ou mont du pubis est une masse lymphatique
- D) Les glandes vestibulaires majeures s'ouvrent dans le canal de l'urètre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos des muscles du périnée et du muscle élévateur de l'anus on peut dire que :

- A) Une des insertions du muscle élévateur de l'anus est sur le fascia du muscle obturateur interne
- B) La fente urogénitale est entre les muscles pubo-coccygiens formés par les faisceaux pubo-génital et pubo-rectal
- C) Le noyau fibreux central du périnée est entre le vagin et le canal anal
- D) Les muscles transverses superficiels et profonds du périnée sont au-dessus du muscle élévateur de l'anus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : Sur une coupe sagittale médiane du petit bassin, on peut voir :

- A) Le cap anal entre l'ampoule rectale et le canal anal
- B) Que l'ampoule du rectum suit la concavité du sacrum
- C) Que le noyau fibreux du périnée est entre le vagin et le canal anal
- D) Que le vagin est dirigé en haut et en avant
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos des touchers pelviens, on peut dire que :

- A) En introduisant un doigt dans l'anus, l'examineur peut atteindre le niveau du cul de sac rectovaginal de Douglas
- B) En introduisant l'index et le majeur dans le vagin l'examineur ne peut pas atteindre le cul de sac rectovaginal
- C) Le cul de sac rectovaginal de Douglas ne correspond pas à la partie la plus basse de la grande cavité péritonéale
- D) La partie la plus basse de la grande cavité péritonéale est entre la vessie et la symphyse pubienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos de la vascularisation des organes pelviens on peut dire que :

- A) L'artère utérine ne vascularise que l'utérus
- B) La vessie reçoit une vascularisation importante de l'artère obturatrice
- C) L'artère obturatrice est l'unique rameau collatéral de l'artère iliaque externe
- D) L'artère iliaque interne porte aussi le nom d'artère hypogastrique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos des ligaments larges de l'utérus on peut dire que :

- A) Ils sont en avant et en arrière de l'utérus
- B) L'aileron supérieur est sous-tendu par le ligament rond
- C) L'aileron antérieur est sous-tendu par l'artère ombilicale
- D) L'aileron postérieur est sous-tendu par le plexus hypogastrique inférieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos du périnée musculaire on peut dire que :

- A) La contraction du muscle ischio-caverneux favorise l'intumescence du clitoris
- B) Le muscle constricteur de la vulve est le muscle de l'hymen
- C) Le muscle constricteur de la vulve disparaît après le premier coït complet
- D) Le muscle transverse profond s'insère sur le sphincter strié de la vessie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : A propos de la vessie et de l'urètre on peut dire que :

- A) La vessie est sous-péritonéale
- B) Le corps de l'utérus est sur la face supérieure de la vessie lorsque la vessie est vide
- C) L'urètre s'abouche au niveau de l'apex de la vessie
- D) Le détroisor est innervé par le 5^{ème} nerf lombaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : Les moyens de fixité de l'utérus sont :

- A) L'urètre
- B) L'uretère
- C) La lame sacro-recto-génito-pubienne
- D) Le noyau fibreux central du périnée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : A propos des artères du petit bassin on peut dire que :

- A) L'artère gonadique est un rameau de l'artère iliaque interne
- B) L'artère vaginale participe à la vascularisation de l'ovaire
- C) L'artère ombilicale vascularise la vessie
- D) Le trajet de l'artère utérine est rectiligne sur le corps de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : A propos du rectum on peut dire que :

- A) Il présente des plis muqueux transverses
- B) Il est en partie péritonisé
- C) Son sphincter lisse est à la partie basse des colonnes anales
- D) Les valvules anales sont à concavité supérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses