

DM : Les organes du Petit Bassin

Tutorat 2020-2021 : x qcms

QCM 1 : A propos de l'appareil génital féminin, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le vagin est un conduit musculo-membraneux mesurant 8cm de long et faisant un angle de 60° avec l'horizontale
- B) Les cornes utérines désignent les angles latéraux de l'utérus
- C) Les oviductes ou trompes de Fallope, s'abouchant au niveau des cornes utérines, sont presque totalement péritonisés
- D) L'ovaire est un organe totalement péritonisé et intra-péritonéal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos du vagin, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le vagin, formé de deux faces accolées l'une à l'autre, se situe en arrière et sous la vessie et se projette sur l'ischion
- B) Le trigone vaginal, situé sur sa face antérieure, répond au trigone vésical
- C) Il présente une colonne et des rides transversales prononcées le long de sa face antérieure, évoquant l'aspect d'un palais de chien
- D) L'éjaculation se produit au niveau du lac spermatique, appartenant au fornix ou dôme vaginal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos de l'utérus, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) C'est un organe musculaire, rétrofléchi et antépulsé, sous-péritonéal et partiellement péritonisé
- B) Au niveau des cornes de l'utérus s'abouchent d'avant en arrière le ligament utéro-ovarien, les oviductes et le ligament rond
- C) La tunique interne de l'utérus peut être le siège de la formation de myomes, tumeurs musculaires
- D) La tunique externe de l'utérus est tantôt formée du fascia utérin, tantôt du péritoine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos des oviductes, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Les oviductes sont des organes sous-péritonéaux présents de manière bilatérale et décomposés en trois tuniques (muqueuse, musculuse, séreuse)
- B) La frange ovarique désigne une frange très développée du pavillon capable de recouvrir la gonade féminine
- C) L'ampoule, segment dilaté de l'oviducte, est le siège de la fécondation et ainsi parfois de grossesse extra-utérine
- D) Le pavillon de la trompe s'ouvre directement dans la grande cavité péritonéale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos de l'ovaire, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Il a la forme et la taille d'une amande
- B) Sa fonction endocrine est portée par la libération d'ovocytes et sa fonction exocrine par la sécrétion d'hormones
- C) Le cortex ovarien assure un rôle endocrine et exocrine
- D) Les follicules naissent de la médulla ovarienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : Vous êtes gynécologue et recevez en consultation une patiente de 47 ans, multipare, présentant un test HPV + ainsi qu'un résultat de frottis cervico-vaginal anormal. Vous décidez de pratiquer une coloscopie, examen du vagin et du col utérin à l'aide d'une loupe binoculaire, afin de vérifier à l'aide de colorants la présence d'une éventuelle dysplasie du col utérin, qui, si elle est présente, sera biopsiée et envoyée au service d'anatomopathologie de votre CHU. Indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Après avoir installé votre patiente en position de taille, vous utilisez un speculum pour écarter les parois du vagin et pouvez observer le col utérin, au sommet de la cavité vaginale
- B) Les parois vaginales présentent des rides transversales très estompées
- C) Le col utérin ou museau de tanche présente un orifice externe annulaire, régulier et aplati
- D) Vous pouvez apercevoir le fond de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : Vous décidez de pratiquer un badigeonnage du col à l'acide acétique. Indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Si une tumeur est présente, elle restera rosée, les cellules tumorales n'étant pas acidophiles
- B) Si une tumeur est présente, elle apparaîtra acajou, les cellules tumorales étant iodophiles

Vous décidez de pratiquer un badigeonnage du col au lugol. Indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- C) Si une tumeur est présente, elle restera rosée tandis que les cellules saines, lugolophiles, se coloreront en acajou
- D) Si une tumeur est présente, elle apparaîtra blanchâtre sous l'effet de ce colorant
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Parmi les voies de drainage lymphatique directes de l'utérus, on peut citer :

- A) Les noeuds lymphatiques iliaques externes
- B) Les noeuds lymphatiques iliaques du promontoire
- C) Les noeuds lymphatiques abdomino-aortiques
- D) Les noeuds lymphatiques iliaques superficiels
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos de l'artère utérine, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Elle vascularise exclusivement l'utérus
- B) Elle possède un trajet rectiligne descendant sur le fascia supérieur du diaphragme pelvien puis un trajet rectiligne ascendant à l'abord de l'utérus
- C) Elle participe à la vascularisation de l'uretère, qu'elle chevauche
- D) Elle vascularise la vessie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos de l'utérus, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La couche musculaire la plus interne est longitudinale
- B) Il présente un angle d'antéversion de 90°
- C) Les plis palmés du col correspondent à l'arbre de vie de l'utérus
- D) Une hystérectomie (ablation de l'utérus), peut en cas de cancer entraîner également un curage des noeuds lymphatiques iliaques externes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos du vagin et de la vulve, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Chez une femme souffrant d'un cancer du pudendum, il serait pertinent de palper les noeuds lymphatiques inguinaux superficiels
- B) Les parois antérieure et postérieure du vagin ont un aspect de palais chien
- C) Le fornix ou introit est fortement strié par les rides transversales du vagin
- D) Sa partie basse est vascularisé par des rameaux issus des artères rectales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : A propos de l'ovaire, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) L'ovaire repose sur le péritoine pelvien qui émet une expansion viscérale l'encapsulant
- B) Les cancers ovariens n'envahissent que rarement le péritoine
- C) Il n'est vascularisé que par l'artère gonadique qui née de l'aorte en L3
- D) Un cancer de l'ovaire droit peut s'étendre facilement au rein droit
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : A propos de l'appareil urinaire, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Les uretères sont des organes rétropéritonéaux après leur passage sous la division des artères iliaques
- B) L'uretère gauche croise la division des artères iliaques en dehors de la naissance de l'iliaque interne
- C) La vessie se projette sur le foramen ischiatique de l'os coxal
- D) C'est sur vessie vide qu'on effectue en toute sécurité un cathétérisme sus-pubien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : A propos de la vessie, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La vessie est un organe musculaire dont la couche externe est totalement recouverte de péritoine
- B) Le détrusor, réparti en trois couches musculaires, reçoit une innervation orthosympathique
- C) Le sphincter lisse de la vessie, épaissement de la couche moyenne circulaire du détrusor, reçoit une innervation parasymphatique

- D) La tunique interne de la vessie correspond à un urothélium rosé et aréolé chez l'adulte
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : A propos de l'appareil urinaire, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Les orifices urétéraux sont encadrées de valves muqueuses anti-reflux d'urine, cloisonnant ainsi les infections
- B) Chez la femme, le trigone vésical imprime sa forme sur la face antérieure du vagin
- C) Les glandes urétrales, situées à l'extrémité terminale de l'urètre, s'abouchent de part et d'autre du méat urinaire
- D) L'urètre féminin, extrêmement long, est séparé du vagin par le fascia vésico-vaginal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses