

DM MORPHOGENESE DES ARCADES



QCM 1 : A propos de la denture temporaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) En denture temporaire, l'arcade à une forme elliptique
- B) Le plan terminal de Chapman le plus courant est le droit/rectiligne
- C) L'incisive centrale mandibulaire temporaire apparaît à 7mois
- D) La canine temporaire apparaît à 16-20 mois
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos de la morphogénèse des arcades, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) En denture temporaire stable on a : 1/2/3/4/5
- B) La denture mixte chez les garçons s'étend de 6/7ans à 10/11ans, alors que chez les filles cela s'étend de 6/7ans à 8/9ans
- C) Concernant l'ordre d'apparition des dents, on a au maxillaire : 6/1/2 et à la mandibule : 1/6/2
- D) En denture mixte stable on a : 1/2/III/IV/V/6
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos de la morphogénèse des arcades, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) En denture mixte stable la forme d'arcade passe de semi-circulaire à parabolique/elliptique
- B) En denture adolescente, on a le remplacement des molaires et canines temporaires
- C) La mise en place de la denture mixte chez le garçon commence vers 10ans et dure 15mois, tandis que chez la fille cela dure 13mois
- D) En denture adolescente stable on a : 1/2/3/4/5/6
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos de la morphogénèse des arcades, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) La 2^{ème} molaire (dent de 12ans) apparaît au stade de denture adulte jeune
- B) La 3^{ème} molaire (dent n°7) apparaît au stade de denture adulte complète
- C) La première molaire définitive fait son éruption avant les canines définitives
- D) Les dents maxillaires font presque toujours leur éruption avant les mandibulaires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses