



1/	D	2/	BC	3/	B	4/	C	5/	B
6/	E	7/	ABCD	8/	B	9/	ABCE	10/	E
11/	E	12/	E	13/	ABCE	14/	ABC	15/	D

QCM 1 : D

- A) Faux : elle n'est formée **que des os coxaux** +++ (cf. rép du prof de cette année et sdr l'an dernier)
B) Faux : elle est située sur la **face endopelvienne** ++
C) Vrai : puisqu'on s'assoit dessus
D) Vrai, si vous avez du mal regardez ce post : <https://www.carabinsnicois.fr/phpbb/viewtopic.php?f=2412&t=156305>
E) Faux

QCM 2 : BC

- A) Faux : de 2 ovoïdes sécantes (pas non plus d'un triangle +++)
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : il suit l'axe de la ligne arquée, inclinée de 60° avec l'horizontale, incliné vers l'avant et le bas
E) Faux

QCM 3 : B

- A) Faux : il est en dessous ++
B) Vrai
C) Faux : seule la corne postérieure pointe dans le foramen obturé (cf réponses de 2P)
D) Faux : à 12,5 cm, 18,5 cm c'est aberrant comme longueur
E) Faux

QCM 4 : C

La coloration à l'acide acétique marque les cellules cancéreuses ACIDOPHILES

QCM 5 : B

Le fait et la raison sont exacts mais si un cancer de l'ovaire gauche peut s'étendre au rein gauche c'est parce que la veine gonadique gauche se jette dans la veine rénale gauche, les voies de drainage lymphatiques se superposant au réseau veineux dans ce cas.

QCM 6 : E

Le fait et la raison sont faux. La vessie soulève le péritoine et ce qu'il contient seulement lorsqu'elle est pleine, c'est pour cela qu'on ne pratique les cathétérismes sus-pubiens que sur vessie pleine ++

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai : drainage indirect par le ligament rond
E) Faux

QCM 8 : B

- A) Faux
B) Vrai : il se draine dedans
C) Faux : plexiforme
D) Faux : trajet godronné sur le bord latéral de l'utérus
E) Faux

QCM 9 : ABCE

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : cf. cour
E) Vrai

QCM 10 : E

- A) Faux, RÉCAP :
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Faux :
- E) Vrai

1-/Diaphragme pelvien :

- > **Fascia profond/supérieur** : **Épais**, le plus résistant
- > **Fascia superficiel/inférieur** : **Fin**, le moins résistant

2-/Diaphragme périnéal :

- > **Fascia profond/supérieur** du **muscle transverse profond** : **Fin**, le moins résistant
- > **Fascia superficiel/inférieur** du **muscle transverse superficiel** : **Épais**, le plus résistant

QCM 11 : E

- A) Faux : le pédicule rectal inférieur draine l'anus et le canal anal
- B) Faux : cf. A
- C) Faux : l'artère rectale supérieure droite est plus volumineuse que la gauche
- D) Faux : cf. A
- E) Vrai

QCM 12 : E

- A) Faux : profonde, intermédiaire = superficielle et externe = sous-cutanée +++ apprenez les synonymes
- B) Faux : couche longitudinal externe lisse du rectum qui va former les plis radiés de l'anus
- C) Faux : fibres musculaire strié du rectum
- D) Faux : au faisceau antérieur élévatrices du rectum (le sous-faisceau pubo-rectal du faisceau pubo-coccygien)
- E) Vrai

QCM 13 : ABCE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il n'existe pas Réponse des profs +++
- E) Vrai

QCM 14 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : non seule la partie supérieure de l'ampoule rectal est recouvert de péritoine (la partie au-dessus de LA)
- E) Faux : non c'est la seule partie de l'oviducte ne possédant pas de péritoine

QCM 15 : D

- A) Faux : au-dessus et en dehors
- B) Faux : entre le fascia de l'obturateur et le fascia profond du diaphragme périnéal
- C) Faux : je vous rappelle que les muscles du périnée sont situés uniquement dans le triangle antérieur et dans le triangle postérieur l'endroit et combler par de la graisse au niveau de la fosse ischio-rectal. Donc la fosse ischio-rectal se situe en arrière de muscle transverse profond
- D) Vrai
- E) Faux