



Tutorat n°X : Epreuve UE 6 – DM professeur

Tutorat 2020-2021 : **10 QCMS** – **Durée : 10min**

QCM 1 - Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) exacte(s) concernant les médicaments orphelins ?

- A) Les médicaments orphelins sont utilisés pour le traitement des maladies négligées ;
- B) Les maladies rares touchent plus de 5 personnes sur 10 000 ;
- C) Les médicaments orphelins concernent un très grand nombre de patients ;
- D) Des mesures européennes ont été mises en place pour limiter le développement des médicaments orphelins ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rép E

QCM 2 - Parmi les phases suivantes la(es)quelle(s) participe(nt) au devenir d'un médicament dans l'organisme après une administration thérapeutique unique à un patient ?

- A) La phase biopharmaceutique ;
- B) La phase toxicocinétique ;
- C) La phase de tachyphylaxie ;
- D) La phase pharmacodynamique ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rép AD

QCM 3 - Indiquez la (les) proposition(s) exacte(s). La liaison d'un médicament aux protéines plasmatiques est un phénomène qui :

- A) Concerne tous les principes actifs ;
- B) Peut- être responsable de l'allongement de la demi-vie d'élimination de certains médicaments ;
- C) Influence la distribution tissulaire et la rapidité d'action pharmacologique d'un principe actif ;
- D) Elle est parfois saturable et/ou soumise à compétition ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rep ABCD

QCM 4 - Un patient a bénéficié d'une greffe de rein et reçoit un traitement immunosuppresseur par tacrolimus en prophylaxie du rejet. Une infection staphylococcique vous conduit à lui prescrire de la rifampicine. Quels seront les éléments à prendre en compte ?

- A) Aucun en particulier car cette association est courante ;
- B) Augmenter la posologie de tacrolimus sous surveillance pharmacologique ;
- C) Surveiller l'apparition d'éventuels signes de rejet ;
- D) Réduire la posologie de tacrolimus pour prévenir ses effets indésirables ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rep BC

QCM 5 - Quelle(s) est (sont) la(les) situations rentrant dans la définition d'un effet indésirable médicamenteux ?

- A) Un surdosage ;
- B) Un abus médicamenteux ;
- C) Un mésusage ;
- D) Une erreur médicamenteuse ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rep ABCD

QCM 6 - Vous réfléchissez à la prescription d'un anticoagulant oral direct, l'apixaban, chez une patiente de 80 ans chez laquelle vous venez de diagnostiquer une fibrillation auriculaire. Quelle(s) est(sont) l'(es) information(s) exacte(s) ?

- A) Vous avez retenu l'apixaban car la patiente a plus de 60 ans ;
- B) Vous avez retenu l'apixaban car la patiente est une femme de petit poids ;
- C) Vous prescrivez l'apixaban car vous estimez que le risque thrombotique dépasse le risque hémorragique ;
- D) Vous prescrivez l'apixaban car vous estimez que le risque thrombotique égale le risque hémorragique ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rep C

QCM 7 - Concernant l'ordonnance, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Elle doit être remise en deux exemplaires au patient ;
- B) Elle doit être présentée dans tous les cas et pour toute prescription au pharmacien dans un délai de trois mois maximum pour sa délivrance ;
- C) Elle doit être manuscrite ;
- D) Elle doit toujours être signée par le prescripteur ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rep D

QCM 8 - L'un des vaccins anti-Covid validé en Europe est associé à des complications thromboemboliques atypiques chez les sujets jeunes. Cette possible complication n'avait pas été détectée lors des essais préliminaires (phases 2 et 3). Comment expliquez-vous cette discordance ?

- A) Cette complication n'était pas systématiquement recherchée lors des essais préliminaires ;
- B) La population rejointe est beaucoup plus importante que celle des essais cliniques ;
- C) La population rejointe est mieux surveillée que les patients des essais cliniques ;
- D) Les essais préliminaires n'avaient pas comporté ces tranches d'âge ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rep B

QCM 9 - Vous prenez en charge un homme de 75 ans pour des lombalgies mécaniques pour lesquelles vous vous apprêtez à prescrire un traitement symptomatique. Ce patient présente une hypertension artérielle traitée par une association inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) de l'angiotensine + diurétique. Vous hésitez entre du paracétamol ou un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

- A) Vous allez privilégier l'AINS car il est plus efficace que le paracétamol sur le plan antalgique ;
- B) Vous allez privilégier l'AINS car il nécessite moins de prises que le paracétamol ;
- C) Vous allez privilégier le paracétamol en raison du risque rénal de l'association IEC + AINS ;
- D) Vous allez privilégier le paracétamol en raison du risque rénal de l'association diurétique + AINS ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rep CD

QCM 10 - Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) comprend notamment les éléments suivants :

- A) Les interactions ;
- B) Le résumé des publications des études cliniques de phase 3 portant sur le principe actif ;
- C) La composition ;
- D) Les effets indésirables ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

Rep ACD