

DM pré-concours : Anatomie du petit bassin chez la femme

Tutorat 2020-2021 : 15 QCMS

QCM 1 : A propos de la ceinture pelvienne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sourcil de l'acétabulum reçoit la tête du fémur pour former l'articulation coxo-fémorale
- B) Le diamètre sous-pubien-coccyx rétropulsé mesure 11 cm
- C) Le détroit supérieur de la femme a la forme d'un double triangle à sommets internes et bases externes
- D) Le foramen obturé regarde en bas, en avant et en dehors
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos du bord antérieur de l'os coxal, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'éminence ilio-pectinée se situe au-dessus du pecten pubien
- B) La gouttière du psoas se situe en dessous de l'échancrure inter-épineuse antérieure
- C) L'épine iliaque antéro-supérieure est palpable
- D) L'épine sciatique se situe en regard de la corne postérieure de la cavité cotyloïde
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 :

On peut constater un arrachement des processus transverses de L4-L5 en cas de traumatisme important du bassin

PARCE QUE

Les ligaments ilio-lombaires rattachent la crête iliaque aux processus transverses de L4-L5

QCM 4 :

On peut introduire un trocart sus-pubien sur une vessie vide sans risquer de léser les organes internes

PARCE QUE

La vessie pleine refoule vers le haut le péritoine pariétal

QCM 5 :

L'orifice externe du col utérin varie au cours de la vie génitale de la femme

PARCE QUE

L'examen du col au lugol chez la femme multipare saine colore les cellules en acajou

QCM 6 :

L'artère utérine présente de nombreux rameaux terminaux et collatéraux

PARCE QUE

Lors de sa descente dans le petit bassin, elle donne une collatérale pour l'uretère, pour le bas du vagin et le col ainsi que pour la vessie, la trompe et l'ovaire

QCM 7 :

Les cancers de l'ovaire droit peuvent rapidement donner des métastases intra-péritonéales avec ascite ainsi qu'un envahissement du hile rénal homolatéral

PARCE QUE

L'ovaire est intra-péritonéal et non péritonisé et se draine à gauche via la veine gonadique dans la veine rénale homolatérale

QCM 8 : A propos de la filière urinaire du petit bassin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) La vessie est un organe musculaire et sous-péritonéal à fonction de réservoir
- B) Le détrusor forme la tunique moyenne de la vessie et est sous influence orthosympathique
- C) Le trigone vésical se situe à la face antéro-supérieure de la vessie
- D) La muqueuse normale de la petite fille est rosée et aréolée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 :

Le canal anal présente des plis transversaux

PARCE QUE

L'ampoule rectale est entièrement péritonisé

QCM 10 :

L'ampoule rectale se draine vers les nœuds lymphatiques sacrés, iliaques externes et iliaques internes

PARCE QUE

Le canal anal se draine vers les nœuds lymphatiques inguinaux

QCM 11 : A propos du petit bassin de la femme, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La partie postérieure du périnée cutané est innervée par le nerf rectal inférieur (S4)
- B) Le muscle *levator ani* forme un entonnoir à sommet supérieur, centré sur l'anus et fendu en avant par la fente urogénitale
- C) Le faisceau pubo-génital du muscle pubo-coccygien s'insère sur les organes génitaux, mais pas sur le noyau fibreux central du périnée
- D) Les muscles du diaphragme pelvien sont dans un plan oblique : ils sont dirigés vers le bas et le dehors
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : A propos des nerfs du petit bassin, on peut dire que :

- A) Le nerf sciatique correspond à la réunion du tronc lombo-sacré et du plexus sacré
- B) Le nerf pudendal assure uniquement l'innervation sensitive du périnée
- C) Le nerf obturateur passe dans le canal sous-pyramidal
- D) Le nerf tibial n'est pas issu du nerf sciatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 :

Le muscle coccygien s'insère sur l'ischion latéralement, et sur le coccyx et le sacrum médialement

PARCE QUE

Les muscles du diaphragme pelvien sont uniquement innervés par le nerf pudendal

QCM 14 : A propos du muscle *levator ani*, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Ce muscle forme un cône à sommet inférieur, centré sur le vagin et fendu en arrière par l'anus
- B) Il est composé de deux muscles ; dont l'un d'eux peut lui-même être décomposé en deux faisceaux musculaires C) Sa principale fonction est la continence anale
- D) Lors de la contraction du muscle *levator ani*, l'angulation du cap anal diminue
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 :

La ligne de réflexion médiale du ligament large de l'utérus est trifoliée

PARCE QUE

Il existe un aileron postérieur sous-tendu par le ligament rond, un aileron supérieur sous-tendu par le ligament utéro-ovarien et un aileron antérieur sous-tendu par l'oviducte