



Coucou les copains, on se retrouve pour un petit DM surprise de cas cliniques ! Les profs aiment bien ce genre de QCMs et je pense que vous aussi, donc cadeau <3 Amusez-vous bien !

QCM 1 : Monsieur R. est atteint de diabète de type II, une pathologie affectant notamment les reins. Il est également atteint d'hypertension artérielle. Vous êtes son médecin :

- A) Pour son hypertension, il faut lui prescrire un antihypertenseur type IEC (Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion)
- B) Le patient ayant mal à la tête, vous lui prescrivez du paracétamol
- C) Le patient ayant mal à la tête, vous lui prescrivez de l'aspirine
- D) Le patient risque une toxicité cumulée si vous lui prescrivez des AINS
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : Madame H. est atteinte d'un cancer du poumon après des années de tabagisme. Vous pouvez lui prescrire différents types de traitement :

- A) Si vous lui prescrivez un morphinique pour apaiser sa douleur, on peut considérer qu'il s'agit d'un traitement symptomatique
- B) Si vous lui prescrivez un morphinique pour apaiser sa douleur, on peut considérer qu'il s'agit d'un traitement palliatif
- C) Si vous lui prescrivez de la chirurgie pour enlever l'intégralité de sa tumeur, il s'agit d'un traitement préventif
- D) Si vous lui prescrivez de la chimiothérapie post-exérèse du cancer, il s'agit d'un traitement de rémission
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : Monsieur J. est atteint d'hypertension artérielle ainsi que de fibrillation auriculaire. Vous êtes son cardiologue, en consultation avec lui :

- A) Vous lui expliquez qu'il a de fortes chances de faire une embolie type AVC sans traitement
- B) Vous lui expliquez qu'il a de fortes chances de faire une hémorragie majeure sans traitement
- C) Vous lui prescrivez un bradycardisant comme traitement d'attaque et un antiarythmique (amiodarone) d'entretien
- D) Vous devez absolument faire son éducation thérapeutique, ses anti-hypertenseurs ayant des effets secondaires alors qu'il ne se sent pas malade (l'hypertension est plus ou moins asymptomatique) il risque de les arrêter
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : Madame F. souffre d'une angine bactérienne. Elle a très mal à la gorge et beaucoup de fièvre. Vous êtes son médecin :

- A) Le traitement symptomatique sera un antibiotique pour guérir l'infection et faire disparaître les symptômes
- B) Un antipyrétique consiste à faire tomber la fièvre, c'est un traitement étiologique dans ce cas précis
- C) Les antibiotiques sont susceptibles de lui causer des troubles digestifs, vous l'avertissez qu'elle devra tout de même continuer son traitement
- D) La patiente aura besoin d'un traitement d'entretien type aspirine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : Monsieur G est un patient atteint du cancer du côlon. Vous êtes son oncologue :

- A) Le traitement curatif est l'ablation de la moitié du côlon (suivra l'apposition d'une poche à peau), il va falloir le faire malgré les grosses réticences du patient
- B) Le stade étant tardif avec de nombreuses métastases, vous décidez qu'il faut se dépêcher de pratiquer la chirurgie
- C) Au contraire, vous renoncez à la chirurgie car ça ne vaut malheureusement plus le coup
- D) Le contexte pathologique passe avant la volonté du patient
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : Madame X. souffrant d'hypertension artérielle et de dépression légère, elle a besoin de votre aide. Quand vous l'interrogez sur ses habitudes, elle vous apprend consommer du jus de pamplemousse chaque matin et qu'elle prend une pilule contraceptive.

- A) Vous lui prescrivez des statines contre l'hypertension et un antidépresseur type Sartraline
- B) Vous lui prescrivez des statines contre l'hypertension et un antidépresseur type Millepertuis
- C) Le pamplemousse va interagir avec les statines, vous lui conseillez d'arrêter d'en consommer
- D) Le pamplemousse va interagir avec les antidépresseurs, vous lui conseillez d'arrêter d'en consommer
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : Monsieur K. est âgé de 64 ans. Il a besoin d'un traitement anti-coagulant suite à de nombreux événements thrombo-emboliques. Vous le conseillez :

- A) Étant âgé de plus de 60 ans, il lui faut des AOD car c'est le critère principal
- B) Le patient ayant déjà plusieurs fois pris en double ses traitements par erreur, il vaut mieux lui prescrire des AVK car on possède un antidote contrairement aux AOD : la vitamine K
- C) Si vous lui prescrivez de la warfarine, il devra éviter le millepertuis sous peine de risque hémorragique
- D) Les AVK sont en revanche beaucoup plus chers que les AOD
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Madame U. est suivie pour insuffisance cardiaque évoluée. Elle prend également des statines.

- A) Elle devra éviter les oranges amères ou elle risquera une rhabdomyolyse
- B) Les oranges amères sont des inducteurs enzymatiques qui augmentent l'efficacité des statines
- C) De même, son traitement pour l'IC évoluée est l'Ivabradine, il risque d'être surdosé
- D) Parmi les statines, on compte l'atorvastatine et la simvastatine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : Monsieur Z., âgé de 97 ans, est atteint d'un cancer de la prostate. Il souffre également d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque et de diabète. Vous vous occupez de son cancer :

- A) Vous décidez de pratiquer une chirurgie ablative de la prostate (traitement curatif)
- B) Vous décidez de lui administrer un traitement palliatif pour rendre ses derniers mois plus doux à vivre sans pratiquer la chirurgie ablative
- C) Le patient doit prendre des anti-hypertenseurs, qui constituent un traitement curatif
- D) Le patient doit prendre des anti-hypertenseurs, qui constituent un traitement préventif
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : Madame T. est atteinte de Polyarthrite Rhumatoïde. Concernant son traitement :

- A) Elle a probablement un traitement curatif pour traiter sa pathologie
- B) Elle a probablement un traitement palliatif pour limiter la gravité de la maladie
- C) Elle a probablement un traitement limitatif de progression pour limiter la gravité de la maladie
- D) Son traitement doit avant tout stabiliser la pathologie et lui apporter du confort
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses