

Modifications Physiologiques de la Grossesse

Surveillances pendant la grossesse

Tutorat 2021-2022 : 13 QCMS – Durée : 13min



QCM 1 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Il y a en moyenne 7 consultations
- B) À partir de 41 SA, si la patiente n'a pas accouché, on la surveille toutes les 4h
- C) Le suivi de grossesse peut être fait par une sage-femme, gynécologue-obstétricien ou médecin traitant habitué et formé au suivi de grossesse
- D) Une grossesse dure 9 mois soit 39 SG = 41 SA
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) La consultation anesthésique n'est pas obligatoire
- B) La grossesse doit être surmédicalisée pour bien suivre le déroulé
- C) Dans les urines, nous vérifions le sucre et l'albumine
- D) Parmi les signes cliniques ou plaintes des patientes, nous pouvons retrouver : nausées, vomissements, RGO, vertiges, douleurs, ... (liste non exhaustive)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) La prise de poids est à surveiller
- B) Tous les sujets sont à aborder dès la première consultation
- C) La consultation anesthésique est notamment utile si la patiente veut une péridurale ou s'il y aura une césarienne
- D) L'échographie du T1, à environ 12 SA, consiste surtout à dater la grossesse, dénombrer les embryons mais aussi mesurer la clarté nucale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) À partir de 41 SA, si la patiente n'a pas accouché, on la surveille toutes les 48h
- B) Au cours d'une consultation, nous pouvons demander si certains antécédents peuvent avoir un impact comme des traumatismes, violences ou encore deuils compliqués
- C) Pour l'échographie du T3, les biométries sont refaites afin de surveiller le développement du fœtus
- D) Il y a autant d'échographies que de consultations de suivi de grossesse physiologique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les sérologies pour le HIV et l'hépatite C sont recommandées
- B) Pour l'échographie du T3, on vérifie les biométries et le placenta
- C) Pour être sûr que la patiente est bien immunisée pour la toxoplasmose et la rubéole, il faut 2 sérologies négatives
- D) La consultation anesthésique est prévue vers 7-8 mois de grossesse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) En signes cliniques obstétricaux, nous retrouvons : mouvements actifs fœtaux, contractions utérines, métrorragies, leucorrhées
- B) Le bien-être psychologique de la femme enceinte n'a pas vraiment d'importance
- C) Du sucre et de l'albumine dans les urines en grande quantité, c'est physio !
- D) Si les sérologies pour la toxoplasmose sont négatives, on la refera tous les mois jusqu'à un mois après l'accouchement
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les résultats des sérologies permettent de mettre en place des conduites à tenir pour la suite de la grossesse
- B) La tension artérielle doit être inférieure ou égale à 13/9
- C) Pendant la grossesse, on surveille juste le développement du fœtus
- D) Pour l'échographie du T3, on vérifie le nombre de fœtus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Il y a 3 échographies à faire pendant une grossesse physiologique soit une par mois
- B) La mesure de la clarté nucale vers 12 SA représente l'épaisseur du cou postérieur et participe au dépistage de la trisomie 21
- C) L'échographie du T2, à environ 22 SA, est l'échographie morphologique où on va regarder les organes, les malformations potentielles
- D) À T3, l'échographie se fait aux environs de 32 SA
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les femmes enceintes ont besoin d'être écoutées, elles ont des questions et inquiétudes
- B) C'est important de ne pas oublier le conjoint
- C) Il est intéressant de faire une échographie par mois pour une grossesse physiologique
- D) L'échographie de T3 permet de dépister les facteurs de risque d'hémorragie de la délivrance
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'échographie du T1, à environ 32 SA, consiste surtout à dater la grossesse, dénombrer les embryons mais aussi vérifier la situation du placenta
- B) Au cours de l'échographie du T2, à environ 22 SA, on regarde les biométries, morphologies, doppler mais aussi le placenta et le col utérin
- C) Si les sérologies pour la rubéole sont négatives, on la refera tous les mois jusqu'au 4^{ème} mois de grossesse
- D) Au cours de la grossesse, on effectue 2 déterminations pour le groupe sanguin, rhésus et RAI à l'EFS
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le dépistage du diabète gestationnel se fait chez les patientes à risque
- B) Les facteurs de risque de développer un diabète gestationnel sont : avoir 35 ans ou plus ou un IMC supérieur à 25 (liste non exhaustive)
- C) Le prélèvement vaginal sert à détecter la présence de Streptocoque B
- D) Le dépistage de la trisomie 21 peut se faire au T1 ou T2
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Il existe 2 supplémentations officiellement recommandées : les folates et la vitamine D
- B) Le dépistage de la trisomie 21 nous donne une probabilité afin d'adapter la prise en charge
- C) Les folates sont à prendre 4 semaines avant la grossesse et jusqu'à 8 SG
- D) Les folates préviennent la non-fermeture du tube neural
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : À propos de la surveillance pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les doses de supplémentation en folates ne sont pas les mêmes en fonction des patientes
- B) Nous supplémentons en vitamine D systématiquement au 6^{ème} mois de grossesse
- C) Il n'y a pas de recommandations en France pour les vitamines de grossesse à prendre en systématique
- D) Supplémenter systématiquement en fer possède un grand intérêt, la mère peut faire un max de réserve
- E) Mais non ! Tant que la mère n'a pas consommé ses réserves en fer, son corps n'en absorbera pas plus