

# DM 3ème mois à la délivrance : Embryologie

Tutorat 2022-2023 : 9 QCMS – Durée : 9min



## **QCM 1 : A propos de la période fœtale, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) En gynécologie, la grossesse est datée en semaine de développement
- B) Lorsque la grossesse est datée en semaine de développement, on compte à partir de la fécondation
- C) La période fœtale s'étend du 2<sup>ème</sup> mois jusqu'à la fin de la vie intra-utérine
- D) Elle se caractérise notamment par la croissance et la maturation du placenta
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

## **QCM 2 : A propos de la croissance de la tête fœtale, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Au cours de la période fœtale, elle est plus rapide que celle du corps
- B) La tête représente 1/4 de la longueur du fœtus au 5<sup>ème</sup> mois
- C) La tête représente 1/2 de la longueur fœtale au 3<sup>ème</sup> mois
- D) A la naissance le crâne est la partie du corps qui présente le plus grand diamètre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

## **QCM 3 : A propos de la période fœtale, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) En début de période fœtale, le fœtus croît rapidement en longueur
- B) Le poids augmente surtout en fin de période fœtale
- C) A la radiographie, il est important de mesurer la longueur cranio-caudale afin de déterminer l'âge du fœtus
- D) La longueur cranio-caudale est aussi appelée longueur vertex-coccyx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

## **QCM 4 : A propos du 3ème mois de développement, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les yeux et les oreilles ne sont pas encore dans leur position définitive
- B) Le diagnostic du sexe est possible à l'échographie
- C) Les membres supérieurs sont un peu plus courts que les membres inférieurs
- D) Les mouvements du fœtus sont perceptibles par la mère
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

## **QCM 5 : A propos des yeux, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Au cours du développement précoce, la membrane pupillaire délimite l'arrière de la chambre postérieure
- B) Les chambres antérieure et postérieure sont notamment séparées l'une de l'autre par l'iris
- C) Plus tard, la membrane pupillaire régressera permettant une communication entre les 2 chambres via la pupille
- D) Les paupières s'ouvrent au 7<sup>ème</sup> mois de développement
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

## **QCM 6 : A propos du développement fœtal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le vernix caseosa est une substance bleutée et grasseuse jouant un rôle anti-infectieux
- B) La peau commence à se recouvrir de cette substance vers la fin du 5<sup>ème</sup> mois
- C) Le lanugo est un duvet très épais qui recouvre la tête puis tout le corps
- D) Le lanugo et le vernix caseosa régresseront avant la naissance
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

## **QCM 7 : A propos du nouveau-né, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Il pèse en moyenne 5kg
- B) Il mesure 33cm environ
- C) Son crâne est déformable
- D) La tête représente 1/4 de la longueur du fœtus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

## **QCM 8 : A propos du 6ème mois, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Durant ce mois-ci, la membrane pupillaire régresse
- B) La peau du fœtus est mince, ridée et rougeâtre
- C) Ceci est dû à l'abondance en tissus conjonctifs et adipeux sous cutanés
- D) L'appareil respiratoire est encore immature
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : A propos de la hernie ombilicale, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Au début du 3<sup>ème</sup> mois, on peut encore apercevoir la hernie ombilicale
- B) Elle se situe en région dorsale du fœtus
- C) Cette hernie est physiologique et est due à la présence des anses intestinales
- D) Elle commencera à disparaître à partir du 6<sup>ème</sup> mois
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses