

DM n°2 : Appareil génital masculin (cours présentiel)

part.2



Tutorat 2022-2023 : 14 QCMS – Durée : 14 min

QCM 1 : A propos des parois du canal inguinal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La paroi inférieure est le ligament inguinal, qui s'étend de l'EIAS au pubis
- B) La paroi supérieure est formée par les aponévroses des muscles oblique interne et transverse qui s'unissent pour former le tendon conjoint/ faux inguinale
- C) La paroi postérieure est formée par le fascia transversalis et le péritoine pariétal
- D) La paroi antérieure est formée par l'aponévrose de l'oblique externe
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos des testicules et du canal inguinal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La cryptorchidie correspond à l'hypertrophie d'un seul ou des deux testicules
- B) La bandelette ilio-pectinée limite la lacune musculaire de la lacune vasculaire
- C) La lacune vasculaire est constituée de l'artère fémorale en dehors, provenant de l'artère iliaque externe, et de la veine fémorale en dedans, qui se jette dans la veine iliaque externe
- D) L'artère épigastrique limite en dedans l'OIS
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos du cordon spermatique, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cordon spermatique est centré par le conduit déférent
- B) Le cordon spermatique contient l'artère testiculaire qui provient de l'aorte
- C) Les veines testiculaires droites se drainent dans la veine rénale droite
- D) Les veines testiculaires gauches se drainent dans la veine cave inférieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos du cordon spermatique, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cordon spermatique contient l'artère vésiculo-déférentielle et l'artère funiculaire
- B) Le cordon spermatique contient les fascias crémasteriques externes et internes
- C) Le cordon spermatique contient le ligament de Cloquet, qui correspond à la portion de péritoine qui a été emportée par le testicule lors de sa descente
- D) Physiologiquement, le canal péritonéo-vaginal est fermé à la naissance, mais il peut arriver qu'il reste ouvert lorsque le ligament de Cloquet ne se bouche pas lors d'une hernie congénitale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos des muscles crémasters, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les muscles crémasters sont issus des fibres musculaires de l'oblique externe
- B) Ces muscles permettent de réguler la température de la prostate et des vésicules séminales
- C) Contrairement au reste du corps, les testicules doivent rester bien au chaud à une température supérieure à 37°C
- D) Les jeans trop serrés peuvent provoquer des anomalies de la spermatogénèse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos de la prostate, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate est une glande
- B) Elle se situe au niveau de la partie inférieure de la vessie et à la face postérieure du rectum
- C) Elle possède la forme et la consistance d'une noisette
- D) Elle possède un sillon séminal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos de la prostate, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sillon médian de la prostate la sépare en lobes supérieur et inférieur
- B) Ce sillon est palpable lors du toucher rectal
- C) La prostate est perforée par les canaux éjaculateurs au niveau de sa face postérieure
- D) Les uretères ne croisent pas les canaux déférents
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos de la prostate, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Comme le pancréas, la prostate est un carrefour à 3 voies ce qui explique que les maladies de la prostate vont entraîner des complications urinaires et les maladies urinaires vont entraîner des complications prostatiques
- B) L'isthme se situe en avant de l'urètre prostatique tandis que le bec se situe à la partie inférieure de la prostate
- C) La prostate crâniale se situe au contact de l'urètre
- D) La prostate caudale est séparée de la prostate crâniale par les canaux éjaculateurs
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos de l'hypertrophie bénigne de la prostate, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La rapidité d'installation des symptômes vésico-urinaires est expliquée par le fait que l'adénome de la prostate touche la partie de la prostate qui est directement au contact de l'urètre, c'est-à-dire la prostate crâniale
- B) L'adénome donne des symptômes obstructifs : mictions douloureuses, fréquentes et faibles
- C) L'adénome donne des symptômes irritatifs : dilatation vésicale et apparition de diverticules
- D) Ces symptômes vésico-urinaires peuvent aller jusqu'au blocage complet des voies urinaires : c'est ce qu'on appelle la rétention urinaire aigue, qui se manifeste par un globe vésical
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos du globe vésical, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Lors d'un globe vésical, la vessie monte jusqu'au nombril
- B) Le globe vésical donne une matité à la percussion
- C) Il est alors nécessaire de réaliser un drainage sus-pubien
- D) Afin de réaliser le drainage, il faut dans un premier temps verticaliser le pénis puis tirer dessus afin d'effacer l'angle entre l'urètre prostatique et l'urètre membraneux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos du cancer de la prostate, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cancer de la prostate touche chaque année 30 000 nouveaux patients
- B) Le cancer de la prostate comporte des facteurs de risques génétiques mais aussi environnementaux
- C) La poussée de ce cancer est progressive, la rendant encore plus douloureuse
- D) Le cancer de la prostate peut être comparé à l'adénome de la prostate car ce dernier peut cancériser
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : A propos des pathologies de la prostate, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cancer de la prostate donne un aspect de caillou au toucher rectal, tandis que les adénomes donnent un effacement du sillon médian
- B) La prévention du cancer de la prostate se fait à partir de 50 ans
- C) La diminution du PSA précède l'apparition de nodule palpable
- D) Le dosage du PSA se fait par analyse urinaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : A propos du toucher rectal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le toucher rectal peut se faire jusqu'à 8 cm de profondeur
- B) Une prostate physiologique pèse 40g
- C) Selon la profondeur du cul-de-sac de Douglas, le toucher rectal peut permettre de sentir le fascia prostato-péritonéal de Denonvilliers
- D) Les vésicules séminales sont parfois palpables
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : A propos du toucher rectal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Même en prenant des précautions, il est normal que le toucher rectal soit douloureux
- B) Lorsque l'on réalise un toucher rectal, il est important d'expliquer au patient ce que l'on fait
- C) Le stade T1 du cancer est un stade où l'on constate une élévation du PSA malgré un toucher rectal normal, car le PSA est un marqueur très sensible
- D) Le taux normal de PSA se situe autour de 5 ng/mL
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses