

En faisant les annales pour les LAS 1 j'ai découvert des nouveaux QCM qui sont aussi à votre programme, maintenant vous avez tous les QCM d'annales sur AGF à votre disposition. Comme d'hab les items en gris sont HP, des bisous <3

QCM 1 : À propos de la statique pelvienne de la femme, on peut dire que : la fausse

- A) La vessie constitue l'élément fondamental central de la statique pelvienne
- B) Le vagin repose le noyau fibreux central du périnée et sur le rectum
- C) Le col de l'utérus s'appuie sur la paroi postérieure du vagin
- D) Le vagin est soutenu par le faisceau pubo-coccygien du muscle levator ani
- E) Le vieillissement et les traumatismes obstétricaux favorisent les prolapsus

QCM 2 : Sur une coupe sagittale médiane du petit bassin chez la femme on peut voir :

- A) le cap anal entre l'ampoule rectale et le canal anal
- B) que l'ampoule du rectum suit la concavité du sacrum
- C) que le noyau fibreux central du périnée est entre le vagin et le canal anal
- D) que le vagin est dirigé en haut et en avant
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos du périnée musculaire on peut dire que :

- A) la contraction du muscle ischio-caverneux favorise la intumescence du clitoris
- B) le muscle constricteur de la vulve est le muscle de l'hymen
- C) le muscle constricteur de la vulve disparaît après le premier coït complet
- D) le muscle transverse profond s'insère sur le sphincter strié de la vessie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : Parmi les muscles du périnée, nous pouvons citer :

- A) le muscle pubo-coccygien
- B) le muscle ilio-coccygien
- C) le muscle coccygien
- D) le muscle piriforme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : Parmi les muscles du périnée, nous pouvons citer :

- A) le muscle piriforme
- B) le muscle obturateur médial
- C) le muscle obturateur latéral
- D) le muscle transverse de l'abdomen
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos des muscles du périnée, on peut dire que :

- A) le muscle ischio-caverneux entoure le bulbe vestibulaire
- B) Le muscle constricteur de la vulve est déchiré après la première pénétration sexuelle du vagin
- C) le muscle transverse superficiel du périnée est tendu entre l'ischion et le genou du clitoris
- D) le muscle bulbo-spongieux entoure le corps caverneux du clitoris
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 :

Une section complète des racines de la queue de cheval au-dessous de la deuxième vertèbre lombale (lombaire) peut être compatible avec le respect de la sensibilité des grandes lèvres

PARCE QUE

L'innervation cutanée des grandes lèvres et du mont du pudendum (mont de Vénus ou mont du pubis) provient en grande partie des racines spinales L1 et L2

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 8 :

La miction normale nécessite l'intégrité de l'innervation végétative et somatique

PARCE QUE

La contraction du détrusor est parasympathique, la contraction du sphincter lisse de la vessie est orthosympathique et la contraction des sphincters striés de la vessie est sous la dépendance du nerf pudendal

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait est faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 9 : Parmi les myélomères qui reçoivent la sensibilité du périnée cutanée on peut citer les myélomères :

- A) L1
- B) L2
- C) S2
- D) S3
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses