



QCM 1 : À propos des reins, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le sommet du rein gauche se projette au niveau de la moitié du corps vertébral de T11, tandis que le bord inférieur se projette au niveau du disque intervertébral de L2 et L3
- B) Le rein droit se projette ½ vertèbre plus haut que le rein gauche
- C) La loi de Luschka "dit" que l'uretère droit croise l'artère iliaque externe droite tandis que l'uretère gauche croise l'artère iliaque primitive gauche
- D) La glande surrénale droite a la forme d'un triangle, son sommet est caché par la veine cave inférieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos des glandes surrénales, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) La glande surrénale gauche a la forme d'une goutte d'eau
- B) La surrénale possède deux parties : une centrale la médullo-surrénale et un périphérique la cortico-surrénale
- C) Le phéochromocytome est un cancer de la cortico-surrénale qui entraîne des poussées hypertensives
- D) La médullo-surrénale sécrète les catécholamines : à savoir adrénaline et noradrénaline lors d'un moment de détente absolue
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) La médullo-surrénale est composée de plusieurs couches : réticulée, fasciculée et glomérulée
- B) La couche glomérulaire de la cortico-surrénale produit de l'aldostérone
- C) La couche fasciculée produit des glucocorticoïdes à l'origine du syndrome de Conn
- D) Une tumeur de la couche réticulée de la cortico-surrénale entraîne une hypersécrétion d'androstérone
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le corps spongieux donne le gland du pénis et les corps caverneux donnent la structure du corps du pénis
- B) La fossette naviculaire de l'extrémité du pénis peut venir bloquer une sonde urinaire
- C) Il est important de décalotter le prépuce d'un jeune homme dans un bain chaud pour aider au décalottage et éviter une nécrose au gland
- D) Le paraphimosis est une pathologie traumatique du corps du pénis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) La troisième portion de l'urètre masculin est mobile, c'est l'urètre pénien
- B) Le sphincter strié de l'urètre entoure la base de la prostate
- C) La première portion des voies spermatiques est intra-funiculaire, c'est cette portion qu'on ligature lors d'une vasectomie
- D) La portion pariétale/pelvienne du conduit déférent longe la paroi du pubis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) La portion intra-funiculaire traverse le canal inguinal, qui est un point de faiblesse de la paroi abdominale
- B) La portion intra-funiculaire du conduit déférent mène à la portion intra-prostatique, lieu de formation des canaux éjaculateurs
- C) Le testicule est surmonté par l'épididyme, qui a la forme d'un cimier de casque
- D) L'épididyme possède une tête, un corps et une queue, cette queue forme l'anse épидидymo-déférentielle qui vient se plaquer contre la face latérale du testicule et se poursuivre par le conduit déférent
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) À la naissance, les sage-femmes doivent s'assurer de l'absence de cryptorchidie chez le nouveau-né
- B) Une hydrocèle testiculaire, est un épanchement liquidien dans la paroi testiculaire, à la suite d'une infection testiculaire
- C) La prostate est une glande située sous la vessie qui a la forme, la taille et la consistance d'une noisette
- D) Le sillon médian sagittale est situé entre les deux lobes de la prostate
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos de l'appareil urinaire, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le trigone vaginal est le triangle formé sur la face postérieure de la vessie entre les abouchements des deux uretères et de l'urètre
- B) La vessie peut atteindre la xyphoïde lorsqu'elle est remplie, c'est ce que l'on appelle un globe vésical
- C) La vessie se trouvant dans l'étage antérieur du petit bassin, les fractures en livre ouvert du bassin peuvent entraîner une perforation de la vessie
- D) Le conduit déférent passe en-dessous de l'uretère pour rejoindre les ampoules vésicales et former in fine les canaux éjaculateurs qui vont s'aboucher dans l'urètre prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) L'urètre membraneux forme un coude avant de devenir l'urètre pénien
- B) Le sillon séminal transverse est en arrière des vésicules séminales
- C) L'adénome prostatique concerne la prostate crâniale, ou centrale, et peut entraîner des problèmes urinaires en comprimant l'urètre prostatique et la vessie
- D) Le sphincter strié de l'urètre entoure le bec de la prostate
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) La prostate caudale, ou périphérique, est sensible à la testostérone et peut former un cancer prostatique situé le plus souvent au niveau des lobes prostatiques
- B) La prostate crâniale, ou centrale, est sensible aux œstrogènes et lorsqu'elle s'hypertrophie elle pourra former un adénome prostatique
- C) Si lors d'un toucher rectal, une partie de la prostate semble squirrheuse, on doit suspecter un adénome prostatique
- D) L'utricule prostatique est une invagination de l'urètre prostatique et également un résidu des canaux de Wolff
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) L'érection est un phénomène majoritairement ortho-sympathique
- B) L'éjaculation est un phénomène majoritairement para-sympathique
- C) Si l'adénome prostatique est trop important et empêche un sondage par voie urétrale, on peut faire un cathétérisme sus-pubien
- D) Les glandes bulbo-urétrales sont situées sous la prostate au niveau du bulbe spongieux du corps spongieux du pénis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos de l'appareil urinaire, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) L'uretère gauche croise la veine iliaque primitive tandis que l'uretère droit croise la veine iliaque externe
- B) C'est la portion lombaire des uretères qui croise l'axe artériel
- C) L'asymétrie rénale est physiologique, elle est d'une hauteur d'une vertèbre et demie
- D) L'axe rénal est concave
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) L'épine iliaque antéro-supérieure se trouve sur le bord postérieur de l'os coxal
- B) L'acétabulum est le moyeu de l'hélice représentée par l'os coxal
- C) Le bassin est composé de trois os : les deux os coxaux et la symphyse pubienne
- D) La branche ischio-pubienne de l'os coxal est au-dessus du foramen obturé
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le sacrum est le résultat de la fusion de cinq vertèbres sacrées
- B) Les crêtes synostotiques se situent en regard des foramen sacrés dorsaux
- C) Le sacrum a une forme spécifique : elle a une double concavité (transversale et sagittale)
- D) La grande incisure ischiatique se situe au-dessus de l'épine ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) L'articulation sacro-iliaque relie le sacrum et l'épine ischiatique
- B) L'articulation sacro-tubéral relie le sacrum et la tubérosité ischiatique
- C) La symphyse pubienne reste toujours rigide ce qui est responsable des difficultés lors de l'accouchement de la femme
- D) L'articulation sacro-épineuse relie la face antéro-latérale du sacrum et la face médiale de la tubérosité ischiatique

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 16 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le cintre cervico-obturateur est l'alignement entre le bord supérieur du col du fémur et le bord inférieur du trou obturateur
- B) À cause du foie, le rein gauche se trouve plus bas que le rein droit
- C) Le bassinnet se prolonge par l'uretère, puis par la vessie et enfin l'urètre
- D) L'aorte abdominale bifurque en artères iliaques droite et gauche au niveau de L4
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le bord antérieur du losange périnéal est la symphyse pubienne
- B) Le triangle antérieur du losange périnéal représente le périnée anal
- C) Le triangle postérieur du losange périnéal représente le périnée génital
- D) Les grandes lèvres sont unies en avant et en arrière par les commissures labiales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le prépuce clitoridien, ou capuchon, est retenu en arrière par le frein du clitoris
- B) Les petites lèvres sont des replis cutanés en forme de losange qui entourent le hiatus génital
- C) Le périnée est l'ensemble des parties molles situées en dessous du plancher pelvien
- D) Le plancher pelvien est perforé de 3 émonctoires chez l'homme et de 2 émonctoires chez la femme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le scrotum se trouve en avant de l'anus et au niveau de la base du pénis
- B) Le fascia inférieur du diaphragme pelvien laisse passer le hiatus infra-pubien
- C) L'anus est lié au sacrum par le ligament ano-coccygien
- D) La graisse située autour de l'anus et sous les muscles grand fessiers sont propices aux infections anales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 20 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Les glandes urétrales de Skene sont les seules à sécréter un liquide au moment des rapports sexuel pour lubrifier l'appareil génital féminin
- B) Le pénis est structuré de la même manière que le clitoris de la femme
- C) Le hiatus infra pubien laisse passer la veine dorsale du clitoris
- D) Le noyau fibreux central du périnée vient renforcer en arrière le fascia inférieur du diaphragme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 21 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le muscle transverse superficiel du périnée relie le noyau fibreux central du périnée et les faces médiales de la branche ilio-pubienne de l'os coxal
- B) La membrane uro-génitale se trouve au-dessus du diaphragme pelvien
- C) Les piliers du clitoris fusionnent en avant pour former le corps et le gland du clitoris
- D) Le muscle ischio-caverneux s'insère sur la face médiale de la branche ischio-pubienne de l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 22 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Sur le plan du fascia inférieur du diaphragme pelvien, on peut voir le hiatus infra-pubien
- B) Les muscles en cornet s'unissent sur la ligne médiane en passant en avant de la veine du clitoris pour empêcher le retour veineux lors de l'érection clitoridienne
- C) Les deux suppuration périnéales possible chez la femme sont : une suppuration anale au niveau du triangle postérieur ou une suppuration génitale (bartholinite) au niveau du triangle antérieur
- D) Le muscle transverse profond se trouve au niveau du fascia inférieur du diaphragme pelvien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 23 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) La glande de Bartholin se jette sur le 1/3 postérieur du vagin ; elles peuvent s'infecter et donner une bartholinite
- B) La membrane périnéale est reliée au muscle transverse superficiel du périnée
- C) Les corps caverneux du pénis sont recouverts des muscles ischio-caverneux qui réduisent le débit de retour veineux, ce qui permet l'érection
- D) Le muscle uréthro-vaginal peut provoquer des spasmes vaginaux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le muscle sphincter strié de l'urètre permet l'incontinence
- B) Le muscle compresseur de l'urètre se trouve au-dessus du fascia inférieur du diaphragme pelvien
- C) Les racines du nerf sciatique sont L4, L5, S1, S2 et S3
- D) Le nerf pudendal provient le plus souvent de S2, S3 et S4 ou S1, S2 et S3, puis passe par le canal pudendal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 25 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le nerf pudendal (S2, S3, S4) fait le tour de l'épine ischiatique avant de revenir dans le bassin via le canal pudendal d'Alcock pour aller innerver le périnée
- B) Le nerf pudendal devient nerf périnéal et vient innerver les corps érectiles chez l'homme et la femme
- C) Les artères pudendales internes proviennent de l'artère fémorale et permettent un afflux sanguin vers les organes génitaux
- D) Une adénopathie inguinale est très souvent visible lors de pathologie maligne du losange périnéal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 26 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) La moitié supérieure du sacrum est représentée par S1 et S2
- B) L'étage antérieure du petit bassin de la femme contient l'urètre et la vessie
- C) L'étage postérieure du petit bassin de la femme contient le vagin et l'utérus
- D) Le vagin a un angle de 65° par rapport à l'horizontale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 27 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) La crête sacrale médiane s'arrête en regard de S5
- B) La cystite est une infection vésicale très fréquente chez l'homme et moins fréquente chez la femme
- C) Le sommet de la paroi postérieure du vagin (le fornix) est plus haut que le sommet de la paroi antérieure
- D) Le récessus recto-utérin est le point le plus déclive de l'abdomen, il se trouve en avant du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 28 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) L'angle cervico-vaginal est l'angle qui se forme entre l'axe du col de l'utérus et l'axe du corps de l'utérus ; il est de 105° vers l'avant
- B) Le vagin forme un angle de 45° par rapport à l'horizontal
- C) Le récessus utéro-vésical est la portion de péritoine située à l'avant de la vessie et de l'utérus
- D) Le fascia vésico-urétéro-vaginal de Halban est une membrane située d'une part entre la vessie et le vagin et d'autre part entre le vagin et l'uretère
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 29 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Si on met un spéculum dans le vagin, on verra en premier sa face antérieure (due à son inclinaison naturelle vers l'arrière)
- B) La colonne antérieure du vagin bifurque vers le haut pour donner le trigone vaginal de Pawlick
- C) Quand on examine la paroi antérieure du vagin, on observe trois sillons spécifiques : le sillon cervico-vaginal, le sillon vésico-vaginal et le sillon infra-urétral
- D) Ces sillons sont des repères pour les ponctions médicales (abcès) : elles permettent d'éviter de former des fistules en faisant une fausse manœuvre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 30 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) On peut ponctionner un abcès du récessus recto-utérin par voie trans-vaginale en piquant au niveau du sillon péritonéal
- B) L'isthme de l'utérus est directement en-dessous du fond de l'utérus
- C) Le ligament utéro-ovarien relie le pôle inférieur de l'ovaire à l'isthme de l'utérus
- D) Le ligament sacro-utérin unit l'isthme utérin au sacrum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 31 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le sacrum est le résultat de la fusion des cinq dernières vertèbres sacrées donnant la forme d'une hélice
- B) Le moyeu de l'os coxal est représenté par l'acétabulum ; il est au contact du col du fémur
- C) La pôle supérieur de l'os coxal (ischion) est perpendiculaire par rapport à la pôle inférieure (ilium + pubis)
- D) On retrouve l'épine iliaque antéro-supérieure dans la continuité de la tubérosité ischiatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 32 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) L'orientation du trou obturateur dépend de la branche ischio-pubienne et de la branche ilio-pubienne de l'os coxal
- B) L'ilium et le pourtour du trou obturateur ne sont pas dans le même plan (ils sont parallèles)
- C) Le cintre cervico-obturateur est l'alignement entre le bord supérieur du trou obturateur et le bord inférieur du col du fémur
- D) Le centre de la tête fémorale est aligné avec le grand trochanter
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 33 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le ligament sacro-épineux va du bord antéro-latéral du sacrum jusqu'à l'épine sciatique
- B) Le ligament sacro-tubéral va du bord antéro-latéral du sacrum jusqu'à la face externe de la branche ischio-pubienne de l'os coxal
- C) Le bord antérieur de l'os coxal commence en regard de S2
- D) La moitié inférieure du sacrum correspond aux quatre dernières vertèbres sacrées
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 34 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Le fascia inférieur du diaphragme uro-génital laisse passer un petit espace (hiatus supra-pubien) pour le passage de la veine dorsale du pénis
- B) C'est dans le plan de la membrane génitale qu'on voit le muscle transverse superficiel du périnée
- C) Le bulbe spongieux du pénis entoure le hiatus uro-génital
- D) Le muscle ischio-caverneux s'insère sur les faces médiales de la branche ischio-pubienne et entoure les piliers des corps caverneux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 35 : À propos de la paroi du petit bassin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) C'est que dans le plan du fascia supérieur du diaphragme pelvien qu'on retrouve le hiatus uro-génital
- B) Le muscle uréthro-vaginal circonscrit l'urètre et le vagin au niveau du fascia supérieur du diaphragme pelvien
- C) Le sphincter strié de l'urètre est visible dans le plan de la membrane périnéale
- D) Le muscle transverse profond relie le noyau fibreux central du périnée et la partie médiale de la branche ischio-pubienne de l'os coxal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 36 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Un ulcère du mont de Vénus sera drainé par les ganglions lymphatiques situés autour des vaisseaux pudendaux externes
- B) Une mycose vaginale sera drainé par les ganglions lymphatiques situés autour des vaisseaux pudendaux internes
- C) On peut voir le sillon cervico-vaginal sur la paroi postérieure du vagin en rapport avec le col de l'utérus
- D) On peut voir le sillon infra-urétéral sur la paroi antérieure du vagin en rapport avec l'uretère terminal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 37 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Ils est inutile de palper les ganglions chez un patient souffrant d'un cancer des testicules
- B) Une varicocèle unilatérale peut être révélatrice d'un cancer du rein droit
- C) Le cancer des testicules est très peu lymphophile
- D) Les ganglions lymphatiques peuvent augmenter de volume à cause d'un afflux de cellules métastatiques et comprimer les vaisseaux adjacents entraînant une baisse du débit ou retour sanguin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 38 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Les artères génitales sont asymétriques tandis que les veines génitales sont symétriques
- B) La veine cave inférieure se trouve en avant de l'artère rénale gauche
- C) Une compression de la veine cave inférieure ne peut pas entraîner la formation d'une embolie pulmonaire
- D) L'embolie pulmonaire est un signe révélateur d'un cancer testiculaire surtout chez l'homme jeune
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 39 : À propos des glandes séminales, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) Elles se situent dans la paroi recto-prostatique
- B) Les glandes séminales sont des sac plicaturés sur eux-même qui accumulent le sperme entre les éjaculations
- C) Les glandes séminales sont en-dessous du péritoine et contenues dans la cavité péritonéale
- D) Les glandes séminales sont au-dessus du péritoine et non contenues dans la cavité péritonéale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 40 : À propos de l'appareil génital masculin, donnez-la ou les bonnes réponses :

- A) En vue périnéale, le scrotum recouvre partiellement le triangle génital
- B) Pour l'examen périnéal d'un patient masculin, seul un examen visuel est utile à la recherche de varicocèle, ...
- C) Le toucher rectal et la palpation testiculaire sont des examens optionnels après la palpation d'un ganglion inguinal chez un patient masculin
- D) Si vous effectué un toucher rectal il n'y a pas nécessité d'apprécier visuellement la zone du triangle anal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses