



**ANATOMIE**

**QCM 1 : Concernant les parois vasculaires du petit bassin, donnez les propositions vraies :**

- A) L'aorte et sa division en artères iliaques primitives sont latéralisés sur la droite du rachis
- B) Les artères iliaques primitives se divisent en regard de l'articulation sacro-iliaque
- C) A gauche, l'uretère passe en général par-dessus l'artère iliaque commune
- D) L'artère hypogastrique se divise rapidement en 2 troncs : antérieur et postérieur
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 2 : Concernant les parois nerveuses du petit bassin, donnez les propositions vraies :**

- A) Le plexus lombo-sacré est composé des rameaux antérieurs des nerfs spinaux provenant des myélomères de L4 à S3, et de leur anastomoses
- B) Le plexus hypogastrique supérieur reçoit des afférences de la part du plexus hypogastrique inférieur et des nerfs érecteurs d'Eckardt
- C) Le nerf sciatique (ou ischiatique) est uniquement formé des nerfs spinaux en provenance du tronc lombo-sacré
- D) Le nerf obturateur provient des myélomères S2, S3 et S4
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 3 : Concernant le périnée, donnez les propositions vraies :**

- A) Le périnée est l'ensemble des parties molles qui ferment en avant le petit bassin
- B) Le méat urinaire se situe en arrière du vestibule vaginal
- C) Les glandes urétrales, servant à la lubrification de la vulve, sécrètent la cyprine
- D) En anatomie modale, l'hymen reste totalement imperforé jusqu'au premier rapport sexuel
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

**QCM 4 : Concernant le périnée musculaire, donnez les propositions vraies :**

- A) Le muscle sphincter strié de l'anus est le seul muscle du périnée musculaire présent dans le triangle postérieur périnéal
- B) Les bulbes vestibulaires du clitoris sont entourés par les muscles bulbo-spongieux
- C) Muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux se réunissent en avant par un tendon commun
- D) Chez la femme, l'érection des corps érectiles est considérée comme imparfaite
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 5 : Concernant l'appareil urinaire, donnez les propositions vraies :**

- A) Lorsque la vessie est pleine, son pôle supérieur devient facilement accessible par une voie sus-pubienne
- B) Sur une vue frontale le trigone vésicale est à base inférieure
- C) Il existe au niveau de l'urètre une valve d'urothélium empêchant le reflux de l'urine vers la vessie
- D) L'innervation orthosympathique de la vessie permet la contraction du sphincter strié
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 6 : Concernant le vagin, donnez les propositions vraies :**

- A) Le cul de sac vaginal postérieur forme le lac spermatique
- B) En règle générale, la cavité vaginale est une cavité réelle
- C) Le trigone vésical se projette au niveau de la paroi antérieure du vagin
- D) Latéralement, le vagin se projette en regard de l'ischion
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 7 : Concernant l'utérus, donnez les propositions vraies :**

- A) Trompe, ligament rond et ligament utéro-ovarien s'insèrent sur le fond de l'utérus

- B) L'utérus est antéfléchi et antéversé
- C) Dans les cancers du col utérin, les cellules cancéreuses ne fixeront pas la coloration au lugol
- D) Le péritoine, constituant la tunique externe de l'utérus, recouvre totalement la surface de celui-ci
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 8** : L'utérus est antéfléchi

**CAR**

L'angle utéro-vaginal est ouvert de 90° en avant

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

**QCM 9** : Concernant le ligament large, donnez les propositions vraies :

- A) Le péritoine tapisse les faces latérales de la vessie
- B) Le péritoine tapisse les faces antérieure et postérieure, ainsi que le fond de l'utérus
- C) Le cul de sac de Douglas se développe à partir du septum recto-vaginal
- D) L'aileron supérieur du ligament large, ou mésovarium, est sous-tendu par le ligament utéro-ovarien
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 10** : Concernant le paramètre, donnez les propositions vraies :

- A) Il se trouve en regard de la partie non péritonisée de l'utérus
- B) Y chemine le plexus hypogastrique inférieur
- C) L'uretère y surcroise l'artère utérine
- D) De part et d'autre de la base du ligament large, la lame sacro-recto-génito-pubienne forme le tissu cellulo-fibreux du paramètre
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 11** : Concernant les moyens de fixité de l'utérus, donnez les propositions vraies :

- A) Le col utérin dispose d'une mobilité importante
- B) Le ligament large rattache l'utérus aux parois latérales du corps
- C) Le ligament large est une formation péritonéale très tendue, assurant une grande stabilité à l'utérus
- D) La lame sacro-recto-génito-pubienne, le vagin et le noyau fibreux central du périnée sont les éléments de fixité majeurs de l'utérus
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 12** : Concernant les annexes de l'utérus, donnez les propositions vraies :

- A) On décrit successivement aux trompes les parties intra-utérine, de l'ampoule, de l'isthme et du pavillon
- B) La frange ovarique couvre l'ovaire et capte l'œuf pondu
- C) L'ovaire a la forme d'une amande blanche
- D) Le mésovarium présente une ligne d'interruption à la surface de l'ovaire formant le hile ovarien
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 13** : Concernant les éléments de fixité de l'ovaire, donnez les propositions vraies :

- A) Le ligament utéro-ovarien est tendu du corps de l'utérus jusqu'à l'ovaire
- B) La veine ovarique droite se jette dans la veine rénale droite
- C) Le ligament tubo-ovarien relie l'ensemble de la trompe à l'ovaire
- D) Le ligament lombo-ovarien relie l'ovaire aux vertèbres L4 et L5
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 14** : Concernant la vascularisation des viscères pelviens, donnez les propositions vraies :

- A) L'artère utérine a un trajet godronné sur le bord latéral de l'utérus
- B) L'artère utérine se divise en 4 artères terminales en regard de la corne de l'utérus
- C) L'ovaire n'est vascularisée que par l'artère ovarique
- D) La vascularisation des organes pelviens génitaux et urinaires n'est jamais compromise
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM 15** : Concernant le drainage lymphatique des viscères pelviens, donnez les propositions vraies :

- A) A droite, l'ovaire se draine, entre autres, dans les nœuds lymphatiques rénaux
- B) Le principal drainage lymphatique de l'utérus se fait vers les chaînes iliaques internes et externes
- C) La partie basse du vagin se draine vers les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels
- D) La vessie se draine surtout vers les nœuds iliaques internes
- E) Aucune de ces réponses n'est correcte

**QCM16 : Concernant le rectum, donner les propositions vraies ;**

- A) Le rectum est la partie terminale de l'intestin grêle
- B) Le rectum est un réservoir de matières fécales
- C) La pathologie du rectum est dominée par les infections d'origine anale et les cancers
- D) Le rectum se situe à la suite du côlon sigmoïde
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

**QCM17 : Concernant la structure du rectum, donner les propositions vraies ;**

- A) Il présente une partie supérieure : le rectum périnéal
- B) Il présente une partie inférieure : le rectum pelvien
- C) Le rectum pelvien présente une dilatation appelée ampoule rectale
- D) Entre les 2 parties du rectum il existe une angulation de 110°, ouverte en arrière
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

**QCM18 : Le sphincter anal est un sphincter musculaire circulaire **CAR** il est sous le contrôle de la motricité volontaire**

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

**QCM19 : La muqueuse rectale est une muqueuse glandulaire digestive **CAR** Dans le plan frontal le rectum présente une 2<sup>ème</sup> courbure à concavité gauche**

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

**QCM20 : Concernant la muqueuse rectale, donner les propositions vraies ;**

- A) Les concavités rectales sont dues à la présence des plis rectaux
- B) Le pli rectal inférieur est aussi appelé le pli de Houston
- C) Les colonnes de Morgagni ont une concavité inférieure
- D) Les glandes d'Hermann et Desfosses se situent au fond des colonnes de Morgagni
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

**QCM21 : Lors d'une rectoscopie on ne voit pas à plus de 5 cm à l'intérieur du rectum **CAR** Il existe des plis rectaux qui soulèvent la muqueuse rectale**

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
  - B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
  - C) Le fait est juste et la raison est fausse
  - D) Le fait est faux et la raison est juste
  - E) Le fait et la raison sont tous deux faux
-

**QCM22 : Concernant la musculature rectale, donner les propositions vraies ;**

- A) La couche circulaire interne s'épaissit au niveau des colonnes de Morgagni
- B) Les fibres terminales de la couche longitudinale externe fixent le sphincter lisse de l'anus et les plexus hémorroïdaires à la peau
- C) Le muscle curvator cutis ani permet la modulation du bruit du pép
- D) En règle générale, les infections d'origine anales ont pour origine les glandes d'Hermann et Desfosses
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

**QCM23 : Concernant la vascularisation du rectum, donner les propositions vraies ;**

- A) L'artère rectale supérieure a pour origine l'artère mésentérique supérieure
- B) L'artère rectale inférieure a pour origine l'artère mésentérique inférieure
- C) L'artère rectale moyenne est une branche de l'artère iliaque interne
- D) La partie distale du rectum est entre autre irriguée par l'artère sacrée médiane
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

**QCM24 : L'artère rectale moyenne est inconstante **CAR** elle est une branche de l'artère iliaque externe**

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

**QCM25 : Le sang veineux du rectum va essentiellement se drainer dans la veine mésentérique supérieure **CAR** La veine rectale inférieure se draine vers le système cave**

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

**QCM26 : Une infection des organes génitaux externes telle que la syphilis peut se témoigner par une adénopathie du pli de l'aîne**

**CAR**

Les organes génitaux externes possèdent un drainage lymphatique qui va se faire vers les ganglions inguinaux superficiels

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

**QCM27 : Concernant le système d'angulation et de plicature de la région pelvienne, donner les propositions vraies**

- A) Entre le vagin et l'horizontal en position debout, il existe un angle de 60-65° ouvert en avant
- B) Le vagin présente un angle vaginal, ouvert de 135° en arrière
- C) Il existe un angle cervico-vaginal, entre le col et le vagin, ouvert de 90 à 110°
- D) Il existe une angulation utérine, d'environ 100 à 120°
- E) Toutes ces réponses sont inexactes

**QCM 28 : Concernant l'os coxal, donner les propositions vraies :**

---

- A) Il résulte de la fusion de 3 os
- B) Il a la forme d'une hélice de bateau à 2 pales
- C) La pale supérieure est formée du pubis et de l'ischion
- D) La face externe de la pale inférieure regarde en avant et en dehors
- E) toutes les réponses sont inexactes

**QCM 29 : Concernant le bord antérieur de l'os coxal, donner les propositions vraies :**

- A) De haut en bas on décrit en premier l'épine iliaque postéro-supérieur.
- B) La vallée du psoas fait partie du bord antérieur
- C) La petite échancrure ischiatique fait partie du bord antérieur
- D) L'épine iliaque antéro-supérieur est dans le même plan que la symphyse pubienne
- E) toutes les réponses sont inexactes

**QCM 30 :** La pyramide iliaque est une zone utilisée par les chirurgiens pour des prélèvements de tissus spongieux

**CAR**

C'est une zone où l'os coxal est très épais avec beaucoup de tissu spongieux.

- A) le fait et la raison sont tous deux justes et liés
- B) Le fait et la raison sont tous deux justes et non liés
- C) Le fait est juste et la raison est fausse
- D) Le fait est faux et la raison est juste
- E) Le fait et la raison sont tous deux faux

**QCM 31 : Concernant le sacrum, donner les propositions vraies**

- A) Par les trous sacrés pelviens passent les rameaux antérieurs des nerfs spinaux pelviens
- B) La crête sacrée interne est le vestige des processus épineux
- C) Le promontoire est défini comme le bord antérieur de S2
- D) La pente sacrée est le plan de lancement des courbures du rachis
- E) toutes les réponses sont inexactes

**QCM 32 : Concernant la ceinture pelvienne, donner les propositions vraies**

- A) Elle est formée en arrière et au milieu par le sacrum
- B) Elle est formée latéralement par les 2 os coxaux
- C) L'articulation entre l'os coxal et le sacrum se nomme l'articulation sacro-iliaque
- D) Le fémur fait partie de l'articulation sacro-iliaque
- E) toutes les réponses sont inexactes

**QCM 33 : Concernant l'étude synthétique de la ceinture pelvienne, donner les propositions vraies :**

- A) Le détroit supérieur est formé par la ligné arquée et le bord antérieur de S1
- B) La vessie se projette en regard du trou obturé
- C) Le col de l'utérus se projette au niveau de l'épine ischiatique
- D) Le rectum épouse la concavité sacrée
- E) toutes les propositions sont inexactes

**QCM34 : Concernant l'articulation du pubis, donner les vraies :**

- A) C'est une articulation de type symphyse
- B) Il existe un fibrocartilage d'interposition entre les deux surfaces articulaires
- C) Elle est renforcée par un ligament inférieur sur lequel s'insère le clitoris
- D) L'écart normal entre les deux os est de l'ordre de 10cm
- E) toutes les propositions sont inexactes

**QCM35 : Concernant l'articulation sacro-iliaque, donner les propositions vraies :**

- A) C'est une articulation synoviale de type symphyse
- B) Le ligament inter-osseux est très puissant
- C) La partie femelle de l'articulation se trouve sur le sacrum
- D) Le sommet de la crête iliaque se projette en regard du disque inter-vertébral L4-L5
- E) toutes les réponses sont inexactes

**QCM 36 : Concernant le détroit supérieur, donner les propositions vraies :**

- A) Il a la forme de l'entrecroisement de 2 ellipses
- B) Cet entrecroisement permet la présentation de la tête de l'enfant
- C) Le bord antérieur de l'os coxal chez la femme est en forme de voute gothique
- D) La voute gothique est plus résistante à l'écrasement que la voute romane
- E) toutes les propositions sont inexactes

**QCM 37 : Concernant le détroit inférieur, donner les propositions vraies :**

- A) Il est limité en arrière par le bord inférieur de la symphyse pubienne
- B) Le bord inférieur du coccyx et l'écartement des deux ischions délimitent aussi le détroit inférieur
- C) Les diamètres du détroit inférieur sont plus grands que les diamètres du détroit supérieur
- D) Lors de l'accouchement on peut assister à des phénomènes de nutation
- E) toutes les réponses sont inexactes

**QCM 38 : Concernant les muscles mobilisateurs de la hanche, donner les propositions vraies :**

- A) On décrit le muscle obturateur interne et le muscle piriformis
- B) Le tendon du muscle obturateur interne passe par la grande échancrure ischiatique
- C) Dans le canal sus piriformis passe le pédicule vasculo-nerveux glutéal supérieur
- D) En règle générale, le nerf sciatique passe dans le canal sous pyramidal
- E) toutes les propositions sont inexactes

**QCM 39 : Concernant le diaphragme pelvien, donner les propositions vraies :**

- A) Il est constitué de 2 muscles : muscle Levator ani et muscle Coccygien
- B) Le muscle coccygien double en profondeur le ligament sacro épineux
- C) Les muscles Levator ani et Coccygien sont innervés par le plexus sacré
- D) Le diaphragme pelvien est l'unique diaphragme de l'organisme
- E) Toutes les propositions sont inexactes

---

*Et voilà fin du DM, on espère qu'il vous sera utile pour vos révisions.  
C'est la dernière ligne droite, surtout ne lâchez rien, et bossez bien !  
Vos tuteurs d'anat qui vous veulent du bien ☺.*

