

# DM n° 1 : Appareil Génital Féminin - Bases

Tutorat 2025-2026 : 15 QCMS – Durée : 15 min



**QCM 1 : À propos de l'introduction à l'étude de l'appareil génital féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) On divise, pour simplifier, l'appareil génital en une partie interne et une externe
- B) Dans la partie externe on retrouve, de bas en haut : le vagin, l'utérus, les trompes et les ovaires ; chez la femme
- C) Le vagin est l'organe de la femme, il permet la copulation
- D) L'utérus est l'organe de la mère, il permet la gestation
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 2 : À propos des organes génitaux externes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) Le petit bassin est un espace limité en haut par le détroit supérieur
- B) Quand on fait un examen clinique à un ou une patiente on voit d'abord le périnée musculaire
- C) Une femme est examinée en position dorso-pectorale et aura une dizaine d'examen périnéaux dans sa vie
- D) Sur une vue de face on délimite d'arrière en avant un losange périnéal comme suit : la symphyse pubienne, les deux tubérosités ischiatiques et le coccyx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 3 : À propos des organes génitaux externes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) Le losange périnéal est découpé en deux triangles : un postérieur anal et un antérieur urogénital
- B) Le triangle postérieur contient l'anus. Le triangle antérieur contient par exemple le clitoris
- C) Ces deux triangles, donc le losange, contiennent les organes génitaux de la femme
- D) Il est innervé comme suit : le quart antérieur par les rameaux antérieurs de L1 et L2 ; le reste par les racines S2 à S4.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 4 : À propos des organes génitaux externes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) Plus en avant de la vulve se trouve de la graisse qui permet d'amortir les chocs pendant les rapports sexuels
- B) Les poils du mont de vénus sont de section plurigonale. On peut y retrouver des poux pubiens
- C) Les grandes lèvres, comme les petites lèvres sont imberbes et sont limitées par des commissures antérieures et postérieures
- D) Les nymphes ne sont pas délimitées des grandes lèvres
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 5 : À propos des organes génitaux externes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) La commissure antérieure a une partie antérieure qui forme qui forme le capuchon du clitoris. À l'inverse sa partie postérieure forme le frein du clitoris
- B) Les glandes para-urétrales sont aussi appelées glandes de Bartholin
- C) Une infection des glandes de Bartholin donne des bartholinites pouvant nécessiter jusqu'à une excision des glandes
- D) Les glandes vestibulaires de Skene sécrètent la cyprine pour lubrifier les rapports sexuels.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 6 : À propos des formes de l'hymen, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) En consultation je vois une femme avec un hymen labié, j'en conclue qu'elle est vierge
- B) En consultation je vois une femme avec un hymen cribriforme, j'en conclue qu'elle est multipare
- C) En consultation je vois une femme avec un hymen à caroncule, j'en conclue qu'elle est déflorée
- D) Une jeune fille à l'hymen semi-lunaire aura des premières règles douloureuses
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 7 : À propos des corps érectiles de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) Ils sont en superficie du périnée cutané et entourés de muscles en cornets pour améliorer l'intumescence
- B) Les femmes ont des corps érectiles dit parfaits car le clitoris rentre aussi en érection
- C) Le clitoris se voit bien sur une vue de face. Il s'insère sur la branche inférieure du pubis. On lui décrit des piliers, un corps, un genou et un gland. Il est retenu par un ligament à la symphyse pubienne
- D) Les bulbes vestibulaires ressemblent au corps caverneux de l'homme, ils ont une érection réelle
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 8 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) Le vagin est un organe qui se projette sur l'ischion en faisant un angle de 60° avec l'horizontal. Il a une forme légèrement convexe en avant
- B) D'avant en arrière, sur une vue de profil du petit bassin, on voit l'urètre, le vagin et le rectum
- C) Le vagin mesure une dizaine de cm de long
- D) L'éjaculation de l'homme se fait vers le haut du vagin, au niveau de son dôme appelé aussi fornix, voute ou lac spermatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) On peut comparer l'aspect du vagin à un palais de chien à cause de ses rides et de ses colonnes
- B) Les rides vaginales augmentent avec l'âge de la femme
- C) Il y a deux colonnes : la colonne antérieure (celle qui est la plus marquée) et la colonne postérieure qui garde la trace de l'urètre à cause de l'inclinaison du vagin
- D) On constate un trigone vésical sur la face postérieure du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 10 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) L'utérus est antéflexé et antéavachi quand on le regarde sur une vue latérale
- B) De bas en haut on trouve le fond de l'utérus, son corps, son isthme et son col
- C) La tunique externe est toujours formée de péritoine
- D) Il y a une tunique moyenne qui correspond au myomètre et une tunique interne qui suit le cycle féminin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 11 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) On trouve des cornes aux angles latéraux de l'utérus, c'est l'endroit où sont accrochées les trompes allant à la gonade
- B) Lors de l'examen du col de l'utérus je vois un orifice annulaire et régulier, j'en conclus que la femme est primipare
- C) Lors de l'examen du col de l'utérus je vois un orifice aplati et régulier, j'en conclus que la femme est vierge
- D) Lors de l'examen du col de l'utérus je vois un orifice expansé, j'en conclus que la femme est multipare
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 12 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) Elle a une structure assez spécifique qui ne lui permet aucune flexibilité pour que la gonade reste en place
- B) La fécondation a lieu dans l'isthme de la trompe
- C) L'oviducte est péritoniséé alors que la gonade ne l'est que peu
- D) La partie corticale de la gonade est seulement sécrétrice d'œstrogènes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 13 : À propos des rapports péritonéaux et des ligaments, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) Le ligament large est une formation issue du péritoine et relie l'utérus aux parois pelviennes
- B) On compte 3 éléments appelés ailerons et qui constituent à eux seuls ce ligament large
- C) Le méso-funiculaire est l'aileron supérieur et est sous tendu par le ligament rond
- D) L'aileron postérieur est sous tendu par l'oviducte
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 14 : À propos des rapports péritonéaux et des ligaments, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) Sur un utérus de profil, de bas en haut, on observe le mésomètre, le paramètre (plus effilé) puis les ailerons
- B) Le péritoine est une sorte de filme qui recouvre les organes de la cavité pelvienne entièrement
- C) On constate parfois un cul-de-sac utéro-vésical entre la vessie et l'utérus
- D) Après avoir recouvert les bords supérieur et latéraux de l'utérus le péritoine va former un cul-de-sac recto-vagino-utérin. C'est la partie la plus déclive du péritoine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 15 : À propos de l'examen gynécologique de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :**

- A) Le toucher vaginal peut servir à examiner le col de l'utérus chez une femme n'ayant eu aucun rapport sexuel
- B) Le toucher rectal permet d'examiner la voute du vagin
- C) Après un examen au spéculum accompagné d'une coloration du col par de l'acide acétique : si le col est rosé, l'examineur exécutera une biopsie
- D) Après un examen au spéculum accompagné d'une coloration du col par du Lugol : si le col est rosé, l'examineur exécutera une biopsie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses