

Correction sujet d'UE9 concours

2011

Attention on ne demandait que les fausses !

QCM1 : Réponse D

L'épine du pubis est sur le bord supérieur de l'os coxal, plus précisément sur le bord supérieur du pubis.

QCM2 : Réponse E

Les mouvements de nutation et contre nutation sont millimétriques.

QCM3 : Réponse B

Latéralement aux trous sacrés dorsaux il y a les crêtes sacrales latérales, donc il n'y a pas de gouttière !

QCM4 : Réponse A

L'amplitude des mouvements de l'articulation sacro-iliaque est de l'ordre du millimètre.

QCM5 : Réponse D

La chaîne iliaque externe se draine dans les nœuds lymphatiques iliaques primitifs.

QCM6 : Réponse A

La division de l'aorte abdominale en artères iliaques communes se fait en regard du corps vertébral de L4.

QCM7 : Réponse B

Les glandes vestibulaires majeures de Bartholin s'abouchent à la partie postérieure du vestibule de la vulve.

QCM8 : Réponse E

Pas du tout.

QCM9 : Réponse B

L'ampoule rectale est également dans la cavité pelvienne.

QCM10 : Réponse B

Le sphincter strié volontaire du rectum est un muscle à part entière, il n'est pas un épaississement de la tunique musculuse du rectum.

QCM11 : Réponse A

Les fibres du muscle levator ani et du muscle sphincter strié du rectum s'entrecroisent.

QCM12 : Réponse B

Le rectum anatomique commence en S3, donc une partie du sacrum est au-dessus du rectum anatomique.

QCM13 : Réponse E

Les lymphatiques du canal anal ne se drainent pas EN MAJORITE vers les nœuds lymphatiques inguinaux, qui sont au contraire plus accessoire vis-à-vis des nœuds lymphatiques iliaques internes et du promontoire.

QCM14 : Réponse A

L'élément fondamental central de la statique pelvienne est chez la femme le vagin ainsi que le noyau central fibreux du périnée.

QCM15 : Réponse E

Ce sont les formations péritonéales du ligament large de l'utérus.

Attention, cette correction a été faite par le tutorat niçois, n'est donc pas officielle, et ne peut en aucun cas être prise comme référence pour une éventuelle réclamation.